四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一三八册目次

醫壘元戎十二卷　（元）王好古撰　明萬曆二十一年屠本畯刻本　〇〇一
湯液本草六卷　（元）王好古撰　明刻東垣十書本　二七一
格致餘論一卷　（元）朱震亨撰　明刻東垣十書本　三七四
丹谿先生金匱鉤玄三卷　（元）朱震亨撰　明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本　四一八
外科精義四卷　（元）齊德之撰　明刻東垣十書本　四六五
溯洄集一卷　（元）王履撰　明刻東垣十書本　五三六

醫壘元戎十二卷

（元）王好古撰

明萬曆二十一年屠本畯刻本

醫壘元戎十二卷（兵部侍郎紀昀家藏本）

元王好古撰。好古字進之。趙州人。官本州教授。據好古所作此事難知序。蓋其學出於李杲。然此書海藏黃耆湯條下、稱杲爲東垣李明之先生。而易老大羌活湯條下、稱先師潔古老人。則好古實受業張元素。殆如趙匡陸淳同受春秋於啖助。而淳又從匡講問歟。自跋稱是書已成於辛卯（金哀宗正大八年）。至丁酉春（元滅金之第四年）爲、陰取之。元棄已絕。更無餘本。寺職州庠、杜門養拙。齋鹽之暇。無可用心。想像始終、十得七八。試書首尾。僅得復完。前有自序亦題丁酉歲。蓋初成於金末。而重輯於元初也。其書以十二經爲綱。皆首以傷寒。附以雜證。大旨祖長沙緒論。而參以東垣易水之法。亦頗採用和劑局方。與丹溪門徑小異。然如半硫丸條下註云。此丸古時用。今時氣薄不用。則斟酌變通。亦未始不詳且慎矣。其曰醫壘元戎者。自序謂良醫之用藥。若臨陣之用兵也。此本爲嘉靖癸卯遼東巡撫右都御史餘姚顧遂所刻。萬歷癸巳兩淮鹽運使鄞縣屠本畯又重刻之。體例頗爲參差。蓋書帕之本、往往移易其舊式。今無原本可校。亦姑仍屠本錄之焉。

醫壘元戎序

不佞素不知醫然聞醫壘元戎醫經家所正鵠第其書不廣傳即有亦多譌刺坐令俗醫輩燕悅殺人余經恨之歲壬辰奉
命按兩淮鹺司丞屠君本畯以故所訂正醫壘元戎書手薦余余受而卒業則病各繫源方各傚病益減變化悉中窾理洵醫家伍符哉此書行當令盧倉接踵人人不苦二豎已一日丞拜手前曰往關中王水部紹先左遷鹺分司故事官新涖一切共具費可數十金王素介不受迺

令稽藏中即欲鍥前書可取更費余曰唯是且得彰王君清操無事他計矣迺遂出前書付剞劂工竟丞復請不佞言弁諸首不佞唯是書行余意也敢辭稚無文請就其始命名旨益補所未備乎夫大將統六軍出禦外侮或突或衝或緩攻或急下或避其鋭或先嘗或增陴繕械以自固總之持五殺不處五危故能十九制勝即不然不至為人乘令觀是書按疾遣方表裡汗下標本緩急萬變不滯要不過以所勝乘所不勝各以金石草木性

醫壘元戎序

秋山子曰美哉王進氏之名方書曰醫壘元戎也夫良醫司命諸疾譬大將司命三軍呼吸之際有生死焉均之萬全乃濟將與醫豈二道乎由進之書評之傷寒雜病二門耳其言曰雜病之外不離乎表傷寒之内不離乎裏表則汗裏則下中則和不易之法也劑之溫涼在其中矣又曰雜科各自專門知證不知脉知藥不知性是豈真知而全識也哉信斯言也論根理要而用察標本圂仲景叔和思邈潔古東垣之用心也其原本岐伯猶兵家之祖述風後隨機應變見可

味當之即古名將料敵設奇機權不兩然而方方也從其不易言也而用則宜圓蓋方輿有五天運有六人生感受亦隨以異俗醫闇於大致猥云某病庸某方而一切投之即稍稍變通卒亦泥品餌如公孫綽所為倍偏枯起死人則書且為病予毒也不佞梓是書豈將望中醫以鵬舉之野戰頑念讀父書以取敗則又不如無書矣

萬曆癸巳秋巡按直隸監察御史東萊綦才書

知難勿藥止戈壽命均長矣豈非續命丹訣當籌國素書者乎是篇行則切脉望色聽聲寫形者有據而為知微對證之良醫俾八荒元元得蚤從事於此則疾可已身可活而古所謂六不治者安從有哉是用承

撫臺居涇公命刻之省垣以為醫家整兵經武和衆安民保大定功之助云

嘉靖二十二年癸卯孟夏之吉

賜進士出身通議大夫奉

勅巡撫遼東地方兼贊理軍務都察院

右副都御史秋山居士餘姚顧遂書

醫壘元戎序

趙州教授兼提舉管內醫學王好古進之撰

華車千乘帶甲十萬籌策沉機神鬼猜泣奇正萬全歷古如是況良醫之用藥獨不若臨陣之用兵乎柰何世人以平昔鹵莽之浮學應倉卒無窮之疾變其不眩駭顛仆者寡矣況患固多藏于細微而發于人之所忽由輕踏危療之求當苟無妙算決謀成法以統之則倒戈敗績之不暇尚何勝之可圖哉則前日門類品目之定盡計不及之也予自河南與諸友將弟兵日從事于患難之場隨病察脉逐脉定方開之劫之薄之發之以盡其寇吐之神之汗之下之以極其當攻守不常出沒無定大綱小紀經緯悉陳本數末度條理具設前乎此古人之所隱祕深藏或不盡意者不啻胸中自有十萬精銳如太阿之在匣中其鋒未嘗耀于外一旦撒而揮之有以恐人之耳目特入陣之奇鋒七擒之利刃其敵可却其勝可決而其安可圖如此而後已故曰醫壘元戎云丁酉九月二十有九日

嘉定後學王乘按丁酉乃元順帝十七年也

醫壘元戎目錄

卷第一

傷寒之源　內傷論
不可汗不可吐不可下　三忌
太陽證
仲景桂枝湯　小建中湯
金匱小建中湯　金匱黄耆建中湯
金匱黄耆桂枝五物湯　天雄散
易簡建中湯　黄耆建中湯

當歸建中湯　局方樂令黄耆湯
大建中湯　桂枝加葛根湯
桂枝加厚朴杏仁湯　桂枝加附子湯
桂枝去桂加白术茯苓湯
桂枝加芍藥湯　桂枝去芍藥加附子湯
桂枝甘艸湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
桂枝白术甘草湯　茯苓桂枝生薑甘草湯
桂枝加桂湯
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
桂枝甘草龍骨牡蠣湯　柴胡桂枝甘草湯
柴胡桂枝湯　桂枝附子去桂加白术湯
桂枝人參湯　桂枝芍藥湯
桂枝加大黄湯　王朝奉桂枝白虎問答
桂枝例
活人陽旦湯　活人陰旦湯
活人解肌湯　仲景麻黄湯
仲景桂枝各半湯　桂枝二麻黄一湯
桂枝二越婢一湯　大青龍湯

小青龍湯　仲景禁方
又方　仲景麻黄升麻湯
肺痿之源　易簡杏子湯
仲景麻黄杏仁薏苡仁湯
仲景薏苡仁附子湯　活人麻黄葛根葱豉湯
活人知母麻黄湯　易老解利法
麻黄醇酒湯　越婢湯
通頂散　活人獨活散
活人敗毒散　易老大羌活湯

芎辛例
芎辛湯　易簡芎辛湯
白龍丸　撥雲散
海藏法白朮湯　神朮湯
黃耆湯　黃耆甘草湯
活人防風牡礪白朮湯
風論　仲景小續命湯
獨活續命湯　白華續命湯
大續命湯　小續命湯

卷第二
太陽證
仲景葛根湯　葛根加半夏湯
葛根黃芩黃連湯　葛根升麻湯
活人葱白例
連鬚葱白湯　葛根葱白湯
七味葱白湯　葱豉湯
葱白一物湯　葛根一物飲子
普救散　百解散
不卧散　蕩邪散
和解散　易簡王氏生料五積散
海藏五積論　仲景五苓散
痓濕暍三證　附子散
桂心白朮湯　防已防風散
八物白朮散　金匱括蔞桂枝湯
桂枝加葛根括蔞湯　金匱葛根湯
活人舉敗散　神朮湯
白朮湯　海藏黃耆湯

易簡白朮湯　消暑丹
化水丹　半硫丸
三黃丹
活人發斑諸藥　葛根橘皮湯
陽毒升麻湯　陽毒玄參升麻湯
陽毒梔子仁湯　四物解肌湯
斑瘡豌豆瘡　五物木香湯
犀角大青湯　消毒犀角飲子
錢氏消毒散　王朝奉斑論

阿膠大青湯　陰陽毒升麻鱉甲湯
陽毒升麻湯　陰毒甘草湯
陽旦湯　陰旦湯
甘草湯　沈香連翹散
內化丹　奪命丹
治發背癰方　大補十全散
內托散　易簡胃風湯
人參黃耆甘艸三物湯
黃耆甘草二物湯

芍藥甘草例
仲景芍藥甘草湯　甘草乾薑湯
四逆湯　芍藥甘草附子湯
芍藥甘草黃芩湯　甘艸一物湯
又甘草一物湯　仲景炙甘草湯
東垣先生芍藥甘草例
桂苓例
桂苓丸　荔枝煎
千里漿　烏梅散

紫蘇湯　大順散
桂苓白朮丸　又千里漿
又方　荔枝湯
梅蘇散　桂漿
蜜酒　神朮湯
菩薩散　仲景烏梅丸
錢氏芍藥蘗皮丸　守真蘗皮丸
四信散　古方駐車丸
蘗皮湯　活人黃連阿膠湯

活人三黃熟艾湯　仲景治痢紫參湯
單黃連加減例
牛蒡根散　玄胡丸
紫霜丸　無名丸
天麻硃砂丸　安先生傳易老解利二藥
解利傷寒嚼藥　楊氏內解丸
四生丸
卷第三
陽明證

仲景白虎湯　白虎加人參湯
白虎加蒼朮湯　白虎加桂湯
白虎加梔子湯　白虎加五味湯
竹葉石膏湯　活人五味子湯
大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯
生薑瀉心湯　易老門冬飲子
麥門冬湯　玉露散
伊尹甘草瀉心湯　半夏瀉心湯
導赤散　一物瀉心湯

伊尹三黃湯　仲景茵蔯蒿大黃湯
梔子蘗皮湯二物　文潞公藥準
李思訓論議　活人酒煮黃連丸
紅丸子　易簡紅丸子
茵蔯蒿湯　茵蔯附子湯
丹砂丸　仲景梔子豉
梔子厚朴湯　梔子乾薑湯
活人雄白湯　涼膈散
文潞公藥準註李琬方

薄荷
薄荷煎　局方川芎丸
防風丸　生明丸
二白丸　枳殼丸
薄荷湯　清神丸
上清散　香甲散
消風散　神芎散
又點鼻方　化風散
化風丹　三陽頭痛

本草註桃花湯　烏頭赤石脂丸
疵華丸　十方駐車丸
古方三黃湯　延胡索散
東垣二紅丸　東垣三白丸
東垣調氣方　赤石脂散
赤石脂丸　震靈丹
易簡震靈丹　桃花丸
活人赤石脂丸　五物厚腸丸
固腸丸

旋覆代赭石例
仲景旋覆代赭石湯　旋覆花湯
旋覆花丸　活人金沸草散
局方金沸草散　千金翼旋覆花湯
外臺旋覆花丸　范汪旋覆白朮茯苓湯
仲景茯苓湯　千金翼大五飲丸
海藏五飲湯

卷第四

陽明證
王朝奉三承氣證辨誤例
仲景調胃承氣湯　大承氣湯
小承氣湯　煉玄明粉法
仲景治雜病三物厚朴湯
調胃承氣湯　仲景厚朴七物湯
仲景桃仁承氣湯　仲景枳實理中湯
深師消飲丸　仲景神奇枳實湯
梅師治痞　五苓平胃各半散
雄黃銳散

小便不通例
仲景五苓散　透格散
抵聖散　八正散
瞿麥湯　石葦散
六一散　梔子散
立効散　金鎖匙散
塗臍法
麻仁例
仲景麻仁丸　活人脾約丸
局方大麻仁丸　潤腸丸
活人五柔丸　活人神功丸
局方七宣丸　七聖丸
活人三脘散　半硫丸
快活丸　海藏巳寒丸
五燥大便秘　地黃黃連湯
畜血例
活人犀角地黃湯　活人黃芩芍藥湯
地黃散　犀角地黃湯

必勝散　蘗皮湯
煮石湯　畜血中焦
仲景桃仁承氣湯　畜血下焦
仲景抵當湯　百勞丸
抵當丸　通經丸
四血散　又方
韓氏微旨方　地黄湯
生漆湯　活人大黄湯
掌中金丸　五通丸
桃花散　通經丸
結胞例
仲景大陷胞湯　小陷胞湯
大陷胞湯　活人大陷胞湯
聖餅子　增損理中丸
海蛤散　仲景文蛤散
右今錄驗解五蒸湯　又五蒸丸
五蒸　仲景蜜導煎法

少陽證

海藏論男子婦人傷寒同一法
仲景小柴胡湯　易簡小柴胡湯
逍遙散　易簡逍遙散
錢氏地骨皮散　文潞公藥準注李琥方
四順飲子　柴胡桂枝乾薑湯
大柴胡湯　渼師黄芩湯
易簡參蘇飲　易簡溫膽湯
易簡降氣湯　許學士地黄丸
金匱大薯蕷丸　外臺秘仲景病源小品
龍腦雞蘇丸　黄耆膏子煎丸
地骨皮枳殼散　黄龍湯
柴胡鱉甲散　王氏秦艽散
生犀散
活人姙婦傷寒加減例
不老丹例
不老丹歌　又方
又方　逐風丹

治瘰癧方　消瘰丸
治瘤氣癭起　五香連翹湯
治癭膏鶩丸　孫尚藥方
青蒿散　鱉甲煎丸
白虎加桂枝湯　蜀漆散
牡蠣湯　小柴胡去半夏加括蔞湯
柴胡桂薑湯　九轉靈砂丹
又方　海藏瘧論
通脉四逆湯　小柴胡湯議論

舌胎滑例
三焦熱用藥大例
卷第六
三陽拾遺例
海藏通聖散評議　韓氏微旨論和解因時法
調脉湯　葛根柴胡湯
人參桔梗湯　薄荷湯
防風湯　香芎湯
六物麻黄湯　七物柴胡湯
發表湯　人參湯
石膏湯　解肌湯
芍藥湯　知母湯
韓氏十四藥定例
仲景瓜蒂散例
仲景瓜蒂散　宋氏仲景鈴法嚏藥瓜蒂散
勝金丸　瓜蒂散
三聖丸散　經驗方
外臺肘後方　又方　又方

仲景治百合例
百合知母湯　百合滑石代赭石湯
百合鷄子湯　百合洗方
百合地黄湯　百合滑石湯
百合括蔞牡蠣湯　海藏百合四君子湯
病源小品萎蕤湯　括蔞實湯
千金翼五苓散　甘草瀉心湯
陽旦湯　藏十餘證辯升藥
汗齒例

陳希夷刷牙藥　麝香間玉散
犀角升麻湯　梧桐淚散
升麻丸　白牙齒藥
又方升麻散　三聖散
治齒根宣露動搖方　治牙齒脫落不牢方
簡要方　二十八宿散
華撥散　擦牙藥
立効散　益神散
反老還童丹

古今巴豆例
仲景備急丸　仲景白散
仲景飛尸走馬湯　黑神丸
狀元丸　酒癥丸
神應丸　青娥丸
紅粉丸　解毒雄黃丸
玉霜丸　活人黑神丸
錢氏紫霜丸　感應丸
神應丸　局方感應丸

簡易感應丸　五府丸
木香五靈脂丸　三倍丸
解毒丸　軟紅丸
比金丸　青娥丸
柔金丸　順氣丸
安中丸　透羅丹
溫白丸　易老治五積
萬病感應丸　萬病紫菀丸全註
耆婆萬病丸　小麝香丸

神保丸

卷第七

太陰證

仲景理中例
仲景理中湯　王氏易簡理中湯
韓氏溫中篇　治中湯方
七物厚朴湯　二物厚朴湯
平胃散　陶隱居厚朴湯
易簡平胃散　調胃散

調胃丸　內應散
易簡養胃湯　易簡滲濕湯
活人厚朴黃連香薷湯
局方香薷丸　錢氏異功散
四君子湯　易簡四君子湯
易簡惺惺散　易簡白朮散
白朮散　大半夏湯
易簡四獸飲　易簡斷下湯
海藏黃耆湯　錢氏白朮散
養脾丸　調中人參湯
解酒毒例
葛花湯　橙香丸
不醉丹　百杯丸
局方勻氣散　集香丸
局方七香丸　五膈寬中散
烏沉湯　小烏沉湯
益脾丸　三製三黃丸
七香丸　大七香丸

[illegible]香丸　木香餅子
易簡蘇合香丸　木香餅子
丁沉煎丸　沉香降氣丸
調中沉香湯　金匱下痢病脉證并治
桂枝湯　訶梨勒散方
王朝奉治喘例
活人舉華佗喘說　聖惠方
潔古老人方

卷第八

太陰證
草豆蔻散　草豆蔻丸
易簡縮脾湯　橙皮丸
法製陳皮　溫麴丸
御方思食丸　思食丸
蘭省香爛飯丸　大參黃丸
木瓜湯　三奇六神麴法
嘔噦例
王朝奉治例　大橘皮湯

橘皮竹茹湯　溫中丸
海藏橘皮茯苓生薑湯
薑橘湯　活人大半夏湯
活人半夏生薑湯　桔梗半夏湯
活人橘皮竹茹湯　大橘皮湯
橘皮半夏湯　半夏茯苓陳皮湯
易簡二陳湯　易簡四七湯
赤茯苓湯　乳和薑皮湯
溫胃和痰丸　橘皮大丸

小七氣湯　活人小半夏加茯苓湯
青龍散　活人橘皮湯
局方玉壺丸　辰砂化痰丸
易老水煮金花丸　小黃丸
定喘丸　二妙丹
消痰丸　安和丸
仲景葶藶大棗瀉肺湯
三聖丸　仲景豬膏丸
仲景豬肚丸　豬肚丸

豬膽丸　豬蹄湯
玄胡丸　紫霜丸
無名丸　無名丸料
天麻辰砂丸　安先生傳易老解利一藥
解利傷寒嗃藥　楊氏內解丸
四生丸　遺拾
調胃例
御醫楚待藥白龍丸　生薑半下湯
薑棗湯　棗艾丸

太陰拾遺　附後辨脾胃所傷變易形法
海藏所定脾脉一十七道安方大略
茯苓桂枝白朮甘草湯
甘草半夏湯　十棗湯
大青龍湯　防己湯
澤瀉湯　厚朴大黃湯
小半夏湯　防己椒目葶藶大黃丸
小半夏加茯苓湯　茱萸湯
半夏瀉心湯　黃芩加半夏生薑湯

猪苓湯　茯苓飲
桂枝五味子甘草湯　小柴胡湯
大半夏湯　大黄甘草湯
茯苓白朮澤瀉湯　文蛤湯
半夏乾薑散　生薑汁半夏湯
橘皮湯　橘皮竹茹湯

卷第九
少陰證
仲景眞武湯　茯苓四逆湯
四逆湯　四逆加人參湯
四逆散　薑附湯
朮附湯　白通湯
易簡眞武湯　易簡四逆湯
易簡薑附湯　易簡附子湯
白通加猪膽汁湯　通脉四逆湯
四逆加猪膽汁湯　麻黄附子細辛湯
麻黄附子甘草湯　仲景附子湯
四物附子湯　桂枝附子湯
附子白朮湯
少陰證
王朝奉論悖辨　王朝奉辯陰陽證
仲景甘桔湯例
仁宗御名如聖湯　肺痿門
孫思邈單方　甘桔二生湯
海藏紫菀散　如聖丸
漱藥青龍散　百部丸
衍義蛤蚧散　捜膿散
錢氏如聖散　桔梗枳殻湯
橘皮茯苓湯　桔梗湯
黄耆鱉甲散　硃砂膏
定肺散　定肺丸
解毒丹　蛤蚧散
古方紫菀散　增損防風通聖散
咽痛例
咽喉備急丹　人參清肺散
代鍼散　發聲散

解毒丸　鵬砂散
消毒散　漱藥地黄散
王壺　五痺散
赴筵散
振悸酸棗仁例
胡洽酸棗仁湯　聖惠方
活人酸棗仁湯　酸棗仁飲子
八味定志丸　局方定志丸
保眞定志丸　保神丸
又方　預知子丸
茯神例
人參茯神湯　神工丹
延壽丹　補心丹
保眞秘一丹　張天師草還丹
日月丹
仲景腎氣例
仲景八味丸　無比山藥丸
蓯蓉丸　易老天麻丸

東坡四神丸
天門冬例
古方天地丸　增損三才丸
魏武帝服天門冬例
易簡眞降心丸　二茸丸
螽斯丸　混元丹
又治耳聾方　神注丹
丁香丸　紫石英丸
溫經湯　抱朴子法
內藥續生丸　又方
御方蓯蓉煎　萬安丸
保安丸　大效牡丹皮散
玉抱肚　綿襠法
七寶散　乾荷葉散
烏金散　土粉散
神効丸
五補例
局方五補丸　海藏大五補丸

牡礪地黃丸　瓊玉膏
卷第十
素問寒癰疽例
骨碎補丸　虎骨散
千金翼乾地黃丸
明目例
六合丸　七仙丸
益陰丹　永壽丹
諸風例

易老袪風丸　御方袪風丸
烏白散　大傻方
龍蛇散　復肌丸
退風散
黃紫例
大鳳髓丹　正鳳髓丹
小鳳髓丹　解毒丸
拔毒丹　固元丸
易老珍珠丸　秘眞丸

保眞丸　賀蘭先生解毒丸
清心丸　火府丹
經進十精丸　神仙六子丸
十補丸　補虛五味子丸
大和膏　驪珠丹
腎氣內消丸　金鈴子丸
枳殼五倍丸　碩夫枳殼茴香丸
香殼丸　易簡枳殼湯
越婢湯　防巳加茯苓湯

甘草麻黃湯　附子麻黃湯
黃耆芍藥桂枝苦酒湯
桂枝加黃耆湯
桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯
枳實湯
海藏集仲景水氣例
仲景葶藶大棗瀉肺湯
仲景十棗湯　三花神祐丸
除濕丹　玄青丹

趂痛丸　明理趂痛丸
五皮散　調胃白术澤瀉散
紫丸散　仲景十棗湯
水氣求青法　化水丹
取瘀眼中痛例
局方神助散　祕方
又方　百一方
倉治十種水氣　又法
又法治十種水氣　治鼓氣方

沉香湯　錢氏塌氣丸
木香塌氣丸　木香散
又方
折傷例
乾城劉家接骨丹眞方
接骨散　接骨丹
貼藥　神仙正骨藥果金散
又一法　聖惠方
導滯散　又方　又方

又方　正骨膏
一方　接骨丹　又方
瘡瘍疥癬例
神仙太一膏　善應膏
白龍膏　摩風膏
仲景治婦人陰瘡蝕爛方
又方　御藥大紅膏
追膿錠子　替鍼膏
治大小癰癤無頭方　張子和泄水丸

蝕惡瘡方　生肌藥
生肌肉　銀絲膏
五枝膏　治惡瘡或有小蟲方
治疥癩癬　拈痛神應膏
金絲膏　肉紅散
治腳痛　又方
擦瘡散　治便癰外貼方
治熱油湯火燒瘡疼不可忍方
外臺秘要治丁瘡方　小兒丹毒方

蜘蛛咬變身成瘡方　治下疳久不愈方
卷第十一
厥陰證
王朝奉厥陰例
仲景吳茱萸湯　活人論厥陰藥
古方治頭痛欲裂者　四物蒼术各半湯
茱萸湯　活血方
益血丹
四物湯例

四物湯　四物膠艾湯
八珍湯　芎歸湯
保安湯　四君子湯
當歸地黃丸　四物二連湯
四神散　二補丹
地黃骨子煎　真降心丹
易簡增損四物湯　易簡芎歸湯
易簡熟地黃丸　白芍藥散
温六湯　又方
羌活龍膽湯　地黃骨子丸
神方驗胎散　靈苑丹
治崩不定方一　或淋漓年久者
易簡惺惺散　保安湯
海藏當歸丸　易簡酒煮當歸丸
千金白堊丸　加減白堊丸
十全博救方　王紹顏信効方
苦楝丸　茴香湯
四聖散　破聖散

茴香散　錢氏捻頭散
蜘蛛散　集驗方
八風五痺　八風散
三汁法　侯氏黑散
主癲癇方　防己地黃湯
頭風摩散方　桂枝芍藥知母湯
烏頭方　治腳氣衝心方
附方續命湯　三黃湯
八味丸　越婢加术湯

風癇例
五癇五獸　妙香丸
蝎梢丸　[illegible]頂丹
東垣先生驪珠丹　局方甘露丸
至寶丹　易簡三生飲
五生丸　局方生白丸
局方青州白丸子　易簡青州白丸子
白茯苓丸　二白丸
小靈寶丹　靈寶丹

枸杞丸
南星半夏例
易簡紅丸子　局方紅丸子
局方蘇合香丸　易簡蘇合香丸
返魂丹
八風例
局方八風丹　辰砂天麻丸
辰砂丸　麝香全蝎散
立應散　徐老丸

解語丸　玉液丸
玉芝丸　人參半夏丸
局方通聖白花蛇散　木香保命丹
仲景皁角丸例
皁莢丸　皁莢半夏湯
皁莢散　枳殼丸
祛風丸　備急五嗽丸
小枳殼丸
檳榔木香例

消飲丸　三倍丸
小檳榔丸　大檳榔丸
三稜丸　木香三稜丸
泄水散　錢氏宣風散
錢氏利驚丸　守貞藏用丸
木香定痛丸　仲景附子湯
四物附子湯　仲景甘艸附子湯
附子湯　萬病無憂散
枳實丸　搜風利膈丸

古方玄胡丸　詵詵麯蘖丸
卷第十二
厥陰訂
調胃散　許學士破陰丹
還陽丹　反陰丹
半硫丸　局方金液丹
三寶丹　楊氏五神丸
易簡來復丹　局方來復丹
四神丹　龍腦大白丹
易簡養正丹　局方震靈丹
朝真丹　至寶丹
軟金丹　聖功丸
蝎梢丸　不換金丹
上青白附丸　錢氏溫白丸
易簡如聖餅子　局方如聖餅子
化風丹　蝎氣散
治傷寒將效者　烏荊丸
化水丹　老君神明散

換骨丹　[illegible]
局方大已寒丸　易簡大已寒丸
大已寒丸　吳茱萸丸
小吳茱萸丸　快活丸
艾煎丸　艾煎丸
噎氣湯　奔氣湯
小七氣湯　戊己丸
小已寒丸
煎烏頭例
張鐵礶煎烏頭蒼术法
移剌相公神仙保命金丹
佐經丸　佑經丸
玉柱杖　張鐵礶方
安宜差傳到筋骨藥
朱砂例
玉倪丹　造丹砂法
造楮實煎法　小朱砂丸
朱砂寒熱溫凉各有加減例

朱砂散　鶴頂丹
鎮心丸　驪珠丹
石龍散　拘龍丸
牛黃膏　虎睛丸
御方活命金丹　五福化毒丹
金箔鎮心丸　定風丹
紫苑丸　脫蛇丸
治風疾癲癇方　神僊經進透骨膏
滌洗藥　神效膏

生犀散　又方
如聖散　還魂丹
化風丹　局方樺皮散
文潞公療癧瘍外塗方
聖餅子　斗門方
聖惠方
活人脚氣木瓜散例
木瓜散　脚氣木瓜丸
四斤丸　香附子散

立應散　治血崩臍腹痛方
立効散
香附子例
立應散　霹靂散
定血散　靈苑內補丸
又方　又方
交感丸　降氣湯
又方　孫思邈九竅血出方
小烏沉湯　千金白聖丸

螵蛸散　又方　又方
又方　地榆條
產寶方　簡要方
千金方　正元廣利方
雷氏方　論傷寒雜病分二科

霜降後春分前為傷寒

明監察御史東萊桂亭秦才錄

趙州教授進之王好古纂次
兩淮運同四明錢沐唆重刊
兩淮運副姚江嚴ㄒ世校正

傷寒之源

帝曰人傷于寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱也寒氣外凝內鬱之理腠理堅緻玄府閉密則氣不宣通濕氣內結中外相薄寒盛熱生故人傷于寒轉而為熱汗之而愈則外凝內鬱之理可知斯乃新病數日者也今風寒客于人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當是之時可汗而發也 海藏云傷寒冬傷于寒也邪氣內藏至春夏而發為熱病元受邪氣伏藏過春夏風寒所傷外邪喚出內邪也有有汗者有無汗者所以有傷風傷寒之異也亦有先傷寒而後傷風者亦有先傷風而後傷寒者亦有先傷寒而重感寒者亦有先傷風而重感風者此四者汗有多寡亦有止作亦有常汗而不止者有全無汗者先發重後發輕後傷重則亦類重者當以

一日足太陽膀胱、二日足陽明胃、三日足少陽膽、四日足太陰脾、五日足少陰腎、六日足厥陰肝、

外感傷陽

內感傷陰

脈證察之不可忽也有告天壞妖生係羅有傷于陽者風雨寒暑是也有傷于陰者飲食居處陰陽喜怒是也其變又有不可深數者元感風寒與新傷各合而變有有形無形內外之異所以治之當從其變而藥不一也輕重寒暑在其中矣岐伯曰平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露反此三時形乃困薄扁鵲脈一呼一吸皆四至而濇者邪中霧露之氣也仲景曰清邪中於上焦又曰霜降已後春分已前中霜露者皆為傷寒也又曰清邪中於上焦濁邪中於下焦與飲冷同傷也（此係海藏論在陰證論中） 且傷風者惡風傷雨者惡濕傷寒者發熱惡寒傷暑者心熱畏日此皆傷于陽者也飲食不節者或饑或飽或冷或硬居處不時或寒或通或勞或逸陰陽太過者隱相易之形狀或一或二喜怒不常者須心腹之逆滿或隔或痞此皆傷于陰者也若有冬伏之寒邪更經春夏之復傷而作傷于陽者則邪氣外併傷于陰者則邪氣內併新傷引出舊傷也或四季之中有一日兩

內傷重外感輕者先治內

外感重內傷輕者先治外

寒下發表宜審

傷有一時并傷則內外相合其變至多矣或陽證或陰證或陰毒或雜證俱在其中先外傷後內傷外就內而合病若頭痛身疼輕而內傷重者當先治內之重者後治外之輕者先內傷後外傷內就外而合病若心腹痞悶輕而外傷重者當先治外之重者後治內之輕者然亦有內外俱輕亦有內外俱重當各從其所可先者而先治從其所并治者而并治次第不失萬舉萬全矣治內兼外者不可寒下若下則陷經邪于內治外兼內者不可熱發若發則益中熱于外

二者皆逆豈不危乎藥之寒熱可輕用哉

內傷論

內傷先傷胃或曰上熱下冷傷食病也下足四支微冷或四順兩脇熱甚此少陽也中州先傷少陽反病者何也答曰內傷者先傷胃是陽明也經云脾胃相通五穀消是脾與胃陽戊陰己共爲腑熱今既胃傷連及脾也兩脇雖爲少陽之地章門一穴所處卽脾之膜也脇安得不熱況從內而至外者先少陽內傷中州而少陽亦病也假令內傷有巴豆及諸溫熱之屬例又有備急丸寒熱各半之例又有枳實大黃牽牛之屬亦有神麯麥蘗縮砂仁及三稜廣茂之例其熱不一又有玄明丸者黃丸種種不一內傷之疾豈一藥所能畢哉今人無論證之寒熱人之虛實便之要結只一藥而主之寒熱安得不差所以人病者虛勞殘疾無所不有也然內傷脾胃與少陽俱病此陽病也若內傷陰病當以理中而後脈虛而細少陰病也脈虛而弦厥陰病也脈弱而虛太陰本病也三陰之藥大具見陰證論潔古老有說可下之藥於前今又詳說可用之藥於後并見陰證論有無病能食

而傷者有有病不能食而傷者不可不知也內傷心腹痛大小便不通服食藥心腹微快大小便通餘邪傳入下標頭痛發熱後治其標標藥合隨三陽經用輕治之卽愈此由內而外先治其內後調其外此其法也以其飲食過多傷之太過故邪熱之氣傳入于標內既以定外又安得爲之全愈若冬伏寒之氣在經內傷嗽出冬伏之邪先內傷次標病亦如前法先治內後治外此內重而外輕故如是也若外重而內輕先治其外後治其內可也以上止是內傷太過者

內一般所用皆溫劑

足少陽膽經

積寒傷冷也。若積寒傷冷，除已從陰，雖有標病，不須治標，獨治內也。內三陰之經，所用皆溫劑，內既得溫，標病不發而自愈。何以然？發表之藥不遠熱也。三陰溫雖非發表之藥，亦不遠熱也。內既以溫，標病從內而變，亦從此而解矣。若錯汗之，三焦之氣絕而成大陰也。此溫中之劑，雖獨治內，亦兼治外也。不可不知。陰證治本不治標，標本俱得；治標不治本，標本俱失。

已有冬伏寒邪，若內傷喚出伏寒邪，便見太陽證也。若無冬伏寒邪者，止是內傷發出，不和邪氣多歸少陰，少陰也，兩脇熱甚，頭額痛，下足冷，如厥逆狀，非止然後手足溫，或熱，惟手指末亦有微冷者。[illegible]仲景活人劑

不可汗不可吐不可下

大法春宜吐，春夏宜發汗，秋宜下。凡用發汗及吐下湯，皆中病便止，不必盡劑也。少陰病脈微，不可發汗，亡陽故也。宜附子湯。 陽已虛，尺脈弱濇者，復不可下之。宜小柴胡湯。 動氣在左在右在上在下，并不可發汗，宜柴胡桂枝湯。 少陰病脈細沉數，病在裏，不可發汗，宜當歸四逆湯。 少陽不可發汗，宜小柴胡湯。 咽中閉塞，喉乾燥，亡血，衄家，淋家，瘡家，不可發汗。已上六證并小柴胡湯。 下利清穀，不可發汗，宜理中湯、四逆之類。若四逆厥及虛家，皆不可吐，厥宜當歸四逆湯，虛宜附子湯。 有熱人，可黃耆人參建中湯。 少陰病膈上寒，乾嘔，不可吐，宜小半夏加橘皮湯、溫中丸。 咽中有動氣，不可下。咽中閉塞不可下，宜烏梅湯。 諸外實者不可下。諸四逆厥者不可下，虛家亦然。厥宜當歸四逆湯，虛宜附子湯。

有熱人，黃耆人參[illegible]以此證必須小柴胡湯。 脈浮而緊，法當身疼痛，宜以汗解。假令尺中遲者，不可發汗。營氣不足，血少故也。[illegible] 脈浮而緊濇，則[illegible] 濡而[illegible]微，心內[illegible]湯。 脈濡而弱，不可發汗，宜小柴胡湯。 脈浮而大，浮為氣實，大為血虛。小便當赤難，胞中當虛。今反小便利而大汗出，法應衛家微。可與小建中湯。今反[illegible]津液四射，榮竭血盡，乾煩而不得眠，此不可下。

表證未解也

宜與小柴胡湯　脉浮大應發汗宜柴胡桂枝湯而
反下之爲大逆脉浮而緊者不可下宜桂枝麻黄各
半湯數不可下宜柴胡桂枝湯　下之必煩利不止
宜葛根黄芩黄連湯　脉濡弱浮數不可下宜小柴
胡湯　脉濡弱微濇微則陽氣不足中風汗出而反
躁煩濇則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草龍骨
牡蠣湯　結胸脉浮大不可下下之即死宜小陷胸
湯　夫陽病多者熱下之則鞕宜小柴胡湯　太陽
發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒者太陽證不罷

下之爲逆宜桂枝麻黄湯　太陽病外證未解不
可下下之爲逆宜桂枝麻黄湯　病發于陽而反下
之熱入因作結胸病發于陰而反下之因作痞　病
脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞　太陽與陽
明合病喘而胸滿不可下宜麻黄杏子甘草石膏湯
　太陽與少陽合病心下鞕頸項强而眩者不可下
宜小柴胡湯　四逆厥及虚家皆不可下厥宜當歸
四逆湯虚家宜附子湯　病欲吐者不可下宜小半
夏加橘皮湯　太陰腹痛吐食自利腹痛下之必胸

浮日有待平星跂平旦

下結鞕　厥陰病渴氣上衝心心中熱疼不欲飲食
則吐蚘下之利不止　少陰病飲食入口則吐心中
溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸
中寒實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯　無陽
證陰大便鞕者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導等法
傷寒五六日不結胸腹濡脉虚復厥者不可下此亡
血也宜當歸四逆湯下之即死宜四逆加人參湯
藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不
可攻也攻謂下也宜用小柴胡湯　金闕元究傷寒嘔多

雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯　陽明病身面
色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯　色黄者小便不
利也宜五苓散　陽明病心下鞕滿者不可攻之宜
生薑瀉心湯　半夏瀉心湯攻之利不止者死宜四
逆湯　不可汗下吐一條三法利害非輕前人多列經
後大抵醫之失只在先後緩急之錯則變生若汗下不
若則亦無亡陽生黄畜血結胸痞氣及下利洞泄協
熱利痓急虚勞等證生矣以其如此故録大禁忌于
前使醫者當臨病之初不犯也

又三忌

一時忌　春夏不宜桂枝秋冬不宜麻黃

一藥忌　已汗者不得再發已利者不得再泄

一病忌　虛人不宜用涼實人不宜用熱其所犯之劑當從緩而輕

海藏云前人說不可汗下吐三法多在經後讀者往往遺之此用藥之大禁必不可犯今列之篇首使人易見爾

六陽說　先足經從湯液　後手經從雜例

仲景桂枝湯

治太陽證傷風自汗脉浮而緩

桂枝　芍藥　生薑各一錢半　甘草　紅棗去核

夏加黃芩知母石膏升麻

右為麤末水一盞煎至八分溫服自汗小便不數者宜用無汗小便數手足分不惡寒或骨梁好飲者不宜用

小建中湯

治陽脉濇陰脉弦

桂三分　芍藥一錢半　甘草半錢　生薑一片

紅棗擘去核後放此

右為麤末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至八分去滓下膠飴兩匙再煎溫化服日三夜二尺脉尚遲再加黃耆末一錢　後人用治襍病改桂枝為桂取其厚薄不言枝

金匱小建中湯

治虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥宜此方主之

桂枝三兩去皮　芍藥六兩　甘草三兩炙　生薑三兩切

右六味㕮咀以水七升先煑五味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三服嘔家不可用此湯以其有甘草故也

千金療男女因積勞虛損或大病後小腹作疼四體沉滯骨肉疼酸吸吸少氣行動喘惙或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面目少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘戚多臥少起久者積年輕者百日漸致瘦削五藏氣竭則難可復根又治肺

與大腸俱不足虛寒之氣小腹拘急腰痛羸瘠百病肘後黃耆建中湯有人參二兩

金匱黃耆建中湯

虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆 桂枝去皮 生薑各一兩切 芍藥六兩

甘草三兩炙 大棗 膠飴一升

右七味㕮咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三服 集驗云嘔者加生薑腹滿去棗加茯苓四兩一方療肺虛損不足補氣加半夏五兩

金匱黃耆桂枝五物湯

血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞血出臥不得時動搖加被微風遂得之但以脈自濇在寸口關上下緊宜針陽氣令脈和緊去則愈 血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不足如風狀宜此方主之

黃耆三兩 芍藥三兩 桂枝三兩去皮 生薑六兩切

大棗

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓溫服七合作三服一方有人參

金匱桂枝加龍骨牡蠣湯天雄散亦主之

夫男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞 男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然勞之爲病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出酸削不能行 男子脈微弱而濇爲無子精清冷夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩作眼眶痛也髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精脈得之芤動微緊男子失精女子夢交並以此方主之

桂枝去皮 芍藥 生薑各三兩切 甘草二兩炙

大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩熬

右七味㕮咀以水七升煮取三升去滓分溫三服小品云虛羸浮熱汗出者除桂加白薇附子各一分故云加龍骨湯

天雄散

天雄三兩去皮　白术八兩　桂枝六兩去皮　龍骨一兩煆
右四味擣爲末酒服方寸匕日三服不如稍增之

易簡建中湯

治腹中切痛增損治療各各不同並見于後此藥飲酒人不喜甘者不宜服此藥與桂枝湯用藥一同但減芍藥加官桂枝數專治傷風發熱自汗用此藥表之無汗者不宜服此

官桂一分　白芍藥一兩半　甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至六分去滓服

又治婦人血痛男子心腹疼痛并四肢拘急疼痛心腹疼痛甚者加遠志半兩或吐或瀉狀如霍亂及冒涉寒賊風入腹拘急切痛加附子三分痛氣發作當歸附子建中湯煎時加蜜一匙頭許

一方治男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋䐜脹臍下虛滿胞中煩悸面色痿黃脣口乾燥少力身重胞滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半名黃耆建中湯　一方治婦人一切氣血虛損及産後勞傷虛羸不足腹中疼痛呼吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩

柴胡桂枝湯　桂枝人參湯

桂枝附子去桂加白术湯　桂枝芍藥湯若誤下傳裏傳表也

桂枝加大黃湯同例去枝加大黃與大柴胡法有表有裏　已上諸湯並見活人書小本中

王朝奉桂枝白虎問答

云春初秋末冬月方用桂枝麻黃五六月壯熱不用白虎若當用桂枝麻黃則內熱發黃生斑必然二月三月四月濕病宜陽旦湯七月八月猶熱病壯熱尚宜白虎自然汗解或問孫曰杜張皆言變若果見桂枝麻黃證亦豈得不用只用白虎也孫曰此說甚妙但臨時看證用之老弱之人不宜白虎白虎治傷寒亦治渴證

桂枝例

活人陽旦湯

治中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項強鼻鳴

乾嘔

桂枝三 芍藥三 甘草二 黃芩二

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗一箇生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服

自汗者加附子湯者加桂加栝蔞主利者去芍藥名當歸建中湯若産後半月每日三服令人可壯

黃耆建中湯

桂 芍藥 甘草 加黃耆

當歸建中湯

桂 芍藥 甘草、加當歸

局方樂令黃耆湯 范汪當歸湯皆出桂枝建中倒

大建中湯 主治並見局方

桂心三錢 芍藥二錢 甘草八錢 棗二十枚擘破

生薑八錢 加黃耆二錢 當歸一錢 人參一錢

附子半錢 半夏三錢、

右㕮咀水五盞煎至三盞去滓分作三服

桂枝加葛根湯 桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加附子湯 桂枝去桂加白朮茯苓湯

桂枝加芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯

桂枝甘草湯 桂枝白朮甘草湯四味

茯苓桂枝甘草大棗湯四味

茯苓桂枝生薑甘草湯四味

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 柴胡桂枝甘草湯

桂加乾薑三心下悸者去芍藥加茯苓三虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴佳 若脉浮緊無汗發熱者不可與服也

活人陰旦湯 丁部本陰旦湯與活人同

治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩

桂心三 芍藥三 甘草一 大棗十五枚

乾薑一 黃芩只此一味酌量加減

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日三夜二

活人解肌湯 治溫病頭疼壯熱

桂心一分 芍藥二分 甘草一分 麻黃一分

葛根一兩 黃芩半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗一枚煎至八分日三服三日後不解者再服脉浮者宜再服脉沉實者下

仲景麻黃湯 治傷寒無汗脉浮而緊

麻黃一錢去節 官桂一錢去浮皮 甘草半錢炙 杏仁三箇半

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服夏加知母黃芩石膏恐有斑黃之變惟冬與春病人素虛寒者不宜加此

仲景桂枝各半湯

桂枝一錢半 芍藥一錢 生薑一錢 甘草一錢

麻黃一錢 杏仁一枚半 棗一枚半

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

奉議先生云治傷風得傷寒脉傷風脉證脉不同故宜各半湯

桂枝二麻黃一湯 桂枝二越婢一湯

大青龍湯 麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃三錢 桂一錢 杏仁二枚 生薑五錢 棗一枚

甘草一錢 石膏一錢半

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗周止後服

小青龍湯

麻黃 細辛 乾薑 甘草 桂

芍藥各二錢 五味子各半錢 半夏一錢半

生薑三片 棗一枚

右為麤末水一盞半煎至八分去滓溫服日三夜二後人增損為華蓋散大青龍去桂石膏倍杏仁治嗽

仲景禳方治客忤

麻黃四兩 杏仁七十枚 甘草三兩

右以水八升煑取三升服之

又方

桂一兩 生薑三兩 梔子十四枚 豉五合

右以酒三升攪煑之去滓頓服取差一法用桂枝一法用麻黃以其有汗無汗也

仲景麻黃升麻湯

治壞證傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治

升麻一兩一錢 麻黃二兩去節 知母 黃芩

葳蕤各十八銖 石膏 白朮 乾薑

芍藥 天門冬 桂枝 茯苓

當歸一兩一錢 甘草六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈寸脉沉遲下部又不至泄利久不止不可輕用此藥

海藏云仲景麻黃升麻湯條下爲下之而寸脉沉遲或厥或咽喉不利咳嗽下膿血或下利不止斷作難治此藥有桂枝有麻黃湯有乾薑芍藥甘草湯有白虎湯內更有少陽藥黃芩是也此是三陽合而標病不應不應下而下之壞而成肺痿也若脉不遲者去乾薑官桂不下利者亦去之寸口脉小

者去黃芩此隨證而加減之也前人全用藥以其前證悉備故用三陽標藥以治之經曰治病必求其本是也

肺痿之源

衍義云有一溫病已十二日診之其脉六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾目不了了耳聾問之病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡服之二日又與小柴胡湯加桂乾薑也一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與陷胸丸半服利三行次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其中有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子

嗽一日咳嗽減二日而病悉愈以上皆用張仲景
方
王朝奉陽毒條下有金匱千金唾膿血二條內有吐
血肺痿失治久不愈變肺癰爲難治孫眞人詳說
并藥證具見甘桔例少陰條下並出仲景金匱祖
方
仲景麻黃杏仁甘草石膏湯　麻黃附子細辛湯
麻黃連翹赤小豆湯　麻黃附子甘草湯（上三方修製並見活人）
易簡杏子湯
治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯
血痰飲停積悉皆治療
人參（去蘆）　半夏　茯苓　乾薑　甘草
官桂　芍藥（炒）　五味子　細辛
右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚
薑五片煎至六分去滓食前服
若感冒得之加麻黃等如脾胃素實者用罌粟殼
去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服添烏梅一
枚煎服其効尤驗若嘔逆惡心者不可用此法又
云杏仁人參倍加麻黃添芍藥加麻黃之數乾薑
五味子各增一半名小青龍湯大治久年咳嗽氣
虛喘急皆得其宜二方中有麻黃有汗人不宜服
此劑
仲景麻黃湯例
仲景麻黃杏仁薏苡仁湯（治風濕身煩疼日晡劇者）
麻黃（三兩）　杏仁（三十枚）　甘草　薏苡仁（各一兩）
右四味以水四升煑取二升分溫服
仲景薏苡仁附子湯（治胸痺偏緩急之證）
薏苡仁（一十五兩）　附子（十枚炮）
右二味杵末每服方寸匕日三
活人麻黃葛根葱豉湯
治傷寒三二日頭項腰脊痛惡寒脉浮而緊四味
隨定奪分兩
右剉如麻豆大水煑麻黃去沫次下葛根二十沸
次下豉次下葱白煎成去滓溫飲少時以葱醋粥
投之覆衣取汗後有活人葱白例并王朝奉葱白
等方

活人知切麻黃湯

易老解利法

乾山藥一兩　藜蘆一錢

右為細末紙撚蘸少許鼻內搐之

麻黃醇酒湯治黃疸病

凡用麻黃去節去沫曬乾再用麻黃一把去節綿

裹美酒五升煮取半升去滓頓服

一法治風此箇風字非傷風自汗即中風痓而無汗

故用麻黃後越婢中有風痺字

麻黃一兩　穿山甲二錢　人參二錢　甘草

水酒各一碗同煎服

越婢湯治風濕痺脚氣弱

麻黃去節去沫焙二兩　石膏四兩　白术一兩

附子一兩炮　甘草半兩炙

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑三片棗

一枚煎至八分去滓溫服

通頂散解利傷寒

藜蘆去土半兩　躑躅華一錢　藿香葉二錢

右為細末紙撚蘸少許鼻內搐之

活人獨活散治傷寒溫濕

羌活　獨活　防風　細辛

黃芩　川芎　甘草　人參

茯苓　枳殼　甘菊華　石膏

麻黃　蔓荊子　薄荷　生薑

右十三味為麄末入生薑薄荷水煎去滓溫服年高

者以川芎代黃芩自汗者減麻黃風濕證多自汗

故減麻黃

活人敗毒散

治傷風溫疫風濕風眩風痰卑濕

羌活　獨活　前胡　柴胡

枳殼　人參　茯苓　桔梗

甘草　川芎

為細末生薑水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜

瘴烟之地溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚氣

此藥不可闕

海藏云傷寒得傷風脉傷風得傷寒脉故仲景有大

青龍之劑及汗出過多戒不可服有筋惕肉瞤之證許公學士諄諄以此則知麻黃桂枝不可輕用也及洪川韓氏又有桂枝之戒以其亂治貴賤之不同芳草薑鹽之不等故耳至於楊氏明理特有互見脉證非精於持診者則未易能也後之學者安所適從哉

先師潔古老人博採衆方別立一法作十味大羌活湯無問有汗無汗中風中寒悉皆治之使喜溫者去五積之燥熱好涼者除雙解之變寒雖市夫農子用而無失人有升舉之前身豈能筆下有此胸次耶

易老大羌活湯

治傷寒脉浮而緊傷風脉浮而緩并解兩感惡候

羌活　防風　白芷　川芎

細辛　甘草　蒼朮製　生地黃

黃芩

右麤末每服五錢生薑五七片水一盞半煎至七分去滓稍熱服無時　大羌活湯全生地黃朮杵

若熱頭疼
似感冒矣
故不當服

臼中別爲麤末各等分稱之名曰羌活地黃各半湯解利兩感傷寒有神驗說見難知易老大羌活湯劑料大小服餌溫熱加減並從緩急法

法加大黃治風熱溜于內回瀉青丸上治並見錢氏　一法治破傷風用豆淋酒煎素有寒者加草烏頭白朮一字服之

芎辛劑

芎辛湯治頭風寒頭痛挾身背拘急

川芎半兩　細辛根二錢　甘草一錢半

右爲麤末量多少水煎去滓分二服臨臥　一法加吳白芷辛夷甘菊華治鼻出黃水濁涕不絕腦痛目昏

易簡芎辛湯

治一切頭痛發熱者不當服其餘痰厥飲厥腎厥等證偏正頭痛不可忍者只以此藥升聖餅子不拘病退但多服此自能作效仍服養正丹黑錫丹并用此藥調鍾乳粉間服諸證頭痛緊捷之法法撥無蹤此但頭疼多用石膏益取其能墜痰飲然恐

性寒故以鍾乳代之腎厥頭疼尤得其宜或以石
膏煅過爲末用亦得
生附子　川烏頭生　南星炮　乾薑
細辛　川芎已上各一兩
㕮咀每服四錢水二盞薑五片茶芽少許煎至六
分去滓食前服　若氣難寒盛只用川芎一兩細
辛半兩甘草三錢煎至如前服　又一方治頭疼
以細辛二錢川芎白芷減半爲細末搐入鼻中
一方治氣虛人頭疼以附子一隻生去皮切作四

片用生薑自然汁一大盞浸一宿慢火炙乾再炙
再蘸再炙後以盡薑汁爲度高良薑等分爲細
末爲茶調服之　又治暑濕頭重眩暈用川芎白
朮去附子等分官桂甘草減半每服四錢薑十片
煎服

白龍丸

治男子婦人一切風偏身瘙癢手足頑麻偏正頭
疼鼻塞腦悶大解傷寒頭風又治霧露之氣或發
熱者亦可用之

川芎　細辛　甘草　藁本
白芷各等分
右爲細末藥四兩入石膏半斤細末係煅了者水
搜丸每兩分八丸薄荷茶清嚼下一丸食後服風
蛀牙疼用一丸分作三乾擦後用湯漱之便用茶
茶嚼下一二丸或作湯服之亦可

撥雲散治服

羌活　防風　甘草　柴胡
右等分水煎服之

海藏法白朮湯

白朮三　防風二　甘草一
同仲景桂枝湯　黄耆湯　止汗者以生薑煎服

神朮湯

蒼朮二　防風二　甘草一
同仲景麻黄湯　發汗者以葱白生薑煎服
若以此二藥若傷寒得傷風脉傷風得傷寒脉亦
同各半例加減治法並見陰證論六氣加減

黄耆湯主治並見陰證論

人参　黄耆　白术　白茯苓
芍藥　甘草　一法加　藿香
陳皮　生薑

黄耆甘草湯

治風寒入腠理令人膚痛不走無定（俗稱痛……摩之……按之卻）肉不痛也

黄耆三　甘草一　生薑煎服

活人防風牡蠣白术湯

治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤此壞證也

防風　牡蠣粉　白术等分

右爲細末每服二錢酒調下米飲湯亦得日二三服汗止便服小建中湯

風論

上古聖人之教下也皆謂虛邪賊風避之有時註云乘虛而入非也俗云賊風者爬牖之風亦非也虛邪者從前來者爲虛邪不勝已者亦爲虛邪也經云從虛入腠理注云避彼虛邪亦天之虛邪也移精變氣云賊風數至虛邪朝夕內至五臟骨髓外傷空竅肌肉無

旨邪之虛實皆乘虛而入非乘虛而入便爲虛邪也從前來與不勝已皆爲虛邪也春甲乙則金風秋庚辛則炎風便是賊風也故勝已者爲實邪從後來者是爲實邪賊風也故風爲百病之始善行數變衝激吹擊而無蹤有太過不及勝復之各異故撓萬物者莫疾乎風也四時八節之所傷初爲外舍久見內藏始自皮毛次入經絡次入大絡次入大經深入骨髓而不可治

仲景小續命湯

治脈緊緩或浮緩主治證並見局方

麻黄　桂心　芍藥各五兩　甘草
生薑各五兩　人參　川芎　黄芩
杏仁　防風各一兩半　防已　附子

崔氏外臺不用防已

右十二味㕮咀水一斗二升先煮麻黄三沸去沫內諸藥取之三升分爲三服不差再三兩劑隨經輕重發之　脚氣服之亦差　天陰節變服之以防瘖瘂　恍惚者加茯神遠志　骨節煩疼有熱

者去附加白芍藥　千金翼深師古今錄驗有白
朮不用杏仁　救急方無芎杏仁三味　延壽方
無防風
易老法　六經加減例　四時增損同
麻黃續命湯　桂枝續命湯　白虎續命湯
葛根續命湯　附子續命湯　羌活連翹續命湯
獨活續命湯
治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂
麻黃　人參　黃芩　芍藥
芎藭　甘草　杏仁各一兩　防風半兩
桂一兩　防己半兩　附子半兩　白花蛇肉
獨活　乾蝎各二錢
右爲麤末每服三錢水一盞半生薑五片煎取一
盞去滓熱服食前
白花續命湯
治卒中急風牙關緊急精神昏憒
白花蛇　全蝎　獨活　天麻
附子　人參　防風　白殭蠶

肉桂　白朮　蒼朮　赤箭
川芎　細辛　白附子　甘草
半夏　麻黃　白茯苓已上各一兩
右爲麤末每服五錢水一盞生薑五片煎至七分
去滓稍熱服
大續命湯
脉緊滑者主之治肝癘二風卒然瘖瘂若依古法
用大小二湯通治五藏偏枯賊風
麻黃八兩　石膏四兩　桂心　川芎
乾薑各一兩　當歸　黃芩各一兩　杏仁二十枚
竹瀝一升　甘草千金靈有
右九味㕮咀水一斗先煮麻黃二沸去沫下諸藥
煮四升去滓又下竹瀝煮數沸分作四服能言未
差後服小續命湯舊無竹瀝今增如神大八風散復
有竹瀝葛薑三汁法
小續命湯
脉微弱者主之治大風經藏奄忽不能言四肢垂
曳皮肉痛痒不自覺也

獨活 麻黃各三兩 川芎 防風
當歸 葛根 生薑 桂心各二兩
茯苓一兩 附子 細辛 甘草各一兩
右十二味㕮咀水一斗煮取四升五服老小各半
之初得病有汗去麻黃無汗復用之 上氣者加
吴茱萸二兩厚朴一兩 乾嘔者加附子一兩 噦
者加陳皮二兩 胸中吸吸少氣者加大棗十二
枚 心下驚悸加茯苓二兩 熱者去生薑加葛
根 初得風未須加減且作三劑四五日後覩虛

實論之行湯針灸法

醫壘元戎卷之一

醫壘元戎卷第二

趙州教授進之王好古纂次
明監察御史東萊桂亭蔡才會梓 兩淮運同四明屠本畯重刊
兩淮運副姚江嚴呂世校正

太陽證 太陽流入陽明 故葛根次服

仲景葛根湯 主治條製並見活人二方同 葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

葛根升麻湯 錢氏用治小兒瘡疹傷寒

葛根 升麻 芍藥 甘草

海藏云活人言頭疼如破者連鬚葱白湯次又不已者葛根升麻湯然太陽流入陽明斷其路故以此湯主之地黃湯內加犀角以升麻代之是知陽明藥非太陽藥也人或初病太陽證便與葛根升麻湯是遺太陽不惟遺經及引太陽邪氣入於陽明不能解也其變可勝言哉

活人葱白例 此例宜在前麻黃葛根湯之後陽明條下

連鬚葱白湯 治傷寒發汗已未發頭疼欲破者

葱白連鬚半斤 生薑二兩

右以水二升煮取一升去滓分二三服此藥不差者服葛根葱白湯

葛根葱白湯

葛根　葱白　生薑　芍藥　川芎

知母

右剉水三升煎一升去滓分二服

七味葱白湯

許仁云傷寒或因氣勞或因食勞其病如強力持虛行步而發者力勞也

葱白連鬚　葛根　鹽豉　生薑

麥門冬　乾地黃　勞水一杓揚之千數

右七味勞水煎三分去二去滓分作二服覆首出汗

王朝奉方　活人葱白例並出金匱祖方

葱豉湯 治[illegible]傷寒

葱白十莖　生薑三片切

右二味以水三升煮取一升分作三服取汗為度

又葱豉湯

葱白一兩半　豉半斤

右以水三升煮取一升分作二服取汗為度

又葱白一物湯

葱白二把

又葛根一物飲子

右以水一升煮熟服取汗食葱亦主安胎若胎欲須臾即出

葛根汁每服一小盞如人行五里抱道一服若無生葛乾葛亦可煮濃汁服至于升麻梔子前胡知母黃芩杏仁六味共七物內加葱白三兩葱豉煎去滓服

[illegible]教散 治小兒傷寒

乾葛一斤炒半　甘草四兩炙赤　蒼朮一斤泔浸焙

右爲麤末每服二大錢水一鍾煎至七分去滓熱服

百解散

升麻湯六兩　蒼朮四兩　菖蒲一兩

右同爲末水煎服

又百解散 治太陽陽明合病

麻黃　荊芥　石膏　川芎

蒼朮　甘草

又百解散 治證同前

麻黃　菖蒲　蒼朮　甘草

不卧散

蒼朮半兩　甘草一兩　菖蒲二錢

右以水同生薑棗煎服

蕩邪散

藁本　蒼朮　甘草等分

右以水一盞煎服之

和解散

蒼朮半斤製　藁本　桔梗銼炒　厚朴製炙各二兩

陳皮去白　甘草炙各四兩

右爲麤末每服三錢水一大盞生薑三片棗一枚

去滓服

易簡王氏生料五積散

治感冒風寒肩背拘急發熱頭疼或爲寒所搏一

身凛然急用此藥如服養胃湯法以被覆汗出即

愈

蒼朮　桔梗　枳殼　麻黃

陳皮各六錢　白芷　川芎　當歸

甘草　官桂　半夏　白芍

茯苓各二錢　乾薑　厚朴各四錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片葱白一根

煎至六分去滓食前熱服尋常被風寒濕氣交互

爲病頸項强直或半身偏疼或麻痺但服此藥加

麝香末少許煎服自能不治婦人經候不調心腹

撮痛或閉塞不通加醋一合煎服　產後催生及

胎死腹中亦如前法能飲者更加酒半盞　產後

發熱及往來寒熱不問感冒風寒及惡露爲患均

可治療腹中血塊尤宜熱醋調服　傷寒手足逆

冷面青嘔吐宜加附子　或痃癖癥瘕膀胱小腸

氣痛加炒茱萸半錢鹽少許　脚氣加茱萸木瓜

大便祕者加大黃　脚氣下注焮然赤腫者以大

便流利爲度　脚氣初發增寒壯熱者亦宜此藥

利之　又一方治渾身瘡疥膿血水淋漓經時不

愈加升麻大黃名升麻和氣飲　蓋瘡癬爲患多因內有所蘊發在皮膚若只傳以藥何由得愈不若以此藥滌之若寒濕之氣注下作瘡瘍愈則毒氣入腹爲害不淺此藥尤妙若有熱證則以敗毒飲亦加大黃煎服

海藏五積論

麻黃桂芍藥甘草即麻黃桂枝各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃　枳殼桔梗陳皮茯苓半夏即枳梗半夏等湯也　又川芎當歸湯治血　又加

乾薑爲厚朴散　右此數藥相合爲解表溫中泄熱之劑去痰消痞調經之方雖爲內寒外感表裏之分所制實非仲景表裏麻黃桂枝薑附之的方也至於冷積嘔吐泄痢癥瘕時疾疫氣項背拘急加葱白豆豉厥逆加吳茱萸寒熱咳逆加棗婦人難產加醋始知用之非一途也惟知活法者擇之

仲景五苓散

治太陽病後汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩一銖　茯苓十八銖

桂半兩去浮皮　白朮十八銖

右五味爲末以白米飲調服方寸匕日三服多飲暖水汗出即愈　胃弱小便少亦宜少減二苓澤瀉加白朮桂便以生薑之類　若水停心下煎生薑三錢或半夏入煎湯調服五苓散秤三錢或半兩亦可　太陽標病傳入標之本發渴溺不利以此散瀉之邪自膀胱而出也若未渴妄用五苓散

反引邪氣入裏而不能解也故易老云即太陽經之一藥也若傷寒太陽脉緊而渴者不宜用此　陽明證後有仲景五苓散一條甘露飲枳朮湯稱師方一以其消痞去水故入陽明例　飲酒而泄瀉者脾胃受濕也何以知之仲景厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也故飲而瀉者五苓散甘露飲子神効飲酒若過度必作利者裹急後重者溫熱之毒浸漬腸胃也當作別治　甘露飲即五苓散去猪

有汗爲柔痓無汗爲剛痓

以承氣加羌活

苓加石膏寒水石滑石甘草是也 並用濃煎生薑湯調服食前其所加三石臨時視病寒熱輕重多少隨宜用之

痓濕暍三證

傷寒頭強急身體反張屬太陽先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之痓病又作痙痙者強直也古人以強直爲痙外證發熱惡寒與傷寒相似但其脉沉遲弦細而項背反張強硬如發癎之狀此爲異耳新產血多汗出中風亦有此證當察其有汗無汗以分剛柔二痓無汗惡寒名爲剛痓有汗不惡寒名爲柔痓無汗者葛根湯主之有汗者桂枝加葛根湯主之 分剛柔二痓加減小續命主之衛之剛痓胸滿口噤不臥著牀脚攣急咬齒大承氣湯下之加羌活尤妙外臺秘要云熱而痓者必熱病痓者反折瘛瘲齘齒噤也剛柔二痓與陰陽二痓何如 痓亦作痙陽痓屬剛痓陰痓屬柔痓以附子散桂心白朮湯附子防風散八物白朮散可選數藥用之

附子散

治傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止頭強搖頭口噤

桂心二錢 附子炮一兩 白朮一兩 川芎二錢 獨活半兩

右各㕮咀每服三錢水一鍾棗一枚同煎至五分去滓溫服

桂心白朮湯

治傷寒陰痓手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心 附子 川芎各等分

右剉如麻豆大水五盞薑五片棗一枚同煎七分去滓溫服

附子防風散

治傷寒陰痓閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心 附子 乾薑 柴胡 茯苓 五味子

右㕮咀每服三錢水一盞生薑四片煎至七分去滓溫服無時

八物白术散

治傷寒陰痙三日不差手足厥冷筋脉緊急汗不出陰氣內傷

白术　茯苓　桂心　麻黃

羌活　良薑　附子　五味子

右㕮咀每服四錢水一大鍾薑五片同煎至五分去滓溫服無時無論有汗無汗藥幷下藥中總加

羌活

王朝奉剛柔二痓三藥

金匱括蔞桂枝湯 有汗者弱也屬陰

太陽證其證備身體强几几然脉沉遲爲痓

括蔞根二兩　桂枝三兩去浮皮　芍藥三兩　甘草二兩炙

每服五錢水二小盞薑七片棗二枚煎至一盞去滓服汗不出食頃啜熱粥以發之

桂枝加葛根括蔞湯 治症如前

桂枝　芍藥各一兩　甘草　葛根

括蔞根各一錢半

右㕮咀每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

金匱葛根湯 無汗者剛也屬陽

太陽病無汗而小便少反氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂枝二兩去浮皮　甘草二兩炙

生薑三兩切　芍藥二兩　大棗十二枚

右㕮咀水一斗先煮麻黃葛根一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服取微汗王朝奉云芍藥

二兩

活人舉敗散 治新產血虛痓者

右以荊芥穗不以多少微炒爲細末好酒調五錢服之

或云仲景痓病無藥今王朝奉治痓葛根湯即桂枝湯內加葛根麻黃是也治後有金匱芍藥三兩一句即是仲景有本方也叔和編次仲景言證而無藥金匱以有也活人百合證數藥以爲活人藥而

不知本草所載皆金匱方當知仲景有本方矣金
匱玉函即仲景之答稱也金匱要略亦出玉函故
朝奉但言金匱處便爲仲景方也故文潞公輩皆
稱仲景爲羣方之祖蓋本此也

海藏痓濕暍別法

神朮湯 治風濕惡寒脉緊

蒼朮 防風 甘草

右㕮咀葱白煎去滓服

解利無汗治剛痓加 羌活 獨活 麻

白朮湯 治風濕惡寒脉緩

白朮 防風 甘草

右㕮咀生薑煎去滓服

解利有汗治柔痓加 桂心 黃耆 白朮

太陽陽明加川芎荊芥穗 正陽陽明加羗活酒大
黃 少陽陽明加防風柴胡 熱而在表者加黃
芩 寒而在表者加桂枝黃芪附子熱而在裏者
加大黃 寒而在裏者加乾薑良薑附子以上數
經寒熱當以脉別之

汗少者加蒼朮 陽濡而弱濕溫也

先傷濕 後傷暑 脉虛名曰重暍

汗多者加白虎桂枝 陰小而急

先傷寒 後傷熱

身熱脉虛 自汗惡寒 中暑也

白虎加桂湯

身熱脉浮 自汗欲睡 風濕也

白朮防己湯

先傷風 後傷熱

先飲冷後傷暑五苓散主之此必心下痞也濃煎生
薑湯調服或四君子湯調中湯亦可若中和後或
小便不利或莖中痛以蒲黃三錢滑石五錢甘草
一錢爲細末熱水調送金花丸三五十丸 太陽
中熱者暍病也 中暑亦暍病也太熱中熱發熱
惡寒身重反痛脉弦細芤遲小使洒洒然毛聳少
有勞忽然身熱口開齒燥此有三忌 忌發汗 一
忌溫針 二 忌大下 三 若犯此三忌則有三甚
發汗惡寒愈甚 一 溫針發熱愈甚 二 大下小便

問弦細芤遲當用何藥答曰海藏黃芪湯主之

海藏黃耆湯

人參　黃耆　白朮　茯苓

芍藥　甘草各等分

右㕮咀每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去滓溫服

東垣李明之先生云如治風先浸防風二兩次煎餘藥與同例

蒼朮不以多少泔浸透刮去皮切作片子晒乾每服四兩水三大碗煎至二大盞去滓煎用下項藥

白朮　白茯　黃耆　白芍

右四味各等分細剉每服一兩以蒼朮水煎至一盞去滓溫服食遠可用若三焦氣弱中土不能營飲食心下痞內外三焦之氣絕也　當先浸黃耆二兩水二碗煎至一碗再煎正藥黃耆湯一大服用接內外三焦元氣同東垣先生法

上以蒼朮煎藥渠㮣也下浸黃耆煎藥接氣也

白朮湯

治小兒泄瀉胃熱煩渴不問陰陽並宜服之

人參　白朮　木香　茯苓

甘草　黃耆各一兩　乾葛二兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎至半盞量大小與服仍用香連丸間之渴欲飲水者時時煎服任意飲之彌多彌佳　白朮湯一方治嘔吐白朮人參各一兩半夏一兩半茯苓甘草乾薑各半兩薑煎服

錢氏謂小兒吐瀉當溫補之每用理中丸以溫其

中五苓散以導其逆連進數服兼用四君子湯加陳皮調之若已虛損用金液丹雜以青州白丸子爲末米飲調服多服乃効若吐瀉之後發熱必作驚風二藥服之累有神効　若胃氣已生則旋減金液丹却以異功散等藥徐徐調之　若食不消脾胃虛寒嘔吐惡心者當服益黃散用陳皮半兩青皮訶子肉甘草各一分丁香一錢量大小煎服

小兒暑月吐瀉其證不一宜詳審用之不可差謬

有伏熱者小便必不利宜五苓散香薷散　有傷

食者其吐并瀉必酸臭氣宜服感應丸　有虛冷者泄瀉必多宜以六神湯加附子服之用人參茯苓山藥白术扁豆甘草等分薑棗煎服風證加天麻痢加罌粟殼　吐瀉初定當以天南星爲末每服加冬瓜子仁七粒煎服以防變癇　若瀉色青當用驚藥小兒之病與大人無異用藥亦同量力用之　惟風氣勝風夜啼重舌變蒸客忤驚癇解顱顖病疳氣不行數證錢氏方甚詳

消暑丹

半夏一斤　茯苓半斤　甘草生半斤

右以醋五升煮半夏盡醋煮乾薑汁作糊無見生水爲丸每服五十丸熱水嚥下精意修治用之極效　中暑爲患藥下即甦　傷暑發熱頭疼服尤妙　夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害應是暑藥皆不及此　若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

霍亂證夫嘔吐而利者霍亂也三焦者水穀之道路邪在上焦者則吐而不利邪在下焦者則利而不吐邪在中焦則吐且利以飲食不節冷熱不調清濁相干陰陽乖隔遂成霍亂揮霍撩亂重也吐利而已輕也霍亂吐瀉者風濕暍外至生冷硬內生內外合而爲邪謂如風寒濕者熱暍所傷各有先後食飲菜果各有多少內外傳變各有輕重以六經脉符何經何藏以隨所感見治之或表或下或和或收斂滲濁分利濕之爲浮弦實細遲緩宜求此之謂也外邪入裏傷於陽明吐下利者爲霍亂吐利止後見外證者其治外傷治之外證不已復傳於陰經嘔利而作[illegible]而後吐利裏氣已虛傷寒再傳而又吐利是謂裏虛故不可治而厥逆先傷寒而爲吐利既吐利而再傳傷寒後傷寒卻傳吐利雖曰重虛而後亂經渾濁不已外則難解內則難溫藥餌難爲功矣　若飲冷過多或有所傷心下痞腹痛不能食或泄瀉不止若不嘔者化水丹嘔吐者半硫丸右二藥効後服五苓梅瓜等藥不復再飲也

化水丹

皂莢　蛤粉　牡蠣粉

右為細末醋糊為丸

硫黃　半夏　並依局方修製服餌

半硫丸 已上二丸古時用今時氣痛不用

三寶丹 今依舊方暴寫不止不審飲食

硫黃　半夏　牡蠣各等分

右為細末薑糊丸桐子大朱砂為衣生薑湯下二十丸空心服此上三藥並有治暑之意

活人發斑諸藥

葛根橘皮湯 治發斑

治冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癮疹如錦文而欬心悶但嘔吐清汁服此藥即靜

葛根　橘皮　杏仁　知母

黃芩　麻黃　甘草各等分

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎去查溫服

治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦文咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻二分　犀角　射干　黃芩

人參　甘草各一兩

右剉如麻豆大水三升煎取一升半去滓飲一盞須刻再服以衣覆手足出汗則愈不愈再服

陽毒玄參升麻湯 治發狂

治發汗吐下後毒不散表虛裏實熱發於外故身斑斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草各等分

右剉每服五錢以水煎去滓溫服

陽毒梔子仁湯 [illegible]

治少陽陽明合病陽毒傷寒壯熱百節疼痛並宜服之

升麻一　黃芩　芍藥　石膏　知母

甘草　杏仁　柴胡　梔子仁

此段移補
後面已有

右爲末五錢 水一盞入薑五片或百粒煎至六
分去柤溫服無時

四物解肌湯

芍藥 黃芩 升麻 葛根等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服內傷
腹中有宿食不得大便而發熱當以食藥去其物
則可便後仍發熱者在表也亦宜解表此皆錢氏
朱氏升麻湯去甘草加黃芩尤妙
潔古老人涼膈散去大黃倒解六經中熱亦治小兒
瘡疹發之則加防風荊芥二物尤妙 守真說涼
膈散大便結小便秘者宜用大小便已通者
不宜也 朱氏錢氏王氏所論皆[illegible]老亦平守
真發涼南北之地法方宜不同也 折中湯液萬
[illegible]湯之法當以[illegible]

[illegible]

千金方熱病後發豆瘡黃連一物煮濃汁服 又好
青黛大如棗水服之差 又法木香一物煮濃汁
服

五物木香湯治瘡疹

青木香二兩 丁香一兩 薰陸香 白礬一兩各 麝香

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服
熱盛者加犀角一兩無則以升麻代之輕者去礬
大妙

犀角大青湯

大青二兩 梔子十枚 犀角

右㕮咀每服五錢入豉半合水一小盞半煎至一
盞去滓服 初虞世云小兒瘡疹之候與傷寒溫
疫相似疑似之間可先與解肌湯大人傷寒中風
溫疫瘡子已發熱未退並可用解肌湯 小兒瘡
疹出不快濃煎紫草汁服又牛旁子炒熟爲末同
荊芥煎服

消毒犀角飲子治瘡

牛蒡子 荊芥 甘草

錢氏消毒散

牛蒡子　荊芥　甘草

右麤末水煎服

王朝奉瘡疹論

發斑者下之太早熱氣乘虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發斑或服熱藥過多亦發斑微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生也皆當用白虎人參湯一名化斑湯及阿膠大青湯孫兆云兼與紫雪大抵可下者用調胃承氣湯若月病陽重常宜細後見微斑當急治之

阿膠大青湯

大青四兩　甘草二兩

右為麤末每服四錢水一盞半入豉半合煎至一盞去柤入炙過阿膠二片再煎至膠消服　華佗方

又主熱病不解下利爲困者又主傷寒熱病十餘日以上發汗吐下後熱不除利不止斑出黃疸皆可療之神效

王朝奉議論并方

陰陽毒不可以常法治之金匱云陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治陰毒之為病面目青身疼如被杖咽喉痛死生與陽毒同升麻鱉甲湯並主之　千金陽毒湯治傷寒一二日變成陽毒或服藥吐下後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下利其脈浮大面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血者五日可治七日不可治宜升麻湯　陰毒湯治傷寒初病一二日變成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數仲景云此陰毒之候身如被杖五六日可治七日不可治甘草湯方一百七

甘草湯

又陰毒湯治傷寒骨節疼痛內寒外熱虛煩者

陰陽毒升麻鱉甲湯

升麻　當歸　甘草各二兩　蜀椒一兩

鱉甲炙　雄黃半兩研

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

肘後千金陽疸用升麻無鱉甲有桂陰毒用甘草無雄黃

陽毒升麻湯　此二藥與活人書異名有別議

升麻二兩　當歸　蜀椒　雄黃　桂各一兩

右每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服覆手足取汗得吐亦佳

陰毒甘草湯

甘草炙　升麻各半兩　當歸　蜀椒

鱉甲一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服不[illegible]

[illegible]

陰旦湯[illegible]大[illegible]

桂枝湯加黃芩三兩餘同本方加減法　自汗者去桂加附子一枚　渴者去桂加栝蔞根三兩　利者去芍藥加乾薑三兩附子一枚炮　心下悸者去芍藥加茯苓四兩　虛勞裏急正陽旦湯主之　若脈浮緊者不可與之

陰旦湯

芍藥　甘草炙各二兩　乾薑　黃芩各三兩　桂四兩

右每服五錢水二盞半煎至一盞去滓服

治傷寒肢節疼內寒外熱虛煩者

甘草湯治咽痛陰陽毒未散甘草一味五錢水一盞煎去滓服

沉香連翹散　治一切癰疽瘡疹痛欲成者立效

青木香　沉香　升麻　麝香

乳香　丁香　獨活　桑寄生

連翹　木通以上各一兩　川大黃炒五兩

右為麤末每服三錢水二盞煎至一盞空心熱服半日以上未利再服本方有竹瀝芒硝斟酌虛實用之

內化丹

治腦背癰疽初覺腫硬未有頭腦并諸腫不消始覺便服此藥微利數行其腫免致出膿

南乳香半兩　沒藥半兩另研　澤烏大者水浸久炮去皮臍生用

海浮石[illegible]兩　巴豆[illegible]去皮不出油

右爲細末將烏頭末餘藥和研勻以浮石醋打麵糊丸如桐子大量虛實加減空心五七丸溫酒下忌熱物

奪命丹 治[illegible]瘡腫疽發背

大黃 [illegible]兩　牡蠣一兩

生薑 兩　沒藥　乳香 各一錢

右爲麤末轉作丸了用好酒一升木炭火熬一沸耗三分用碗盛之夜露一宿早晨去滓空心服之不可亂傳

治疝[illegible]方

蒼耳子炒黃搽去其刺再炒深黃不見風擺細末每服五錢　好熱酒調服食前臨臥

一則用大黃牡蠣二則用蒼耳則知有內外之不同也　前有奪命丹二藥表裏不同何以然乃濟堅之變脈沉而滑地之濕氣害人皮肉筋脈脈浮而澀所以有泄之發之之異也灸法一同與前內托散論議相通

大補十全散

參芪朮茯草　芎地桂歸川　三五錢秤用

生薑棗水煎　婦人虛弱用　名美號十全

治婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力一切病後氣不和失精及憂愁思慮傷動血氣喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱平補有効養氣育神醒志止渴順正辟邪溫暖

川芎　官桂　芍藥　甘草

黃耆　當歸　人參　白朮

茯苓　熟地 各等分

右爲麁末每服二大盞水一盞生薑三片棗二枚同煎至七分無時溫服參朮茯苓甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其血氣俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散　保命救生丹出十全例

內托散 此方在[illegible]門

當歸 人參 桔梗 芍藥 甘草 厚朴 可治膏粱變
補托有神功
本方註云未發者消散已發者早膿兼治時氣服
者當求脉之源若其人本虛脉虛宜用此若脉不
虛不宜用此反此則害人多矣經云地之濕氣感
則害人皮肉筋脉而生病者宜此藥托之右膏粱
之變饒生大疔者不宜用之宜以羌活連翹大黃
生地黃湯下之榮氣不從逆於肉理乃生癰腫榮
逆血鬱鬱則熱聚為膿正理論曰熱之所過則為

癰腫榮氣不從變有不為者乎答曰膏粱之變芳
草之美金石之過氣血太緩榮衛之氣充滿而抑
遏不能行故閉塞血氣皆由於此當泄之以奪
盛熱之氣若其人飲食疏糲內裏不和則肌肉消
薄榮衛之氣促短而澀滯故寒涼內閉鬱而為
癰癤也當補之以接虛怯之氣亦當以脉之浮沉
別之既得膏粱之邪泄之則連翹大黃補之則內
托散之類是也故經云膏粱之變饒生大疔陷脉
為瘻留連肉腠此之謂歟 瘡瘍自外而入者不

宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不令內入
者接之而令外故經云陷者灸之 灸而不痛痛
而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而
後及良肉所以痛也 灸而痛不痛而後止其灸
灸而痛者先及其未潰所以痛而次及其將潰所
以不痛也 聖惠治腦疽發背用陽明藥如犀角
麻黃石膏之類以其變在手太陰發渴或祖火在
中故不用太陽藥只用陽明也 海藏黃耆湯與
四物湯相合亦名托裏湯也內加桂減參尤佳以

[illegible]也

易簡胃風湯

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注
下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 桂 當歸

芍藥 白朮各等分

右㕮咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分
去滓稍熱服空心食前小兒量力減之此方加熟
地黃黃耆甘草等分足為十味名十補湯大治虛勞

不喜食。恐
傷食也。傷
食用補。又
增其病。

嗽加五味子　有痰者加半夏　發熱加柴胡
有汗加牡蠣　虛寒加附子　寒甚加乾薑
皆依本方等分此須脾胃壯者可服稍不喜食則
不可用往往今人只以脾虛停積痰飲爲治
者服此等藥愈傷胃氣至於不救者比比皆是不
可不知也　若骨蒸發熱飲食自若者用大補湯
柴胡各二兩分作十服之　人參治氣短茯苓小
便不利川芎脉濇弦官桂惡寒當歸脉濡白芍藥
腹痛白术胃熱濕盛　先便後血者血在上也便血

糞後者血在中也先血後便者血在下也
東垣云防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使血瘀
色紫者陳血也熟地黃　血鮮色紅者新血也生
地黃　寒熱者加柴胡　肌熱者加地骨皮　此
藥乃甲欺戊也風在胃口中上濕泄不止濕既去
盡而反生燥庚欺甲也本無金氣以其甲勝戊虧
庚爲母復讎也故經曰亢則害承乃制是反制勝
己之化也若脉洪實痛勝者加酒浸大黃　人參
芍藥桂川芎當歸白术茯苓七味爲麤末煎服

之主胃風
人參黃耆甘草三物湯治暑發渴
黃耆甘草二物湯治膚痛內加防己爲防己黃耆湯
十全散減黃耆甘草熟地黃即胃風湯也內經有
結陰便血一條　初結一升再結二升三結三升

芍藥甘草例

仲景芍藥甘草湯
白芍藥四兩　甘草
芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以收之甘以

緩之酸甘相合用補陰血右　㕮咀水二升煮
取一升半去滓溫服

甘草乾薑湯
甘草炙四兩　乾薑炮二兩
右㕮咀如前煎服之

四逆湯
甘草　乾薑　附子
右三味依法煎服

芍藥甘草附子湯　芍藥甘草黃芩湯

甘草一物湯

傷寒類要又甘草一物湯

治傷寒脉代見心悸動危困者

甘草二兩水三升煮取一升半服七合日二亦治

肺癰

仲景炙甘草湯

治傷寒脉結代心悸動此湯主之屬太陽證也

甘草　生薑　人參　桂枝　大棗

麻仁　生地　麥門　阿膠麸炒熟各等分

右㕮咀每服用五錢水一盞半酒一盞煎至八分

去滓入膠鎔服

東垣先生芍藥甘草例

芍藥二甘草一湯　脉弦加防風川芎脉洪加黄芩

脉緩加桂枝脉濇加當歸脉遲加乾薑大便軟加

白朮小便濇加茯苓　穢痢濇服諸藥不効神應

丸

桂苓例

桂苓丸

烏梅肉一兩　桂半兩　茯苓二兩

右焙梅乾桂苓皆忌見火三味同爲極細末煉蜜

丸如雞頭子大每服十丸細嚼白湯送下津嚥亦

可

荔枝煎

烏梅肉焙乾一兩　乾木瓜半兩　神麴七錢炒微

白茯苓七錢　豆粉生用一兩　桂去粗皮半兩

右麴粉別爲細末餘四味碾極細後入麴粉和勻

煉蜜作挺每挺一兩可作十丸津化下草豆蔻御

方思食丸同

千里漿一名水葫蘆丸見

木瓜半兩　紫蘇葉　桂去皮各一兩　烏梅肉

赤茯各一兩

右爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼津化新

汲水亦得

烏梅散治下痢後渴少大渴引飲不休

烏梅兩半　茯苓去皮一兩　木瓜一兩　一法加桂三錢

右㕮咀每服五錢七升一盞生薑三片煎至七分

服
紫蘇湯治煩悶口乾多渴咽痛不利手足煩熱
紫蘇葉三兩 甘草五兩 烏梅肉四兩 杏仁一兩去皮尖 鹽五兩
右爲細末每服三錢湯點服
大順散此法出於枝乾薑甘草例
桂 乾薑炮各八分 甘草炙六兩 杏仁八兩
桂苓白朮丸
五苓散內去猪苓加蓮荷半夏陳皮糊丸又加黃
連黃檗爲堅中丸

又千里漿
麥門冬 紫蘇葉 木瓜 甘草炙
白茯苓 烏梅肉 杏仁去皮尖各半兩
川百藥煎一兩
右爲細末酒糊爲丸如櫻桃大含化一法去牟牛
蜜丸螞固劑一丸含之亦名水葫蘆
又方
百藥煎 烏梅 紫蘇 人參
甘草 麥門冬

右各等分爲末熱湯點服
荔枝湯
烏梅 甘草各三兩 白芷半兩
百藥煎二兩 白檀半二錢
右爲末點服
梅葛散
百藥煎 烏梅肉 甘草各一兩 丁香
右細末點服
桂漿出一十料例

桂三兩去粗皮 白茯苓去皮三兩 麥門冬半兩 神麯半兩
右四味爲細末蜜三斤熟水一斗一法加烏梅
蜜酒
好蜜二斤 水一碗 細麯二兩 好乾酵二兩
右先熬蜜水去滓沫令絕冷下酵每日三攪三日
熟
神朮湯拾遺
神朮加藁本湯 神朮木香湯治山嵐霧露之氣
菩薩散治

是神朮湯內加荊芥白蒺藜細末每服酒亦
可

仲景烏梅丸 治傷寒嘔吐後又用治下利

烏梅三百二十箇 細辛一兩半 乾薑一兩半
黃連四兩 當歸一兩 附子一兩 桂枝一兩
人參二兩 黃蘗二兩

右將烏梅好醋浸一宿去核蒸之五斗米下飯熟
杵成泥和藥令相得臼中與蜜杵二千下丸如桐
子大食前飲下十丸日三服加二十丸分兩隨證
主治加減 炙分兩在陰陽條

錢氏芍藥蘗皮丸

芍藥 黃蘗

守真蘗皮丸

芍藥 黃蘗 黃連 當歸

四信散

黃連 黃蘗 芍藥 乾薑

孫用和治血痢以膩粉五錢定粉三錢同研勻水浸
蒸餅爲丸菉豆大每服七丸或十丸艾十枝水一
大盞煎湯下湯多尤佳

古方駐車丸

黃連六兩 乾薑 當歸 阿膠各三兩

右以上三味搗篩以三年米醋煮阿膠令消和藥
衆手撚丸梧子大飲服三十丸飲下日三如無三
年醋只用釅醋

蘗皮湯 治久血甚驗

蘗皮 黃芩各一兩

右㕮咀每服四五錢水二盞煎至一盞去滓入阿
膠三片再煎膠散服腹痛甚者加梔子一兩小便
不利者加茯苓六錢

活人黃連阿膠湯 治熱毒入胃下痢膿血

梔子 黃連 黃蘗

右㕮咀依法煎服

活人三黃熟艾湯

治傷寒三四日大熱下利熱藥不能止

黃芩 黃連 黃蘗 熟艾

海藏云以上苦寒之藥元病不經內傷冷物者宜服

亦當察人之虛實及以脉別之

經曰脾脉外鼓沉爲腸澼久不已外鼓謂動於臂外也肝脉小緩爲腸澼易治肝脉小緩爲乘脾故易治腎脉小搏沉爲腸澼下血小爲陰氣不足搏爲陽氣乘之熱在下故下血也 血温身熱者死然血温身熱陰氣衰亂故死 心肝澼亦下血肝藏血心養血故澼皆下血也 右二臟同病者可治心火肝木火相生故可治 其脉小沉濇爲腸澼心肝脉小而沉濇者澼其身熱者是火氣內

經云心而歸於外也故死火成數七故七日死

仲景治痢紫參湯

紫參半斤 甘草二兩

右以水五升煎紫參取汁二升入甘草再煎去一升分作三服放温服之

扁鵲云若衄血吐血脉當沉細若反浮大而牢者死

叔和云衄血吐血沉細宜忽然浮大命傾危經云泄脱血而脉實若過於此皆曰難治 又云血温身熱者死

黄連加減例當在手少陰條下此因利在陽明故列於此

加豆蔻木香爲豆蔻香連丸 加陳皮爲橘連丸

加訶子木香爲小香連丸

黄連 加黄蘗爲二聖丸 加木香白附子爲白附香連丸 加榆仁爲榆仁丸 加阿膠茯苓爲阿膠丸 加阿膠乾薑當歸爲駐車丸

牛蒡子根散 以下[illegible]

治汗不流古方云之此是汗出時蓋覆不週汗出不勻以致腰背手足緩搐

牛蒡根二條 麻黄二兩 牛膝二兩 天南星二兩

地龍二兩

右牛蒡根去皮切研諸藥入砂盆內研細好酒一升同研爛新布取汁後用炭火燒一地坑子內通紅去炭掃盡藥汁內坑中再以火燒黑色將出於乳鉢內細研每服半錢温酒調下日三服用和親患三年服之効

玄胡丸 治身體疼痛利傷寒丸藥續例並木方證後

玄胡 當歸 青皮 陳皮

三稜　廣茂　木香　乾薑 炮研為細末各一兩

雄黃 二錢研細入藥末同研

右醋糊丸桐子大每服三二十丸白湯下解利內外傷詩曰

玄歸三廣木　青陳莪斑黃　醋糊丸桐大

偏宜內外傷

紫霜丸

治傷寒溫壯內夾冷實或已得汗身熱不除及變蒸發熱日久不解因食成癎俗呼為食迷風

代赭石 火煅醋淬　赤石脂 各末各一兩　巴豆 三十箇去皮膜炒研

杏仁 五十箇去皮尖麩炒另研

右用研勻湯浸蒸餅為丸黃米大小兒初生三十日以外可服一丸半歲一年二年可用三丸乳下米湯亦得

無名丸 解內外與四生飲相似在汗夏劑條下

貫衆　茯苓　代赭石 各一兩醋淬

自然銅 三兩二錢醋淬九次　寒水石 四兩燒六粉

黑豆 去皮研四兩

右件為細末小麥麪為丸菉豆大生薑湯送下五十丸

此藥不知來例別無解例味數止是貫衆治頭風有毒解毒大抵解疫癘毒氣則效非若古法之分經也　本草云代赭石苦甘寒主鬼疰賊風

自然銅辛平無毒療折傷散血止痛　貫衆治頭風　半夏治傷寒寒熱巴豆辛溫主傷寒溫瘧寒熱或煎亦解利　此三藥雖云治傷寒止治因內感而發出之外多效若外感一日太陽受之不宜

用此不知藥性者不可執此解利外感此藥大抵止治內不能行經若欲行經非湯液不能也　代赭石自然銅二味兼以醋淬煆以苦酒與火力同能上行故解利也　若以代赭自然二石以性論下行之體無疑要當詳紫霜丸主治傷寒溫壯內夾冷實一句只知無名體也

天麻朱砂丸 治內外傷

天麻 一兩　雄黃 半兩　朱砂 二錢　巴豆 去皮膜出油半兩約二錢半

右為細末蠟和作錠子旋丸如黍米大每服三五

丸以酒或湯送下俱得食後　或別丸內有細辛

乾薑苦酒與此一體　本草云雄黃味甘治百節中大風所以解利

安先生傳易老解利二藥

狼毒　大戟　草烏頭 生用各等分

右為細末醋糊丸桐子大每服五七丸或十丸溫水下

解利傷寒㗜藥

乾山藥　藜蘆 去蘆等

右為細末紙撚㗜之

楊氏內解丸

芫華　紅藥 各等分

右為細末生用醋糊丸如菉豆大溫水下一丸少頃以葱醋米湯投之無時

四生丸

天南星　半夏　芫華　自然銅 各等分

右為細末醋打蕎麥麵為丸菉豆大　酒積痰飲胞脹腹滿食飲不消五丸臨臥溫水下忌熱物

傷寒時疾豆豉湯下十五丸三服解心氣大痛溫醋湯下

醫壘元戎卷第二

明醫[illegible]藥性[illegible]大全卷

越州教授進之王好古纂次

兩浙運司西湖[illegible]重刊

兩浙運副姚江嚴[illegible]校正

陽明證　先足經從湯液，次手經從類例

仲景白虎湯

治身熱頭痛鼻乾不得臥，尺寸脈俱浮而長；又治傷寒脈浮滑，此表有熱，裏有寒，非寒冷之寒，寒邪之寒熱也。

石膏[illegible]錢　甘草[illegible]錢　知母一錢[illegible]

粳米[illegible]

右[illegible]每服五錢，七水一盞半，米熟去滓溫服。

白虎加人參湯[illegible]

白虎加蒼朮湯[illegible]

白虎加桂湯[illegible]

白虎加梔子湯[illegible]

白虎加五味湯[illegible]

竹葉石膏湯

氣足則便不消數

腎壯則[illegible]不思飲

治傷寒解後虛羸少氣，逆欲吐。

石膏二錢　人參半錢　粳米[illegible]　半夏[illegible]錢

甘草一字　竹葉五片　麥門冬[illegible]錢

右為麄末，每服五錢，七水一盞，煎至米熟溫服。

張仲景炙甘草湯[illegible]

此本太陽證，當例於太陽條下，胞者肺之府也，故入陽明例。

活人五味子湯[illegible]

人參[illegible]三錢　五味子[illegible]　陳皮[illegible]錢半　麥門冬[illegible]

[illegible]

右[illegible]水二盞半，煎[illegible]去滓分二服。

[illegible]湯　益氣之源以消陰翳[illegible]

[illegible]湯　[illegible]飲水[illegible]　腎氣丸

[illegible]消穀善食而瘦　[illegible]丸

治[illegible]太陽不止，消中足陽明，消腎足少陰[illegible]

消中，而數小便　內化丹　麥門冬湯

易老順氣散　小承氣湯也　鳳髓丹　化水丹

壯水之主以制陽光，則渴飲不思。

仲景諸瀉心等湯 手少陰也以其心下痞故入陽明例又況服梔子黄芩黄連黄蘗大黄爲上經之制安得不例陽明乎

大黄黄連瀉心湯

治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虚陰陽氣并竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面青黄膚瞤者難治若色微黄手足温者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者

大黄兩二 黄連一兩 加黄芩爲伊尹三黄湯

右二味剉如麻豆沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒汗出未以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

大黄 黄連 黄芩 附子

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹内雷鳴下利者此湯主之

生薑二兩 甘草 黄芩 人參各兩半

半夏三兩 乾薑半兩 黄連半兩 棗六枚

右八味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半温服半升

治肺腎二經方也

易老門冬飲子一名生脉散 治老弱虚

人參二錢 五味子 麥門冬半兩去心 枸杞三錢

甘草[illegible]

右㕮咀[illegible]與肉化丹相表裏手太陰足少陰[illegible]也

且開[illegible]人[illegible]石膏湯以此外[illegible]也 [illegible]能息風入經[illegible]麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬 甘草 粳米

右麥門冬去心爲細末水一盞先煎粳米令[illegible]去米約得湯一小盞半入藥五錢七棗二枚竹葉十五片同煎至一盞去滓大温服不能服者絲

滴口中　後人治小兒不能漉去者宜用之綿滴
法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼白欲欬
之人陽氣將絶也故不用石膏若加人參尤妙

玉露散

寒水石半兩　石膏半兩　甘草一錢半生半炙

右爲細末湯調服

外臺蒸病一曰骨蒸二曰脉蒸三曰皮蒸四曰肉蒸
五曰内蒸各隨臟主又二十三蒸各應丸湯液主
之盡矣　五曰内蒸所以言内者必外寒熱把手
附骨而熱也其根在五臟六腑之中心
因病後得之骨肉自消飲食無味或皮毛燥而無光
澤蒸極之時四肢漸細足趺腫起石膏十兩研如
乳粉法水和服方寸七日再以體涼爲度

類要治骨癉飲少小便多

秦椒一分出　瓜蔕二分末

右水調服方寸七日三服此方服之令人多吐宜
約量多少不可太過一升分三

伊尹甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀
不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安
醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結
熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也宜此湯主之

甘草二兩　半夏一兩　黄芩　乾薑各三兩半

黄連半兩　人參半兩　棗六枚

右七味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半
溫服半升分三　伊尹湯液此湯也七味今監本
無人參脱落之也伊尹三黄湯無黄芩亦後人脱
落之也

半夏瀉心湯

治下利而不痛者爲痞也痛即爲結胞

半夏一兩一錢半　黄芩　人參　甘草一兩半炙

乾薑一兩半　黄連半兩　大棗六枚

右水五升煮取三升去滓再煎一升半溫服半升
分三

錢氏瀉心湯一物　易老亦用一物瀉心湯導赤散
瀉丙　瀉心湯瀉丁

導赤散

生地黃　木通　甘草　竹葉等分

右㕮咀水煎去滓服一法去甘草加黃芩爲火府用煉蜜爲丸彈子大細嚼竹葉湯下

一物瀉心湯

張子倫先生爲泄斑湯其法見斑論改誤

伊尹三黃湯錢氏改爲丸治吐血黃斑

活人黃連解毒湯四味無大黃亦得與四物湯相合爲各半湯　守眞爲既濟解毒丸

活人解毒四味　海藏加防風連翹爲五黃丸亦合防風金華丸治風熱　加柴胡治小兒潮熱加葛根治酒毒加蘆薈青黛爲衣治小兒肝熱并疳熱食塗上腳面黃腹大而足細久則不治

仲景茵陳蒿大黃湯

治濕熱發黃

茵陳蒿六　大黃三　梔子二

梔子蘗皮湯二物

治燥熱發黃

文潞公藥準

仲景茵陳蒿大黃湯治發黃大便自利不止者加黃連黃柏各三兩今加大黃用之多效　梔子蘗皮湯加大黃黃連活人合而用之改名解毒湯仲景本方無黃芩今議方復有黃芩　活人用之伊尹湯液大黃黃芩并脫落之也　文潞公連蘗二物湯治黃有神寒熱者加小柴胡湯

李思訓論義

發黃有陰陽然當猶爲末也太陽者大渴而不與水

炎熱而不通風是也陰黃者解之原藥過劑施之而遂陷陽和既亡此一句當時不無陰候也言黃證皆陽壞而成陰不必直指有陰證故治黃茵陳蒿爲君佐以大黃梔子之屬是也若太陰有黃不必茵陳蒿內用乾薑只用理中溫藥足矣既有茵陳蒿乾薑湯則知熱證壞而成陰也學者要窮其源故大病主藥內加熱以溫之也謂如桂枝加芍藥桂枝加大黃皆於本藥外所可宜者加之也

大黃黃連瀉心湯　文潞公金匱要略爲三黃

丸錢氏改爲三黃湯去黃芩爲二聖丸二味等分細末猪膽湯煮熟如菉豆大每服十丸米飲下

香連丸治泄利　橘連丸疳瘦膽煮粟米粥爲丸　積病發熱脾虛也黃久不去者有積也補脾磨積則可不可用涼瀉之藥

活人酒煮黃連丸

治暑毒伏深久不差無藥可治大渴者宜此右黃連四兩無灰酒浸上一寸以重湯熬乾瀝爲細末糊丸梧桐子大熱水下三十丸胞中清涼不渴爲愈

此後治黃疸醫所不能治水茵汁頻飲一小升平旦服食後須微汗小便出愈不爾再服

紅丸子

治大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老小並宜服之

京三稜三斤水浸軟切作片子　蓬莪朮五斤　陳皮五斤揀淨

胡椒二斤　青皮五斤　乾薑三斤炮

右六味同爲細末醋糊爲丸梧桐子大　紅爲衣每服三十丸食後薑湯吞下小兒臨時加減服之

易簡紅丸子 脩合治劑之法並見前方

三稜　蓬朮　陳皮　青皮

胡椒　乾薑　阿魏　礬紅

右每服六十丸薑湯送下大治大人小兒脾胃等患用極有神效　但三稜蓬朮本能破癥消癖其性猛烈人不以此爲常服之劑然今之所用者以出産之處隔絶二藥不得其眞乃以紅蒲根之類

代之性雖相近而功力不同年老虛人小兒妊婦以此治病不能傷耗眞氣但服之無疑　此藥須是脩合令精細用好米醋煮陳米粉爲丸若自修合之時當去阿魏礬紅名小橘皮丸尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈　大病之後穀食難化及治中脘停酸並用薑湯下　脾氣痠疾生薑橘皮湯下　酒疸穀疸遍身皆黃大麥湯下　兩脇引乳作痛沉香湯下　脾食積面黃腹脹時或乾嘔煨薑湯下　婦人脾血作痛及血癥氣癥並

經血不調或過而不來並用醋湯下　寒熱往來者尤宜服之　産後狀如癲癇者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以此藥用熱醋湯下其效尤速

男子婦人有癲癇之患者未必皆由心經畜熱者亦因脾氣不舒遂致痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼藥過多則昏亂益甚當以此藥用辰砂爲衣以橘皮煎湯下名小鎮心丸婦人惡吐嘔逆全不納食諸藥不効惟此最妙仍佐以二陳湯服之疑其墮胎必不信服每每易名用之特有奇功然恐姙婦服之後偶爾傷動必歸咎於此藥故不敢極言其妙　痰迷者紅丸子　心熱者妙香丸

小便不利煩燥喘渴加茯苓猪苓滑石當歸官桂

燥煩喘嘔不渴加陳皮白木半夏生薑茯苓

四肢逼身冷加附子甘草

茵蔯萬治肢體逆冷腰上自汗加

附子　乾薑　甘草

茵陳附子湯未已其脉上加　吴茱萸　附子

乾薑　木通　當歸

韓氏立名雖曰茵陳茯苓湯茵蔯橘皮湯小茵蔯湯茵蔯四逆湯茵蔯附子湯茵蔯茱萸湯大抵只是仲景治陰證加茵蔯也用者要當識之此證畐是濕熱與寒濕故入陽明例謂陽天五之氣也

丹砂丸　勞復後月中又徧身黄

丹砂　馬牙硝　麥門冬

犀角　牛黄　金箔

右治下後不任承氣者宜丹砂丸服扮一錢下之用砂糖輕粉新汲水調下煩燥病源云陰少陽勝也陰病亦有煩燥病　少陰病吐利煩燥四逆者死、結胞證有煩燥者死　大青龍亦有煩燥而燥也　金匱竹皮大丸主虚煩住、又茯苓散猪苓湯並主煩燥、　少陰病吐利手足逆冷煩燥茯苓四逆湯、發汗吐下後復煩燥不解者茯苓四逆湯、少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者吴茱萸湯　又八正散治煩燥住、

仲景梔子豉湯治懊憹煩燥不得眠

梔子四箇　豉半兩

右水二盞煎梔子至一盞入豉煎至七分溫服得快止後服　一法加甘草三錢半本非吐藥以燥濕鬱甚以此攻之不能開通則反吐因吐則發泄鬱結之氣及行津液而血氣宣行若少氣加甘草以其邪在上焦而不受藥故吐之　梔子甘草豉湯　嘔者加生薑三錢

梔子厚朴湯 治傷寒下後心腹脹滿起臥不安

梔子四兩　厚朴一兩　枳實一枚　生薑　水煎

梔子乾薑湯 治傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩

梔子十四枚　乾薑二兩　右水煎服

已上五法皆汗下吐後用之以邪氣留於胸中若在高之分故臨證加減用之經曰其高者因而越之

活人薤白湯 治下利如爛汁

梔子　豉　薤白

右剉先煮梔子次下薤白次豉水三升煮取一升

涼膈散　此藥陽明兼少陽血中之血藥

梔子　大黃　芒硝　黃芩

薄荷各半兩　桔梗　甘草各一兩　連翹七錢半

右㕮咀每服五七錢水煎服臨臥時服加生薑亦可若泄之劑下行居膈半錢渡江非舟楫不能載此藥大緊治左寸沉實而可下者本方無桔梗一法加防風　治肺金邪熱嗽有痰者加半夏　易老減大黃硝解傷寒雜病六經中熱涼膈與四物湯各半服能益血泄熱一名雙和散

文潞公藥準註李琬方

山梔子　防風　連翹　柴胡　甘草

活人梔子連翹防風甘草湯服少陽　錢氏去連翹加藿香石膏為瀉黃散　內經云諸氣憤鬱皆屬肺金凡人有此疾不可不用薄荷故劉禹錫用此藥以治憤氣發腫利關節也　易老涼膈散去大黃硝治六經中熱說得極有理何以知之陳士良云柴胡能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜服　又云柴胡主風氣壅併攻胞膈當茶食之以此知易老之言有自來矣

薄荷例　此藥手太陰兼厥陰故入陽明例

薄荷例（十存有見易方今用御藥院料例）

薄荷葉（半斤）　甘草（一兩）　防風（三錢）

縮砂仁（三錢）　桔梗（一兩）　芎（七錢半）

御藥院蜜料藥一斤蜜二斤煉開便和　去砂仁加龍腦羌活荊芥甘菊大黃白芷人參爲八風丹朱砂爲衣

局方川芎丸　即名不换金另有卯藏在後

川芎（七錢半）　細辛（半錢）　防風（二錢半）

薄荷（七錢）　桔梗（一兩）　甘草

右細末煉蜜丸一兩半分作五十丸嚼一丸茶清下食後　一法川芎丸如枳殻除熱痰嗽　去桔梗加荊芥白殭蚕天麻羌活白附子川烏頭全蝎名爲不换金丹硃砂爲衣

防風丸

防風　川芎　甘草　天麻（已上各二兩）

右爲細末煉蜜丸硃砂爲衣荊芥湯茶酒任下每服作十丸

生明丸

薄荷葉　川芎（各七錢半）　縮砂仁　甘菊花（各半兩）

右爲細末蜜丸每兩十丸

二白丸　海藏法治虛人禁寒藥

白檀　白芷　人參　川芎

白茯（各二錢）　防風（錢）　藿香（錢）　桔梗（半）

細辛（二錢）　砂仁（二錢）　甘草（錢）　薄荷葉（錢）

右爲細末蜜丸彈子大嚼一丸茶清下

枳殻丸

薄荷煎加蒼术木賊甘菊枳殻荊芥

薄荷湯（治風痰 [illegible]）

薄荷（二兩）　甘草（七錢半）　瓜蔞根（一錢）

荊芥（半兩）　砂仁（二錢）　鹽（炒一錢入分）

右細末每服一錢點服

清神散

薄荷葉（三兩）　白檀（二兩）　人參（一兩）

荊芥穗（二兩）　甘草（二兩）　石膏（二兩 [illegible]）

細辛根（五錢）　羌活（二兩）　防風（一兩）

右細末每二錢點服

上清散

乾菊花一兩 細辛三錢 川芎 薄荷

石膏 甘草 防風 羌活各一兩

荊芥穗一兩

右細末茶湯調下

香甲散

川芎 青皮 白芷 乾菊 甘草

右爲細末茶調下

消風散 [illegible]

川芎 羌活 人參 茯苓

荊芥 藿香 防風 甘草

殭蠶炒 蟬殼各半兩 厚朴製 陳皮去白各三錢

右爲細末茶酒任下治沐浴感風寒小兒用乳香荊芥湯調下半錢無時

神芎散

治偏正頭痛夾腦風沐浴傷風等證服者同

甘草一兩 薄荷 石膏 羌活 獨活

甘菊 荊芥 川芎炙一兩

右細末茶清下如覺頭風兩角痛客主人是也俗呼爲之太陽穴

又點鼻方

人中白 地龍去土等分

右爲細末羊胆丸芥子大用一丸新水化開點鼻中立止

化風散治痰厥偏正頭痛一切傷風

荊芥 甘草各二兩 石羔四兩 薄荷

人參 羌活 細辛 防風 白檀各一兩

右水清茶調下

化風丹 [illegible]

防風半斤 羌活四兩 白芷四兩 桂一兩

麻黃三兩 川芎二兩 川烏炒二兩 蒼朮一兩

乾薑炮一兩 甘草炙二兩 皂莢一兩去皮子

右爲細末酒浸蒸餅爲丸雞頭子大嚼一二丸茶酒任下

三陽頭痛

羌活　防風　荊芥　升麻
葛根　石膏　柴胡　川芎
芍藥　細辛　白芷　葱白
若陰證頭痛只用温中藥足矣如理中薑附之數
本草註　挑花湯　赤石脂例當在手陽明條下
仲景桃花湯 [illegible]
赤石脂 [illegible]　乾薑 [illegible]　粳米 [illegible]
右以水七升煮米熟爲度去滓每服七合內石脂
末方寸匕日三服一愈後止再服不必盡劑

局方赤石脂丸 [illegible]
[illegible]　附子 [illegible]　赤石脂
[illegible]　[illegible]散 [illegible]
[illegible]爲末煉蜜丸如梧子大先服一丸不知稍加
[illegible]亦治婦人腹中痛下下痢裏急[illegible]純
下血梔子蘗皮湯　治大冷洞利腹滿[illegible]
痛駐車丸　孫用和治下利又血熱痢蘗皮湯
若屎血可加延胡索散
古方駐車丸

黃連六　乾薑二　當歸二　阿膠六
右先以醋煮膠令消入前三藥和均衆手丸梧子
大米飲下三十丸
古方三黃湯後人以爲蘗皮湯
黃連一　黃芩二　黃蘗三
每服四五錢水一盞半煎至一盞去滓入阿膠二斤
煎化服之　痛者加蘗子　小便不利加茯苓槩
久血利甚効
延胡索散 [illegible]
延胡索一分　朴硝二分
右以水煎服之
東垣二紅丸
治小腸下利夜多晝少左手寸脉弦細甚復而至
壬下補丹田四肢厥冷手足心反温是爲効也
硃砂　附子　乾薑　赤石脂
右細末酒糊丸桐子大米湯下少時以物壓之急
劑不可緩也
東垣三白丸

乾薑一兩　白石脂　寒水石　龍骨燒各半兩

右細末生薑自然汁打糊爲丸桐子大米湯下少時以物壓之　以上六味藥東垣先生製藥性云

白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

東垣調氣方

治赤白痢黃連膠蠟煮散並見本草宋王徽桃飴贊云

阿膠續氣並見阿膠條下

白石脂　乾薑等分

右百沸湯和麵爲丸搜和併手桐子大晒乾米飲下三十丸久痢不定加至六十丸　霍亂煎漿水爲使

赤石脂散

甘草五錢　赤石脂半兩　縮砂仁四兩

右細末米湯點服　脉弦者加防風　脉洪者加黃連　脉澁者加當歸　脉遲者加乾薑無論寒熱久病者只加乾薑　一法加龍骨肉豆蔻爲豆蔻固腸丸

千金翼曰治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷水反吐不停赤石脂散主之

赤石脂一斤

搗篩服方寸匕酒飲任服稍稍加至三服七服盡一斤終身不吐冷水又不下利補五臟令人肥健有人痰飲服諸藥不効服此即差　小兒臍汗出不止并赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良

仲景赤石脂禹餘粮湯　此當在手太陽明條下

治不應下而下之泄不止醫與理中之類其泄益甚此寒在下焦故以赤石脂禹餘粮湯主之

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名比金丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小便淋瀝夜多盜汗久瀉久

溫酒嚥下　腸風便血調百草霜下　若休息痢疾烏梅湯下治痃湯大槩如此　若男子應有走失或泄瀉之後當服者以棗湯下　婦人應是虛損或失血之後當服當用醋湯就中湯使或是服餌不使者當斟酌易之　此藥極固秘元氣無飛走之性服之不致僭燥但是微濇并肥俾人不宜用此常服恐滿滯氣血爲癰節之患　若用以治痢極有功効不拘此說

桃華丸

赤石脂二　乾薑一　或加烏附炮半

右爲細末稀糊爲丸桐子大每服三五十丸米飲下久痢便紫血者當歸湯下　治內赤石脂乾薑附子　治庚白石脂附子乾薑

局方赤石脂縮砂仁茯苓甘草散

活人赤石脂丸

赤石脂　乾薑　當歸　黃連

右爲末蜜丸桐子大米湯下二十丸

五物厚腸丸

赤石脂　乾薑　附子　吳茱萸　肉豆蔻

固腸丸

赤石脂　乾薑　厚朴　肉蔻　砂仁

木香各半兩　炮製蒸如法

右細末糊丸桐子大生薑米湯下空心

旋覆代赭石例

仲景旋覆代赭石湯　瘕證

右傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿或傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者

旋覆花一錢　人參半錢　半夏一錢　生薑一錢

代赭石半　甘草二分　大棗一枚

右㕮咀每服五錢七水一盞半煎至八分溫服

旋覆華湯

治風熱而生赤瘍鼻頭赤面紫黑者當刺出血

人參　生薑　甘草　茯苓　旋覆花去梗各等

荊芥　芍藥　柴胡　枳實各一錢

右麄末以水四盞慢火煎至二盞半去滓分三服
溫飲又葛根升麻湯加黃芩枳殼
仲景治婦人有三物旋覆華湯　胡洽治痰飲在兩
脇間脹滿等證旋覆華丸
酒齇　日華子云山茱萸煖腰膝助水藏除一切風
逐一切氣破癥瘕治酒齇　汗出見濕乃生痤疿
痱爲痤癤也　勞汗當風薄爲皶鬱乃痤痤色赤
膹內有膿血
旋覆華丸

旋覆華三兩　防風　白芷　乾薑　天麻
天南星　半夏　石膏　川芎　陳皮各半兩
白附子半兩　蝎稍　殭蚕各炒三錢
右細末薑糊丸桐子大薑湯下三五十丸食後服
活人金沸草散
治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋急時發寒熱
皆類傷寒
旋覆華兩　荊芥　前胡各一兩　甘草一
赤茯苓　細辛　半夏各二錢湯洗

右細末每服三錢水一盞生薑十片棗一枚同煎
七分熱服
局方金沸草散
治風化痰頭項強寒熱身體疼咳嗽滿喘及時行
痰氣壯熱惡風
旋覆花去梗　荊芥穗　前胡　麻黃去節各一兩
甘草炙　赤芍藥　半夏湯洗各二錢
右㕮咀生薑棗煎無時寒邪則汗出風邪則解利
千金翼旋覆華湯

治胸膈中痰結如膠臍下膀胱留飲
旋覆花　細辛　前胡　甘草炙　茯苓
半夏洗一兩　生薑八兩　桂心四兩　烏頭五枚去皮熬
右九味切以水九升煮取三升分爲三服忌豬羊
餳及生菜等肉加澤瀉尤妙
外臺旋覆華丸
治心頭痰積宿水嘔逆不下食
人參半兩　甘草半兩　半夏三錢　旋覆花三錢
白朮半兩　澤瀉二錢　枳實半兩　大黃三錢

右細末生薑糊爲丸桐子大生薑湯下無時

范江旋覆白朮茯苓湯

治胸中痰結臍下弦滿又治風水證

旋覆花一兩 白朮一兩 陳皮一兩 茯苓一兩 桂去皮一兩

細辛半兩 附子炮 半夏製 當歸各半兩

右九味剉每兩分三四服水二盞生薑十片碎同煎至七分飲清臨卧食後忌猪羊肉食餳飴生菜滋味等物

仲景茯苓飲

治胸中停飲心下痞水吐水虛滿不飲食

茯苓一兩 白朮一兩 枳實七錢 陳皮半兩

人參一錢

右剉每服分四服水二盞生薑一錢同煎至七分取清飲無時

千金翼大五飲丸

上一留飲心下二澼飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五留飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

遠志去心 苦參 藜蘆 白朮 烏賊骨 甘遂

大黃 石膏 桔梗 五味子 半夏炮 紫菀

前胡 芒硝 栝蔞 桂心 蓯蓉 貝母

芫花 人參 當歸 茯苓 芍藥 大戟

葶藶 黃芩已上各一兩 常山 甘草 薯蕷

厚朴 細辛各三分 巴豆一十枚去皮心熬

右三十二味細末蜜丸桐子大酒下三丸日三稍加之忌肉食生物餳飴冷水等物

海藏五飲湯

人參 陳皮 枳實 旋覆花 白朮

茯苓 厚朴 澤瀉 前胡 桂心

芍藥 甘草 猪苓 半夏已上各等分

右㕮咀每服分四服水二盞薑十片碎同煎至七分水清溫服無時所忌同上及滋味等物

海藏云五飲雖胸膈心下脇間膀胱胃中腸藏府不同俱在身以前故入陽明例　五飲湯若因飲酒有飲者加葛花縮砂仁

醫壘元戎卷第三

醫壘元戎卷第四

越州教授進之王好古纂次

明監察御史東萊桂彥恭才命梓　兩淮運同四明徐本畯重刊

兩淮運副姚江徐□世校正

陽明證　王朝奉集註譫語例

譫語無次也凡胃實有燥屎則譫語故經曰實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也非輕重之重　譫語有數種　有胃實譫語可下證也　有合病者譫語三陽合病腹滿身重口不任而垢譫語遺尿白虎湯證　有少陽汗譫語少陽不可發汗只宜小柴胡湯　有火劫譫語以火劫發汗熱氣入胃故也救逆湯　有汗多亡陽譫語不可下也宜柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液自愈　有下後譫語傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯　有熱入血室譫語陽明病下血譫語者熱入血室但頭汗出刺朞門又婦人中風經水適來譫語爲熱入血室小柴胡湯刺朞門穴有肝乘脾譫語傷寒腹滿譫語

寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰橫刺朞門穴有晝則明了夜來譫語此熱入血室無犯胃氣及上二焦不治自愈

仲景調胃承氣湯

大黃(酒浸)　芒硝　甘草

右㕮咀水煎服加生薑亦得　調胃承氣湯與四物湯各半一名玉燭散

大承氣湯(治大實大滿)

枳實(麩炒)　厚朴(薑製)　大黃(酒浸)　芒硝

小承氣湯(治大實大滿少陽陽明)

枳實(麩炒)　厚朴(薑製)　大黃(生)

海藏云調胃承氣湯治實而不滿即正陽陽明是也大承氣湯治大滿大實即太陽陽明是也小承氣湯治實而微滿少陽陽明是也太陽陽明正陽陽明爲最高之分故大黃但用酒浸從高而下之也惟少陽陽明爲最下之分處三經之內故黃不用酒浸也非若二經而高爾若最高之分用最下之藥則耳目昏冒咽頰腫痛神癡不清之病有不免

玄明粉治三
陽熱痛不治
陰毒可知

矣若果下之分用究高之藥則胸中氣消日久不
復虛損成勞之病有不免矣故仲景三承氣湯各
有主治隨經而異卽不同也　又年老虛人傷寒
可下者大承氣湯調胃承氣湯皆去硝慢火熬成
玄明粉量輕重而下之

煉玄明粉法

朴硝三斤淘淨生好牙者用砂鍋一枚盛貯以炭
火十斤煅之徐徐輕沸可住大火令大沸定以炭
蓋之復以炭十五斤緊煅至火盡放冷一伏時出

鍋中藥放紙上攤勻就地上以盆蓋之一伏時日
晒乾入甘草二兩炒微黃剉碎同搗細末更熬膠
再沸點二三錢亦可愈正經云味辛甘性冷則治
熱病明矣兼味辛又鹹此能潤燥而軟堅也非大
便燥結脈滑有力及洪大者不宜服卻言燄木滅
女子服之補血脈有失用藥寒熱之本意經云鹹
能勝血豈能補血哉又方治陰毒一句其言又爲
錯矣若與硫黃附子及諸陽藥多寡相佐而行則
可以治陰中有伏陽也若的是陰毒別無伏陽殺

人速矣太清伏煉法云硝能制伏陽精解火石之
毒則不治陰可知用者審詳也

仲景治痞病三物厚朴湯

厚朴半兩　枳實五兩　大黃四兩

右以水一斗二升煎厚朴枳實取五升大黃四兩
再煎取三升溫服一升腹中轉動失氣是也更作
一服下之不効再服易老治消渴在中爲順氣散
調胃承氣湯加蒡子寒水石爲細末煉蜜調服
治疫氣大頭病　加當歸爲滌毒散治時氣疙瘩

五發瘡瘍吹開當頭　大便軟升麻荷葉湯陽震
之象也　王朝奉鄴常器之云有大小便不通氣
結一條　有大便不通速服三承氣湯及諸下湯
不通者多是氣結必效矣可針陰會穴在兩陰之
間此數有救得者因此亦有承氣內兼巴豆下而
通者不可不知加郁李仁佳　蜜導薑銳二法在
後　氣結會食療云酒服郁李仁四十九粒更瀉
尤良

仲景厚朴七物湯治腹痛脹滿

厚朴半斤 大黃二兩 生薑九兩 桂二兩
甘草三兩 大棗十枚 大枳實五枚
右以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三服
嘔者加半夏五合 下痢者去大黃 寒多者加
生薑半斤 楊氏治身體腫滿水氣急臥不得郁
李仁一大合爲細末和麪搜作餠子與食入口即
大便通利氣便差
仲景桃仁承氣湯此下證脉在左手中其熱邪侵盡
無形之氣則入有形血也 調胃承氣湯加桂桃
仁引而入血也此方在蓄血等下
仲景枳實理中湯 煉蜜作丸如桐子大白湯下三
十丸
淡師消飲丸
治宿酒停飲胸滿嘔逆目視䀮䀮腹中水聲痛不
思飲食
白朮一兩 茯苓半兩 乾薑七錢 枳實七錢炒
右細末蜜丸桐子大空心溫水下三十丸日三服
半月愈

仲景枳朮湯治心下水 易老改二味作丸老
年內傷便軟
梅師治痞方
白朮 澤瀉
生薑煎服與枳朮湯相合四物亦作丸亦可
五苓平胃各半散 生薑調服治心下水 五苓加
石膏寒水石甘草爲甘露飲亦治心下水并飲酒
水瀉者生薑調三五錢清濁立分
雄黃銳散
治下部䘌瘡
青箱子 雄黃 苦參 黃連各三分
桃仁一分去皮
右爲散以生艾擣汁和丸如棗核綿裹內下部扁
竹汁更佳冬無艾只用散綿裹內亦得狐惑與䘌
皆爲蟲證傷寒熱入食少腸胃空虛三蟲行作求
食蝕人五藏及下部爲䘌病其候齒無色舌蓋白
唇黑有瘡忽忽喜眠上唇有瘡食其藏也下唇瘡
食其肛也害人甚急治䘌桃仁湯黃連犀角湯雄

黃鋖散

小便不通利

仲景猪苓湯

本少陰之劑以其有五苓味三故列陽明條下又
治中脘與臍下有水或小便不通

猪苓　茯苓　澤瀉　滑石　阿膠

右每服五錢七水二盞煎至一盞去滓內膠烊盡
溫服日三小便不通一切利小便藥不効以其服
附子太過消盡肺陰氣所不化師用黃連芩解毒
而得通又劉子安病腦疽服內托散後泄不止小
便大不通小渋脈陰之過諸藥不効郭子明龍用
五苓木通導之愈祕子用陳皮茯苓生甘艸之類
肺氣下行遂通若正用利小便藥其不知本甚矣○

靈苑治五腫淋疾　勞淋血淋氣淋石淋至甚者透
格散

滑石一兩無泥白者研　為細末每服二錢　虛人宜玄明粉

諸淋各依湯使于後

勞倦虛損小便不出小腹急痛菜子末煎湯通後
便須服補虛人參散　血淋小便不出時下血疼
痛滿急　熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛
並用冷水調下　氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝
木通煎湯下　石淋莖中痛尿不能出內引小腹
膨脹急痛尿下沙石令人悶絕將藥末先入銚子
內隔紙炒至紙焦再研細溫水調下　小便不通
小麥湯下　卒患諸淋並宜冷調並空心先調使
藥散如水即服之更以湯使送下服諸藥不効者
服此即愈　三焦熱淋玄明粉主之如石膏尤佳

本艸云玄明粉調下劉禹錫云偏主石林并五淋
難產　冷淋小腸不利莖中急痛用石斛葉為末
每服三錢水一盞葱白七寸煎至六分去柤食前
溫服兼治吐血去葱白不用柤冷淋熱淋俱用葱
白根取其潤而臟也

千金翼治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分三
服小便卒大數非淋也令人瘦以石膏半斤碾細
水一斗煮五升稍溫飲五合抱朴子　石淋若不
通石在小腸中覔取淋中藥煎呷有神効

檳榔散

治五淋小腸不利莖中痛

檳榔三錢麪裹煨 赤芍藥一兩

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服食前

千金難産經數日不能生出子死腹中母欲死者瞿麥煎濃汁服 亦治竹木刺不得出內者服此瞿麥汁効

八正散主治修製並見局方

大黃 瞿麥 木通 萹蓄 滑石

梔子 燈艸 甘草 車前子

本証外又治飲食過度前後陰閉有瘡諸藥不効宜服此散兼以馬齒莧及青黛爲散上之可得痊愈出衍義本草馬齒莧條下

瞿麥湯

瞿麥 木通各一兩 甘草三分 茯苓 黃芩 豬苓 滑石 萹蓄 通艸各一分

右㕮咀木煎服 渴發熱加瓜蔞根 小便赤澀加黃芩 小便少加車前子 小便澁淋加石葦冬葵子續隨子 臍下悸動加桂枝石葦

石葦散

石葦二兩 木通二兩 滑石三兩 王不留行一兩

甘草一兩 當歸一兩 白朮三兩 葵子三兩

瞿麥二兩 芍藥一兩

右爲細末湯調服

六一散

滑石六兩 甘草一兩

右爲細末調服 加當歸并泉右爲四血散

治衄血吐血便血 淋者加梔子 莖中痛加蒲黃 水瀉加車前子米飲調

梔子散治五淋見鈐註

車前子散

治水瀉完穀不化三二年久不愈瘦弱氣脫諸藥難治

車前子二兩去沙土炒 陳皮二兩 甘草一兩

右爲細末米飲調下

立効散

瞿麥一兩　甘草三分　梔子半兩

右㕮咀連鬚葱白燈草生薑同煎加連翹四兩桔梗一兩蜜丸治瘰癧結核

金鑰匙散治産後大小便不通腹脹等証

滑石　蒲黄各等分

右為細末酒調下

滑石治婦人過忍小便致胞轉滑石為末葱白湯調下二錢或三錢

塗臍法治大便不通　甘遂末内臍下白麪糊紙花了帖仍及臍下近陰處別用甘草湯服之

傷寒類要腹痛滿不得小便及天行病雄黄細末蜜丸如棗核大内溺孔中雄黄滅瘢痕黒髪梅師治妊娠淋瀝不通水道熱車前子葵根水煎服之

畜血　小便應秘而反自利其色白

小便自利

腎虚　下焦不收胞有遺溺而頻

楊氏産乳子母二方治婦人妊娠小便不利蕪菁子末水調服方寸匕日二蕪菁即蔓菁也

麻仁例　手陽明　太陽經亦可例之太陰津液不行之根

麻仁丸　脾約丸　神功丸　潤腸丸

三脘丸　五柔丸　三和散　七聖丸

七宣丸　大麻仁丸

風熱燥寒秘用　半硫丸　快活丸

仲景麻仁丸古方

治脉實数汗浮芤相搏為胃熱浮濇相搏為便難此三者皆燥而損濕故曰脾約

麻仁二升　芍藥半斤　枳實半斤　大黄一斤

厚朴一尺　杏仁一斤去皮尖熬研作脂

右六味為細末煉蜜丸如桐子大飲下十丸日三服漸加以和為度

活人脾約丸見科大紙澳數則大便難

麻仁一斤半　芍藥二兩　厚朴二兩半

大黄二兩　枳實二兩半一合　杏仁一兩半一分

右為細末煉蜜丸桐子飲下十丸未和益之汗效

腎熱便難三者皆燥而乏液故曰脾約脾約者束
置而不行也
千金翼并范任張文仲崔氏等方煎與仲景同許學
士治年老虛人秘
大麻仁　紫蘇子各半合
右碾細取汁分二作粥食之後不服藥而愈
局方大麻仁丸主治修製並見局方
陳皮　杏仁　木香
潤腸丸鑒丸

陳皮　血加桃仁　丁香
活人五柔丸主治修製並見局方
大黃　前胡　半夏　蓯蓉酒浸　當歸
芍藥　茯苓　細辛　葶藶
右蜜丸桐子大溫水下二十丸
局方中三和湯散
活人神功丸主治並見局方
麻仁五兩研　大黃二兩　人參半兩　訶子皮一兩
右細末煉蜜丸桐子大溫水下二十丸產後秘者

米飲下
局方七宣丸主治修製並見局方
東垣云治在脉則濇在時則秋
大黃　枳實　木香　訶子皮
柴胡　甘草　桃仁
右煉蜜丸如桐子大米飲下二十丸
七聖丸主治修製並見局方
東垣云治在脉則弦在時則春
檳榔　木香　川芎　郁李仁

羌活　桂心　大黃
右煉蜜丸桐子大溫水下十五丸
活人三脘散主治修製並見局方
獨活　白朮　陳皮　甘草　木香
大腹皮　紫蘇　木瓜　沉香　川芎
檳榔
右㕮咀水煎服
半硫丸
治老弱虛人大便秘者此能利之易簡云此潤劑

也

硫黃　半夏（生薑汁製並見局方條下）

快活丸（治中滿虛痞此燥劑也）

良薑　乾薑　枳實　陳皮

木香　吳茱萸

右細末麪糊丸桐子大生薑陳皮湯下

海藏已寒丸　此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩胸中發燥而渴者或數日大便

秘小便赤澀服此丸上不燥大小便自利

肉桂　附子（炮）　烏頭（炮）　良薑　乾薑

芍藥　茴香（各等分）

右細末米糊丸桐子大空心溫水下五七十丸或

八九十丸食前亦得酒醋糊丸俱得　仲景云趺

陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏

大便則難主病人復數大便亦難　海藏云已寒

上五味雖熱者芍藥茴香潤劑引而下之陰得陽

而化故大小自通如得春和之陽氷自消矣

五燥大便秘

東方　其脉弦風燥也　宜瀉風之藥治之

獨活　羌活　防風　茱萸　地黃

柴胡　川芎

南方　其脉洪熱燥也　宜鹹苦之藥治之

黃芩　黃連　大黃　黃蘗　芒硝

西南方其脉緩土燥也　宜潤溫之藥治之

芍藥　半夏　生薑　烏梅　木瓜

西方　其脉澀血燥也　宜滋血之藥治之

杏仁　麻仁　桃仁　當歸（氣病用木香）

檳榔　枳實　陳皮　地黃　郁李仁

北方　其脉遲寒燥也　宜溫熱之藥治之

當歸　肉桂　附子　烏頭　硫黃

良薑　巴豆

仲景吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發

潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循

衣摸床惕而不安微喘但發熱譫語者上識則戲

今慌語也屬大承氣湯

枳實　厚朴　大黃　芒硝

右□如常法一服利者止不必盡劑于全□並同
海藏云此治下之後大便澀也循衣摸床者熱
之極也　自氣而之血上而下之至厥陰之分循
衣摸床撮空惕而不安擲手揚視于太陰也此下
而復上也熱而不得出故厥陰復傳于太陰也

地黃黃連湯
治婦人血氣證因大脫血崩漏成前後血因而枯
燥除熱不循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖
動不寧錯語失神脉弦浮而虛內燥熱之極也氣
麤鼻乾而不潤上下通燥此為難治當服此藥
川芎一兩　當歸七錢半　梔子三錢　生地黃七錢
黃芩五錢　黃連三錢　防風一兩　赤芍藥一錢
右㕮咀每服三錢水二盞煎七分取清飲無時徐
徐與之若脉實者加大黃下之　大承氣湯藥也
自內而之外者用之血氣合病循衣撮空甚證相
同　自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之也
自血而之氣氣而復之血地黃黃連主之也二
者俱不得大便　東垣此法總論前證□□難

知　前學生云屬厥陰滑白云屬太陰自下而上
也

畜血例
衄血畜血上焦心下手不近畜血中焦且臍腹小腫
大痛畜血下焦　畜血上焦或嘔或衄或吐此胸
中手不可近也

活人犀角地黃湯　易老云此藥為氣勝
犀角如無以升麻代之　芍藥　生地黃　牡丹皮
右㕮咀水煎服　熱多者加黃芩　脉大來遲腹
不滿自言滿者無熱也不用黃芩　升麻與犀角
性味主治不同以升麻代之以是得引入陽也治
發疹大盛　如元虛人以黃芩芍藥湯主之

活人黃芩芍藥湯治鼻衄多不止欲衄血吐血
白芍藥　黃芩　甘草
一蹤治傷寒衄血吐血嘔血　一法加生地黃者

地黃散治衄血往來久不愈
生地黃　熟地黃　地骨皮　枸杞子
右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下無時

犀角地黃湯

治心經邪熱及言語蹇澀發狂心腸恍惚惑忘之疾

生犀角　硃砂　黃連各一錢　白茯苓

生地黃各半錢　甘草一錢　牡丹皮一錢

右為麁末水煎　錢氏亦治傷寒少陽陽明合病

必勝散 治男女血妄行吐血嘔血咯血衄血

人參　當歸　熟地黃　小薊根

川芎　蒲黃　烏梅肉

右等分麁末水煎去滓溫服無時

熊皮湯

治衄血吐血嘔血皆失血虛損形氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黃　甘草　黃蘗　白芍藥各一兩

右㕮咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病增損　肘後用熟地黃水酒煎飲清

[illegible]石散 治產後血迷

海浮石　黃蘗　陳皮白　甘草節各分

右細末陳米飲調下三五錢纔分娩連三服至差更無產後病　大破血點雞冠上化水為驗

治室女月露滯澀心煩恍惚

鉛白霜細研為散每服一錢地黃汁一合調下如無汁生地黃煎亦得　治鼻衄鉛白霜末新水調下一字

畜血中焦

仲景桃仁承氣湯　此即心下手不可近

易老用此獨治中焦以其內有調胃承氣湯也

桃仁　大黃　甘草　芒硝

右治牙齒等蝕數年不愈當作陽明畜血治之此湯細末煉蜜丸桐子大服之好飲者多有此疾屢服有効

畜血下焦　三焦畜血脉俱在左手中

張仲景抵當湯 脩製並見本方

水蛭三十　虻蟲三十　桃仁二十　大黃三兩

右㕮咀水煎服

許州陳大夫傳張仲景百勞丸方

當歸炒 乳香 沒藥各一錢 虻蟲十四箇去翅足

人參一錢 大黃四錢 水蛭十四箇炒 桃仁十四箇浸去皮尖

右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百丸五

更用百勞水下取惡物為度服白粥十日 百勞水杓揚百徧乃仲景瀾水也

抵當丸與湯四味同但分兩減半搗細水調服 前

之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸沒藥乳

香蜜丸瀾水下

通經丸乃仲景抵當丸內加川山甲廣茂桃仁桂蜜

丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當以四物湯大

黃各半湯下之在厥陰例四物湯調下

四血散 出診治明理論

治鼻血口血大小便血服時隨病上下食前後

紫蘇 丹參 蒲黃 滑石

右各等分細末調

又方衛州張推官在樞院王公以職醫宿直夜口傳

此方治人病者不可攻破蓄血證當用此劫丸速往

衛不可攻結胸脅滿成癥瘕

虻蟲十箇麩炒 水蛭十箇炒 狂猫去頭足炒 當歸

牡牛膝酒各二 紅花各三錢 滑石半三錢

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如

血未通再服以通為度食前

韓氏微旨方

地黃湯

治病人七八日後兩手沉脉遲細微膚冷臍下滿

或喜或妄或狂或燥大便實而色黑小便自利者

此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方

主之

生地黃自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃末一兩

生藕自然汁半升如無藕以薊刺汁半升如無薊刺汁用薊刺末一兩

藍葉一握切碎乾者末半兩 虻蟲二十箇去足翅炒黃 桃仁半兩麩炒

大黃一兩判如骰子大 水蛭十箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以來放冷

分三服投一服至半日許血未下再投之此地黃

湯比抵當湯丸其勢甚輕也如無地黃汁生藕汁

許千數浴水同煎

生漆湯

病人七八日後兩手脉沉細而數或關前脉大臍下滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便自利若病人年少氣實即血凝難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黃汁一升如無汁只用生乾地黃三兩半　犀角一兩鎊爲末

大黃三兩剉碎如骰子大　桃仁三十箇碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬三升以來傾出濾去滓再入鍋投熟光生漆一兩半再熬之至二升即住淨濾去滓放冷作三服每投服候半日許血未下再投一服候血下即止服藥如無生地黃汁更添水一升同煎

海藏云畜血可用仲景抵當湯丸恐庸醫不知藥性用之大過有不止損血之候老弱虛人之禁也故立生地黃湯虻蟲水蛭大黃桃仁內加生地黃乾漆生藕藍葉之輩也　又云生漆湯一方亦恐其抵當湯丸下之大過也是以知乾漆爲破血之劑

以之抵當湯則輕用之通則重用之破積消食則亟也食藥內乾漆硇砂非氣實不可用也

活人大黃湯

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

桃仁二十箇去皮尖　官桂七錢　大黃一兩　甘草一兩

芒硝半二錢　木通一兩　大腹皮一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煎至六分去租溫服無時此方細末煉蜜丸桐子大溫酒下二三十丸治婦人經閉或不調　右婦人經閉或不通當在此條下亦在少陽例　經云二陽之病發心脾不得隱曲女子不月　注云男子少精亦同　若登高墜下重物撞打箭鏃刃傷心腹胸中停積瘀血不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以小便同酒煎治之者更有內加生地黃當歸煎服者亦有加大黃者　又法虛人不禁下之者以四物湯加川山甲煎服妙亦有同花蕊石散以童子小便煎服抵當圓下　此藥與大承氣正分令一湯不可不辯

也若瘀血已去以後無通利前加當歸煎服亦可

又法筋骨損傷用左經丸之類或用草烏頭橐肉爲丸服之以行諸經者以其内無瘀血故用之藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可偏執也

掌中金丸治婦人鬼血氣

川山甲　草烏頭　猪牙皂角各二錢

苦丁香　苦葶藶　川椒　甘草

白附子　巴豆一錢合用研

右爲細末生葱絞汁和丸彈子大每服一丸新綿包定内陰中一日即白二日即赤三日即血神效

五通丸治婦人月水不通臍腹疼痛或潮熱少血汗

乾漆炒　紅花　丁香　牡丹皮

當歸　官桂　廣茂各半兩

右醋丸桐子大每服三十丸當歸酒下米飲亦得

女子不月帝曰何以知其婦人之懷子也岐伯曰身有病而無邪脉若身有病而脉亦病只亦不至是經不調也胞閉亦同

紅花當歸散治室女血閉不通五心煩熱

紅花　當歸　牡牛膝　桃仁炒去皮尖

右等分每服三錢溫酒調下

通經丸治室女月經不通或成血瘕

桂心　大黄　青皮　乾薑　川椒

川烏頭炮　廣茂　乾漆炒　當歸　桃仁

右爲細末先以四錢米醋熬成膏和餘末七錢丸桐子大空心醋湯下加至三十丸溫酒亦得

結胸例　大小陷胸湯丸上治並見仲景本方

仲景大陷胸湯

大黄　芒硝　甘遂

右先煑大黄至八分去滓下硝一沸止後調甘遂末一字溫服利止後服

小陷胸湯

大黄　黄連　括蔞實

右水二盞先煮括蔞實至一盞半下諸藥煎取八分溫服未利再服下黄涎

大陷胸湯

大黃　葶藶　芒硝　杏仁

右上二味爲末下二味研和末如彈子大每服一丸入甘遂末半字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服一宿未利再服

活人大陷胸湯主治並見本證

桂枝　甘草　人參各二兩　大棗三枚

括蔞實一枚去皮用四分之一

右剉麻豆大水二盞煎至八分去柤溫服胸中無堅物者勿服

治結胸聖餅子灸法

黃連去鬚一兩　巴豆十四枚去皮用

右爲細末唾和成膏安塡入臍中以艾炷灸其上候透方止神効　許學士治結胸內藥臍中並見前活法

本艸治結胸蠐螬一箇碾生絹絞汁井花水調下後見少陽蠶黿丸條

王朝奉云大小陷胸湯丸不効宜增損理中丸

乾薑炮各半　人參　括蔞　甘草

牡蠣各三兩　枳實四箇麩炒　黃芩去皮一兩　白朮二兩

右細末煉蜜丸彈子大白湯半盞煎服不歇復與之不過五六胸中豁然矣用藥神速未嘗見也本方渴加瓜蔞根不渴者除之汗者加牡蠣不汗者勿用

宿食停留結胸只見微旨方此非若已病飲水過多成水結胸也韓氏茯苓陷胸湯主之

婦人血結胸　海蛤散在少陰仲景大靈丸後活人治婦人傷寒血結胸膈而痛不可撫近者宜

海蛤散

治婦人血結胸法當刺期門仲景無藥此方疑非仲景之言然而頗有理姑存之

海蛤一兩　滑石一兩　芒硝各半兩　甘草

右爲細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膻中血聚則小腸壅滯胸中血不流宜此方若便利血行宜桂枝紅花湯治之

仲景文蛤散

治病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱

飲御不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴
宜文蛤散若不差者服五苓散寒實結胸無熱證者
與三物白散龎安常云小陷胸丸非也文蛤一兩為
散沸湯和服方寸匕

外臺治五蒸五方內有芒硝苦參蜜及青葙艾葉大
黃石膏生地黃之類皆不出湯液用者各隨經虛實
內外淺深治之盡矣

古今錄驗解五蒸湯

甘草一兩 茯苓三兩 人參二兩 乾地黃三兩
竹葉二把 葛根 知母二兩 黃芩二兩
粳米一合 石膏五兩碎

右十味以水九升煮取二升半分為三服亦可以
水二升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑米
醋范註同 一方無甘草茯苓人參竹葉

又五蒸丸

烏梅 鷄骨 紫菀 芍藥
大黃 黃芩 細辛各五分 知母四分
礬石炒 栝蔞 桂心各三分

右十一味細末蜜和丸梧子大飲服十丸日二忌
生葱生菜 一方無桂心自汗者加地骨皮無汗
者加柴胡根

五蒸

實熱 黃連 黃芩 黃蘗 大黃
虛熱 烏梅 秦艽 柴胡 氣也
青蒿 鱉甲 蛤蚧 牡丹皮 小麥
血也
肺鼻乾 烏梅 紫菀 天門冬 麥門冬
皮舌白唾血 桑白皮 石膏
膚昏昧嗜卧 牡丹皮
氣遍身氣熱喘促 人參 黃芩 梔子
大腸鼻右孔乾痛 芒硝 大黃
脉唾白浪語經絡溢脉縮不調 當歸 生地黃
心舌乾 黃連 生地黃
血髮焦 地黃 當歸 桂心 童子小便
小腸下唇焦 木通 赤茯苓 生地黃
脾唇焦 芍藥 木瓜 苦參

肉熱色白消渴　芩蘗
胃（舌下痛）　石膏　粳米　大黃
芒硝　葛根
肝（眼黑）　前胡　川芎　當歸
筋（中焦）　川芎　當歸
膽（眼白失色）　柴胡　栝蔞
三焦（作寒作熱）　石膏　竹葉
腎（兩耳焦）　石膏　知母　生地黃
寒水石

腦（頭骷髏）　羌活　地黃　防風
髓（髓熱骨中焦）　當歸　地黃　天門冬
骨（骨熱足痛蒸遂變成疳食蘞）　鱉甲　當歸　地骨（牡丹皮　生地黃）
肉（支細趺踵俱熱）　石膏　黃蘗
胞（小便黃赤）　生地黃　澤瀉　茯苓（沉香　滑石）
膀胱（左耳焦）　澤瀉　茯苓　滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成久蒸不得除變成疳病即死矣　右一方數條當在前外臺五蒸議論條下

仲景蜜導煎法外又有豬膽和醋法亦導道中崔氏依仲景法亦用豬膽汁灌下部中立通　又有蓄究（一作銳）法削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通虛人不可下者宜用以其先結後溏也

崔氏云若胃有燥屎令人錯語宜承氣湯　若大便利錯語宜黃連解毒湯　又云承氣湯舊有芒硝以其有毒故去之用之甚安如服湯不得利者用蓄究法用此又不得利者始可用加芒硝湯下之　海藏云古人詳細不妄用如此今人好用涼藥過泄之者宜觀此為鑒戒也以上諸蒸或臟病或腑病或臟腑俱病脈絡氣血交經相連用藥皆當合而用之君臣佐使上下奇偶表裏虛實逆從通塞汗下吐補俱在其中矣

醫壘元戎卷第四

趙州教授進之王好古　次
明監察御史東萊桂芳秦才命梓　兩淮運同四明屠本畯重刊
兩淮運副姚江嚴卣批校正

少陽證　先足經從湯液　次手經從雜例

海藏論男子婦人傷寒同一法

活人云婦人傷寒治法與男子不同男子調氣女
子調血以為大略舉脈緊脈緩脈洪為傷寒傷風
熱病為一證當汗當下不必調血而後行仲景不
分男女良以此歟此論然當猶為未也仲景亞聖
也世醫所知仲景不知有是理乎聖人窮物賢者
述之事可以為天下則聖人已先啟之矣何待世
人明之乎聖人不言以其男女同診也後人不知
湯液之源故立為婦人法則異於男子常人所易
曉明眼者肯以此為是乎然以藥考之則可知也
假令桂枝芍藥屬榮而閉衛非血藥如何麻黃防
風雖為之發汗本治乳子餘疾非血藥如何白虎
小柴胡中知母則治腎柴胡則調經皆氣中之血

妙論

藥也當歸地黃不言可知為血藥白朮人參皆以
為氣劑本草言能利腰臍間血非血藥乎大抵用
之在陽便是氣藥用之在陰便是血藥若男子與
女人傷寒皆榮衛受病其證一也何必云男先調
氣女先調血也此二句乃岐子以為治雜病法之
常體非為傷寒設也其所以異者以其任衝盛而
有子月事行有期有熱入血室一證不得不異也
在妊孕不得不保在經血不得不調表裏汗下何
嘗有異也無汗下藥中增損乃有調保之義活人
云妊娠不用桂枝半夏桃仁柴胡湯減半夏為黃
龍湯見則是矣必究畜血極而瞞於外須抵當湯
丸則安得不用也是藏劑從輕可也故黃帝云身
重身之何如岐伯曰有故無損亦無損也大積大
聚可輕犯也衰其大半乃生過者死此所以有從
輕之義活人注中舉似其意言其當仲景不言男子
婦人有異其意蓋尚諸此以知桂枝半夏桃仁可
用處必用不可全無但當從輕則可以保安丸中
有性桂枝附子牛膝皆墮胎之劑以其數多之中此少

名語可思

是亦從輕而無妨也。又爲引用必須少而不可無
也。大意如此從之君子更宜詳定保劑多破劑少
破者從其保。破劑多安劑少安者從其破。此理不
可不知。又寒熱多少例、寒者多熱者少熱不爲
之熱。熱者多寒者少。寒不爲之寒。
此婦人之病多在經血不調故婦人傷寒一條例
少陽條下、
仲景小柴胡湯
治往來寒熱胸脇痛而耳聾或欬或嘔尺寸脉俱
浮而弦、
柴胡一兩 人參 半夏 黃芩 甘草
右㕮咀生薑棗煎本經加減七法 此方亦治瘧
與傷病中外不相及。 雜病寒熱往來經水不調
加秦艽芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白术
茯苓去半夏、 治婦人虛勞發熱加蛤蚧赤茯苓
小柴胡湯與四物湯各半一名調經湯 無渴嘔
者加半夏亦可、無汗者加柴胡、 惡寒者加桂、
有汗者加地骨皮、嗽者加紫菀、 通經加三稜廣

8

茂勞者當歸
又小柴胡後加法 若胸中煩不嘔者去半夏人參
加括蔞實一枚。 若渴者去半夏加人參合前成
四兩半括蔞根四兩。 若腹中痛者去黃芩加芍
藥三兩。 若脇下痞鞕者去大棗加牡蠣四兩。
若心下悸小便不利去黃芩加茯苓四兩。 若不
渴外有微熱去人參加桂三兩溫覆取微汗愈。
若欬去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑二兩。
血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於
脇下。正邪分爭往來寒熱發作有時。默然不欲飲
食臟腑相連其痛必下。邪高痛下。故使嘔也小柴
胡湯主之。
易簡小柴胡湯
治傷寒溫病身熱惡風頭項強胸滿脇痛煩渴嘔
噦小便不利大便秘澁或過經未解潮熱不除非
汗非下之證並宜服之。及產後勞復發熱頭疼往
來寒熱婦人傷寒經水適來適斷發熱發寒晝則
明了夜則讝語此爲熱入血室則血必結故使寒

熱如瘧狀此藥主之小兒溫熱悉能療
柴胡八兩　半夏　黃芩　人參　甘草各二兩
右㕮咀每服伍錢水鍾半生薑五片棗一枚煎至六分去滓食前服　若腹痛去黃芩加芍藥半兩　心悸去黃芩加茯苓一兩　若不渴外有熱者去人參加桂三分溫服令有汗則解　若咳嗽去棗加五味子三分乾薑半兩　胸中煩而嘔者去半夏人參加括蔞實半兩　渴者去半夏加括蔞根一兩　胸中痞硬者加煅了牡蠣一兩　傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡則發熱已微利醫以丸藥利之非其治也宜加芒硝一兩　傷寒十餘日結熱在裏往來寒熱或心下急鬱鬱微煩或口生白胎大便不通或發熱汗出或痛中滿痛或日晡發熱如瘧或六七日目中不了了睛不和無表證大便難身發熱者實也去人參加枳實大黃一兩名大柴胡湯服之以利為度熱除不宜遽用補藥仍忌羊肉腰子酒幷難化之物或有所傷是名食復難以治療切宜忌之

逍遙散上治傷熱 並見婦方
柴胡二兩　當歸　芍藥　白朮　茯苓
薄荷少許　甘草炙兩
右㕮咀生薑煎服　勿部云治婦人大人小兒男女同法

易簡逍遙散
治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸
白茯苓　白朮　當歸　白芍藥　柴胡各一兩
甘草半兩
右㕮咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服無時　一方名人飲治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩燥頭目昏疼夜多盜汗補正氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分㕮咀每服四錢水一鍾半生薑四片棗二枚煎

至六分不拘時候應有勞熱證者皆可服之熱退卽止但婦人寒熱亦因有經血結閉者致令五心煩熱及骨節間熱或作虛勞治之反以爲害積日既久乃成眞病法當行其經血若月事以時自然平治或以局方大聖散用紅花煎酒調服不能飲者以醋代之仍以紅丸子當歸湯嚥下此二藥大治經事不調或腹有血塊若久無子息服之數月其効特異非可數服責其餘功　或因下血過多發爲寒熱當用當歸地黃之類如大建中藥人令養勞

雙和董是也　然有痰飲停積之人則難用此藥當歸地黃與痰飲不得其宜反傷胃氣因是不進飲食遂成眞病至於不救者多矣　痰飲中積致生寒熱者宜以二陳湯及蘇飲等藥療之應手取効　更有服退熱冷藥太過因而咳嗽下利發熱自汗皆不可用之惟眞武湯增損名固陽湯仍以養臟丹服之病輕者可療重者當別求治法

錢氏地骨皮散

秦艽鱉甲柴胡甘草湯

秦艽青蒿烏梅甘草湯

文潞公藥準注李琬方

柴胡　連翹　山梔子　防風　甘草

活人連翹梔子防風甘草湯　連翹飲子

四順飲子　一名淸涼飲子治夜則在血熱而不厥

加荊芥　白朮　麻黃　爲洗心散

守眞柴胡飲子便衄氣血各半　柴胡煮散

錢氏黍粘子荊芥防風甘草湯

局方消毒散減防風餘二味

舉卿舉敗散 治婦人產後傷寒風熱角弓反張

柴胡桂枝湯小柴胡加桂枝芍藥是也

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡　黃芩　甘草　括蔞根　桂枝　乾薑

牡蠣

柴胡龍骨牡蠣湯小柴胡去甘草加鉛丹桂枝龍骨

牡蠣茯苓大黃

小柴胡加芒硝湯

治十三日過經不解大抵須有少陽不退而臟結

宜用小柴胡加桂湯治瘧疾兼支結

大柴胡湯 主治分數俱無見本經并活人藥證

柴胡　黃芩　半夏　生薑　大棗　芍藥

枳實　大黃

活人舉伊尹湯液大柴胡湯八味今監本無黃芩脫落之也、

潔古老人云治表證仍在裏證已急不如此不可用小柴胡去參草加枳實大黃如緩治不減人參甘草、

茯師黃芩湯

治傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胸脅痞滿微熱而煩

柴胡八錢　半夏八錢　茯苓四錢　桂心三錢

黃芩錢

右㕮咀生薑水煎服之

易簡參蘇飲

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積兼以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋臥進

進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐徐飲食服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進數服以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既以枳殼橘紅輩自能寬中快膈不至傷脾兼大治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼為疑一切發熱皆能作效不必拘其所因也小兒室女尤宜服耳

前胡加三分　橘紅　紫蘇　乾葛　半夏

茯苓　枳殼　陳皮　甘草　桔梗

木香各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不拘時候服素有痰飲者候熱退以二陳湯或六君子湯間服　本方治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩忪悸嘔逆及痰氣中人停留關節手腳嚲曳口眼喎斜半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉主之　一方用此藥三兩加四物二兩合和名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱並治吐血衄血便血并婦人下

血過多致虛熱者並得其宜一亦有用心過度發
熱者用之亦有神効往來寒熱尤宜治之

易簡溫膽湯

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸事易驚
或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽懾氣鬱生
涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗或四
肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安悉能主之

半夏一兩　枳實一兩　橘紅一兩半　甘草四錢
茯苓三錢

右㕮咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚竹
茹一塊如錢大煎至六分去滓食前熱服竹茹即
刮竹青也大治傷寒後虛煩　若傷寒後尚有餘
熱并熱在上焦兼汗下後表裏俱虛不可攻者宜
用人參竹葉湯下利者於竹葉湯中去石膏加熟
附名既濟湯　嘔者二陳湯一法治傷寒壞證
或發熱消渴煩躁用新羅參不拘多少煎湯浸冷
水令候盛渴之時與之頓服熱則隨去矣大抵傷
寒渴者不可多與水水多積胸中便爲結胸矣然
亦濡沫之可也　傷寒之後有吃逆者此證危[illegible]
其他證有此亦然當用半夏一兩生薑半兩白水
煎服　一方用丁香十粒柿蒂十五枚煎湯半鍾
乘熱頓服無時

易簡降氣湯

治虛陽上攻氣滿不快上盛下虛膈塞痰實咽乾
不利咳嗽中滿喘急氣促臍腹膨脹滿悶虛煩微
渴引飲頭目昏眩腰痛腳氣四肢倦怠此藥專治
腳氣上攻中滿喘急下元虛冷服補藥不效者立
効

前胡　厚朴　甘草　當歸各一兩　肉桂二兩
陳皮三兩　半夏五兩

右㕮咀七味并紫蘇子五兩緣難得真者不用
紫蘇如前胡之數代之共爲八味每服四錢水一
鍾半生薑五片棗一枚煎至七分去祖食後服
凡人中風中氣痰滿及腳氣等患多是虛氣上攻
胸膈不快不進飲食此藥大能降氣真俞山人降
氣湯後加參附五加大腹皮之類却非其真　若

素脚氣只是上氣喘急不得卧者宜用橘皮紫蘇人參五味子桔梗各等分名神秘湯甚者用此調鍾乳粉下養正丹　脚氣入腹大便秘不任冷藥者宜用養正丹以溫利之　一方以八味丸加川芎細辛桔梗茯苓共十二味名大降氣湯治法一同若晉年人虛氣上壅當用以生附加生薑煎臨熟磨以沉香服之尤爲穩當

許學士地黄丸 此丸方當在大病後

生薑二兩　秦艽　黄芩各半兩　柴胡半兩

赤芍藥半兩

右細末蜜爲丸烏梅湯下三十丸無時日二服學士云褚澄治寡婦僧尼室女別得其法參其脉左手關獨出寸口過魚際乃知女子思男而不可得也　或云寡婦師尼不可言僧字然爲當以經勞之二陽病發心脾不得隱曲故女子不月此一條本爲女子而言王淮内復云男子少精是經言女而註言男皆勞也言僧一字亦兼男之義　倉公傳濟北王侍人女病腰膝夜熱倉公曰病得之欲男不可得何以知之診其脉弦出寸口是知之然人以血爲本血盛所以思男也　褚澄云僧尼則異妻妾學士改僧字爲師字甚當經云女子不月條下王註云男子少精兼之意也又知僧字兼男之義　易老云仲景治婦人經不調盡在小柴胡調治條下以此推之

活人梔子烏梅甘草黄芩柴胡湯

治懊憹煩燥不得眠右五味爲末生薑水煎加竹葉鹽豉三十粒

仲景治少陰心悸不致水火調其中而治本也仲景云少陰證四逆條下言或咳嗽或悸或自便是假令一證並不是上下一條通爲一證也或悸而反畢之言姑以四逆散主之若果四逆必不用於此也何以然下文云悸者加桂腹痛不利者加附子即知雲岐子於此正條内去或悸一字并散便用四逆湯下所主甚當

金匱大薯蕷丸 治虛勞諸不足風氣百病

薯蕷三十分　當歸十分　桂枝十分　麴十分

乾地黃十分 大豆黃卷十分 甘草二十分炙
人參七分 芎藭六分 芍藥六分
白朮六分 麥門冬六分去心 柴胡五分
茯苓五分 乾薑三分 阿膠七分蛤粉炒成珠
杏仁六分去皮尖炒 白斂二分 桔梗五分
防風六分 大棗百枚爲膏

右二十一味細末煉蜜丸彈子大空心酒下一丸

一百丸劑

外臺秘要仲景病源小品方

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急一云嘔不安鬱鬱微煩者為未解也可與大柴胡湯下之即愈

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半斤湯洗
大棗十二箇擘破 生薑五兩 枳實四箇炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升温服一升日服一方加大黃二兩令不加大黃恐不名為大柴胡湯也思年內湯兼治天行千金翼附後同 海藏云正經嘔家雖多陽明證不可下大柴胡主治但言嘔不止心下急大柴胡湯下之不可疑也及點示正方即內無大黃却與本條相合 注中小字亦作嘔止小安仍未解者即宜大黃也故注後有加大黃一句若全用有大黃却足易老法治表證仍在裏證已急者也古人用藥其精妙如此

龍腦雞蘇丸增損且之御藥院尤妙

除勞解熱下氣散鬱去肺熱咳血心熱驚悸脾胸熱口甘吐血肝膽熱氣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴而血利五淋血崩此藥清神爽氣潤肺開心益志滋肝補腎令人身強體輕耳目聰明又能利膈化熱痰去膀胱中積熱三焦永無滯塞

雞蘇葉一斤即薄荷也 黃耆一兩 麥門冬四兩去心
甘草一兩 黃連一兩 乾地黃六兩爲末
人參二兩 木通二兩 新蒲黃二兩
阿膠二兩炒 柴胡二兩銼同木通以沸湯半升浸一日夜絞取汁

右爲細末用西路好蜜二斤餘先煉一二沸然後下生地黄末不住手攪時時入絞下者木通柴胡汁慢火熬成膏勿令火緊焦了然後將其餘藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下　虚勞煩熱梔子湯下　肺熱黄芩湯下　心熱悸動恍惚人參湯下　唾咯吐衄血去心麥門冬湯下　脾胃熱赤芍藥生甘草湯下　肝熱防風湯下　腎熱黄柏湯下以上諸證並食後臨卧　治五淋及婦人血崩漏下車前子湯下　莖中痛蒲黄滑石各一錢溫水調下　室女虚勞寒熱潮作煎柴胡人參湯下　痰嗽者生薑湯下氣逆者橘皮湯下

黄耆膏子煎丸

人參一兩　白术一兩半　白芷五錢　柴胡揀淨一兩

黄芩五錢　甘草五錢炙　鼈甲大者酥炙

右細末黄耆膏子丸如桐子大每服二三十丸至五十丸百沸湯空心食前下　黄耆半斤爲末水二斗熬至一斗去滓再熬不住手攪成膏至半斤入白蜜一兩再熬令滴錫熟得膏子十兩放冷丸藥

此爲夏則多約量用之

地骨皮枳殼散

治骨蒸熱肌肉消瘦力少困夜多盜汗

地骨皮　秦艽　柴胡　枳殼　知母　當歸

鼈甲醋炙黄

右等分爲末水一鍾桃柳枝頭各七箇薑三片烏梅一箇每服三錢煎至七分去滓溫服空心臨卧

黄龍湯（治産前後寒熱）

小柴胡法半夏加芍藥是也　一法以四物湯加蒲黄亦名黄龍湯

柴胡鼈甲散

大便硬者柴胡鼈甲散　大便溏者半氣半血逍遥散

柴胡　知母　貝母　地骨皮　鼈甲醋炙黄

右細末蒿心七葉烏梅二箇同煎

王氏秦艽散

秦艽半兩　柴胡二兩　知母一兩　鼈甲一兩半醋炙

甘草一兩炙

右㕮咀棗煎服

局方秦艽鼈甲散

局方沉香鼈甲散

局方人參荊芥散 已上三方主治修製並見局方

孫用和小柴胡治瘴疫久瘧面黃肌瘦不以月日淺深悉皆治之 心胸痞不思飲食加陳皮渴者加括蔞根喘者加杏仁便秘加大黃發痞鞭者加牡蠣三五劑去皮 去半夏加人參括蔞根名曰黃龍湯 虛煩熱竹葉湯此溫熱證與濕熱證與傷寒稍別 療傷寒一桂枝二麻黃三青龍四白虎五柴胡精當不差立時見効不必須候轉泄其間變壞悔之晚矣 如色脉交亂須辨明白無疑陽盛熱多則白虎竹葉陰盛寒濕則四逆理中以此思之又豈有三百九十七法耶 雲岐子論正法與此同意 王朝奉與杜壬云凡春夏宜發汗秋冬不宜汗秋冬傷寒只用小柴胡頻服自愈無汗亦愈若未辨傷寒疑是風氣痰壅等皆治之若渾身痛小柴胡加桂尤妙也

小散

治小兒骨蒸日晚潮熱夜間盜汗能飲食無肌肉病後餘毒傷寒後服熱物發熱不除及食羊肉物

羚羊角　地骨皮　秦艽　枳殼　大黃

麥門冬　赤芍藥　茯苓　柴胡　人參

桑白皮　黃耆　鼈甲 醋炙黃色各等分

右㕮咀青蒿水煎去滓溫服

活人姙婦傷寒加減例

姙婦傷寒仲景無治法非無治法也以其有岐伯有故無殞可殞衰其大半一條更不必云紛紛也所以不言明者當識其如痓濕暍一篇無藥仲景豈無治法而知其難證以後人有所遺耳 活人治婦人傷寒姙娠服藥予皆考而守之無論有胎無胎產前產後主治藥味皆不出岐聖人意計云俗方可采者與其間參用則知其間亦有違古人意者何必云以法考之疑非古方也 發熱惡寒不離桂枝芍藥 往來寒熱不離柴胡前胡 大渴不離知母石膏五味子麥門冬 人便秘者不

離桂枝白术附乾薑　大便結不離大黃黃芩
經水適來適斷者不離小柴胡　安胎不離人參
阿膠白术黃芩　發汗不離豆豉生薑麻黃旋覆
花　頭疼不離前胡石膏梔子　傷暑頭痛不離
柴胡石膏甘草　滿悶不離枳實陳皮　胎氣不
安不離黃芩麥門冬人參　發斑變黑不離黃芩
梔子升麻　觀此數條皆不出古人意豈可云仲
景無治法不言婦人妊婦之的方也仲景一書婦
人小兒兼之矣　活人論婦人傷寒但云仲景不

言此意已足不可云仲景無治法以治之藥求之
皆仲景本意特嘗出古人哉活人此言雖失亦恐
爲後人不知湯液者言之也豈敢云仲景不知也
活人之言失之過而不甚的當耳

不老丹例

不老丹

何首烏　蒼术　桑椹〈如前法〉　並見活法

何方何首烏蒼术地黃煎

右地黃膏子煎與蒼术煎合點服氣血全養無上

神藥也

不老丹歌

皇甫敬之作爲德甫服此七十而無白髮

蒼术四斤泔浸軟　竹刀刮皮切作片
一斤炒以四兩鹽　一斤椒炒黃色變
一斤各用酒醋浸　三味出之以日見
何首赤白各二斤　泔浸竹刮切來勻
桑豆五升同一甑　桑豆爛時曝乾成
地黃二升通搗細　椹汁和之如麪劑

置在瓮中手按下　仍澆椹汁高三指
衣取月精並日華　汲盡椹汁藥乃佳
其藥精乾爆作塊　亦用石臼搗無害
搗之細熟須細羅　煉蜜爲丸桐子大
空心酒服一百丸　此是人間不老丹

又方

何首烏〈一斤赤白相半〉　棗〈一升入鍋內用何水煮了以竹刀切開焙乾去核〉
牛膝〈酒浸焙乾一兩〉　防風〈去蘆用水洗焙一兩〉

右爲細末石臼作棗肉丸梧桐子大空心溫酒下

五十粒

又方

何首烏一斤　牛膝一兩　熟地黄一兩　蒲黄一兩

乾桑椹二兩

右爲細末蜜丸桐子大棗蜜各半丸亦得

逐風丹 治風痰通

地骨皮一兩　何首烏一斤　黒豆一升河水煮熟晒乾

荆芥穗四兩　甘草四兩

右爲細末酒調三錢或蜜丸彈子大細嚼一丸茶

酒任下

治瘰癧　瘤氣癭起結痰瘡潰爛

右用黒熟桑椹二升新布絞汁砂鍋内熬不犯鉄

器後成膏子沸湯點服

又治瘰癧經年久不差者以玄明粉末傳之日二次

消瘦丸 治結核瘰癧氣

連翹　梔子　桔梗　甘草　乾柿　防風

牡蠣　玄參　丹參　荆芥　續斷　鼠李

海藻　昆布　何首烏　白殭蚕　牛旁子

白頭翁各等分

治瘤氣癭起

連翹　梔子　瞿麥　防風　乾柿　桔梗

甘草各等分

右細末蜜丸桐子大服

五香連翹湯

治癰疽瘰癧風結腫氣惡瘡毒氣猪氣入腹嘔逆

惡心并皆治之

木香　沉香　獨活　升麻　甘草　麝香半兩

連翹　乾葛　大黄各二兩　桑寄生　淡竹茹

藿香二兩　雞心香

右㕮咀煎成入茹

治癭鶯絡丸

海燕　海帶　海蛤　木通　青皮　昆布

訶子炮去　連翹各等分　海螵蛸　款冬花

右細末煉蜜丸雞頭子大每服一丸臨卧噙化津

嚥下

孫尚藥方　治小兒盜汗潮熱往來

南番胡黃連 柴胡各等分

右細末煉蜜丸雞頭子大每服二丸至三五丸銚
石銚子內用酒少許化開更入水五分重湯煮二
三十來沸放溫食後和滓服

治傷寒勞復身熱大小便赤血色者

胡黃連一兩 山梔子一兩去殼

右件和炒微焦二味為細末用豬膽汁和丸桐子
大每服生薑三片烏梅一箇童子小便三合浸半
日去柤食後煖小便令溫送下十丸臨卧再服妙

青蒿散 治骨蒸便軟渴者

青蒿 烏梅 秦艽 甘草各等分

右㕮咀同小麥煎服

金匱要略瘧病脉證并治證三條方六首

師曰瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者
下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮
大可吐之弦數者風疾也以飲食消息止之 問
曰瘧以月以日發當以十五日愈設若不差當月
盡解也如其不差當云何 師曰此結為癥瘕名
曰瘧母急治之宜鱉甲煎丸

鱉甲煎丸

鱉甲十二分炙 烏扇三分燒 黃芩三分 柴胡六分
石葦三分去毛 厚朴三分 瞿麥二分 紫葳三分
半夏一分 人參一分 牡丹皮五分 䗪蟲五分熬
阿膠三分炙 蜂窠四分熬 芒硝十二分 蜣螂六分熬
大黃三分 芍藥五分 桂枝三分 葶藶一分熬
桃仁二分去皮尖 鼠婦三分熬

右二十二味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五
斗浸灰候酒盡一半著鱉甲於中煮令泛爛如膠
漆絞取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸
日三服

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手足熱
而欲嘔名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心
外舍分肉之間令人消鑠肌肉溫瘧者其脉和平
身無寒但熱骨節煩疼時嘔宜用
白虎加桂枝湯主之

知母六兩 甘草二兩炙 石膏一斤 桂枝三兩

粳米六合

右五味㕮咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升溫服一升日三汗出愈

蜀漆散 治瘧多寒者名曰牡瘧

右杵為細末未發前以漿水服三錢 溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕 一方雲母作雲實

牡蠣湯 治牡瘧

牡蠣四兩熬 麻黃四兩去節 甘艸二兩炙

蜀漆二兩洗去腥

右㕮咀以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥取二升去柤溫服一升吐則勿更服 見外臺

小柴胡去半夏加栝蔞湯 見傷寒 治勞瘧 經心

柴胡八兩 黃芩各三兩炙 生薑三兩切片 大棗十二枚

人參 栝蔞根四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去柤再煎取三升日三服

柴胡桂薑湯

治寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神故錄之

柴胡八兩 桂枝三兩去皮 黃芩三兩 牡蠣二兩熬

甘草二兩炙 乾薑二兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去柤再煎取三升溫服一升日三初煩汗出愈 出傷寒論

九轉靈砂丹 治瘧

紫河車一錢入研細和前後一味 鉛一錢 信一錢

右用雄黑豆一百粒水浸一宿去皮透時研如泥和三味勻末丸桐子大菉豆大粟粒大三等量虛實老幼大小服之每服一二丸或三丸臨晨日未出東面無根水下不發日服經曰當其盛必毀因其衰也足必大昌此之謂也

又方治瘧久不愈

右用蒜不以多少杵和鉛丹丸雞頭大每服一丸臨發面東新水下

海藏瘧論

瘧之為病以暑舍於榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑感風寒而得之邪并於陽則發熱冰水不能涼邪并於陰則發寒湯火不能溫并

則病作離則病止故有時而休作氣則發之已在
血則發之晏淺則日作深則間之或在頭項或在
背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一
也或在四肢者風搖之所及隨所傷而作不必盡
當風火也先寒而後熱者爲之寒瘧先熱後寒者
爲之溫瘧二者不當治水火當從乎中治中治者
少陽也渴者燥盛也不渴者濕勝也瘧雖傷暑遇
秋而發其不應者秋病寒甚太陽多也冬病寒不
甚陽不爭春病則惡風夏病則多汗二者手少陽

虛也其病隨四時而作異形如此又有得之於寒
而發之於暑邪舍於腎足少陰也有藏於心居之
於內熱索於肺少陰也至於少氣煩冤者足熱而
不寒爲之癉瘧足陽明也治之奈何當其盛而必
毀因其衰也是必大昌矣治法易老瘧論備矣
問曰婦人經痛大人小兒內熱潮作並瘧寒熱其法
同否帝又問曰病中外何如岐伯曰從內之外者
調其內若盛於外者先治內而後治外此言表裏
而出之異也又云中外不相及則治主病此似不

相及者半表裏也自外而入者有之自內而出者
亦有之外入內出雖異也在半表裏則一矣此從
外之內者治其內若盛於內者先治外而後治內
中外不相及爲少陽也治主病者治少陽也帝問
大熱之病惡寒發熱如瘧或發一日或發間日岐
伯對曰以勝復之氣會遇之時有多有少陰多陽
少其發日遠陽多陰少其發日近此勝復相搏盛
衰之節瘧亦同法瘧者少陽也少陽者東方之氣
也逆之則發寒順行則發熱故分之氣異往來之

不定也婦人經水適來適斷病作少陽治之傷寒
雜病一體經云身有娠而有脈邪經閉也又云月
事不來者胞脈閉也經閉者亦中不至胞閉者生
化絕源二者皆血病厥陰主之厥陰病則少陽病
矣眾及其夫也小兒外感內傷若有潮作寒熱等
證並同少陽治之男女同　已上男子婦人小兒
間有或實或大熱或虛變成勞脈有浮中沉之不
同故瘧有表裏和之不一察其在氣在血定其行
陰行陽使大小不失其宜輕重各得其所逆從緩

急症無不當則可以萬全矣此少陽一治不可不知也

素問五藏瘧證湯液

肝瘧令人色蒼蒼然太息其狀若死者通脉四逆湯

胃瘧令人病也善飢而不能食食而支滿腹大理中湯理中丸

心瘧令人煩心甚欲得淸水反寒多不甚熱桂枝加黃芩湯

脾瘧令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出小建中湯芍藥甘草湯

肺瘧令人心寒寒甚熱熱間善驚如有見者桂枝加芍藥湯

腎瘧令人洒洒腰脊痛不能宛轉大便難目眴眴然手足寒桂枝加當歸芍藥湯

素問六經瘧候湯液

少陽令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚小柴胡湯

厥陰令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數便意恐懼氣不足腸中悒悒四物玄胡苦楝附子湯

陽明令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜日月火光氣乃快然桂枝二白虎一黃芩芍藥加桂湯太陰令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰小建中湯異功湯

太陽令人腰痛頭重寒從背出先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已羌活生地黃湯小柴胡加桂湯

少陽令人悶嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已小柴胡加半夏湯

小柴胡湯議論

小柴胡湯不汗不下不利小便故潔古名三禁湯也後人用六乙凉膈和解之不知何意凉膈氣中之下藥六乙則雜病膀胱中和小便藥也少陽證當陽明與太陰之間故云半表裏所以小柴胡不汗不下不利小便令六乙凉膈既利而復下之故

有畜血心下痞證豈可輕用爲哉若以利下之劑
爲可用則古人麻黃承氣互今合而用之也豈爲
有失古人之意其半非輕明者當識半在表乃身
後之表半在裏非下之半在裏乃身前之裏則藥
不至於差惑

舌胎滑例　王奉朝證治論藏結附

舌上胎滑此丹田有熱也脉陰陽俱緊者口中氣
出唇口乾燥倦卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄
語也到七八日以來微熱手足温爲欲解或八日

以上皮反大發熱者爲難治設使惡寒者必欲嘔
也可以柴胡去半夏加人參栝蔞湯出小柴胡湯
加減法　腹中痛者可理中丸　藏結如結胸狀
飲食如故時時下利脉浮關脉小沉細緊名曰藏
結舌上胎滑者難治可刺關元穴　藏結無陽證
不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑
者難治也可刺關元穴服小柴胡湯佳　陽明病
脉浮而緊咽燥口舌腹滿而喘發熱汗出不惡寒
反惡熱身重若下則胃中虛客熱熏膈心中懊憹

舌上胎滑者服小柴胡湯　胃氣和汗出而解

三焦熱用藥大例

上焦熱

清神散　連翹防風湯　涼膈散　龍腦飲子
犀角地黃湯

中焦熱

小承氣湯　調胃承氣湯　洗心散　四順清涼
飲　麻仁承氣湯

下焦熱

大承氣湯　五苓散　立効散　八正散
石葦散　四物湯　抵當湯丸

海藏云此內熱之大略也有外熱者當求別法兼
此例有輕重氣血之分用者當擇其可焉而已矣

醫壘元戎卷第五

醫壘元戎卷第六

趙州教授進之王好古彥攷
明蔡御史東萊桂亭秦才命梓　兩淮運同四明倚東卿重刊
兩淮運副姚江嚴世校正

三陽拾遺例

海藏通聖散評議

通聖散治雜病最佳。治傷寒傷風有失其故何也。防風麻黃葱豉汗也。大黃芒硝下也。梔子滑石利小便也。經云發表攻裏本自不同。故發表不遠熱。攻裏不遠寒。仲景云當汗而反下之者逆也。當下而反汗之者亦逆也。又云桂枝下咽陽盛則斃。承氣入胃陰盛乃亡。既有汗藥而復有下藥。發表攻裏合而並進。有失古人用藥之本意。兼且便不宜遽利。若利之過則燥而畜血。汗之不當則生黃。下之不當則結胸。若藥隨虛實而變。上行則有汗多亡陽之證。下行則有下多亡陰之證。其害非輕。可不慎歟。在太定間此藥盛行於世而多効何哉。當時雖市井之徒口腹備衣著全心志樂而形不苦。

雖然用涼亦多効而必失。如今之時乃變亂之餘。齏鹽糟糠有所不充。加以天地肅殺之運五十餘年。敢用涼藥如平康之世耶。故多失而少効。有如仲景用桂枝當漢之末也。韓祗和解桂枝當宋之隆也。其時世之異不可不知也。豢犯藥三禁。傷風不宜汗而汗之一也。傷寒不可下而下之二也。小便不宜重利而利之三也。若知此而不犯。亦無生黃畜血結胸之證。故餘有白术神术二湯以革世醫之弊云耳。

韓氏微旨和解因時法

傷寒病有可汗者論中但視其汗證及可汗脈。或云脈浮弱。或云脈浮而緊。或云脈浮緊。或云脈浮無汗而喘。或云脈浮而長今舉數條。後人但憑其脈之大綱。證和分明。而卻慮湯證之或又不分。有可汗不可汗。不可汗之疑。誤投發表之湯。則多變成壞證之患。今舉病人有汗惡風。無汗惡寒。分為三等。及撰立春已後至立秋已前氣候輕重各方治之度。學者易為開悟耳。　病人二三日已前兩

治傷寒以脉為先治襍病以色為先

手脉浮數或緩或急緊按之柔軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見表證未見表脉也直候寸脉力小如關尺脉即可投表藥大抵治傷寒病見證不見脉未可投藥見脉不見證雖少投藥亦無害矣凡治雜病以色為先脉為後治傷寒以脉為先證為後病人兩手脉浮數而緊名曰傷寒者若關前寸脉力小關後尺脉力大雖然不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見于脉也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明以前宜調脉湯主之清明已後至芒種以前宜葛根柴胡湯主之芒種以後至立秋已前人參桔梗湯主之

調脉湯方

葛根一兩 防風半兩去蘆頭 前胡三分去苗 甘草炙半兩

右為粗末每服二錢水一鍾生薑一塊如小指大擘破煎至七分去柤溫服如寸脉依前力小加葱三節擘破同煎

醫方類聚卷之六十　三

葛根柴胡湯方

葛根二兩半 柴胡二兩去苗 芍藥分 桔梗一分 甘草炙三分

右㕮咀每服二錢水一鍾生薑二片煎至七分去滓熱服如寸脉依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯方

人參三分 桔梗三兩 麻黃一兩去節 石膏一兩 甘草炙三分

右㕮咀每服二錢水一鍾荊芥五穗煎至一盞去柤熱服如寸脉依前力小加麻黃二分去節同煎服病人兩手脉浮數而緩名曰中風若寸脉力小尺脉力大然不惡風不自汗出此乃陰氣已先見於脉若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明以前宜薄荷湯主之清明以後至芒種以前宜防風湯主之芒種以後至立秋以前宜香芎湯主之

醫方類聚卷之六十　四

薄荷湯方

薄荷一兩 葛根半兩 人參三分 甘草炙三分 防風去蘆頭

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至七分去柤熱服如三五服寸脉力尚小加薄荷三分

防風湯方

防風一兩去蘆 桔梗三分 甘草半兩炙 旋覆花半兩

厚朴去麄皮炙令生薑汁三分

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑一塊如指大擘破煎至七分去滓熱服如三五服如寸脉力尚小加荊芥五七穗同煎

香芎湯方

川芎一分 石膏二兩 升麻二分 甘草半兩炙

厚朴半兩薑汁炒

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至七分去柤溫服如三五服後寸脉尚小加細辛二分

前二段又將中風與傷寒各立法者何蓋謂病人如得病三日以前或因中風脉緩或因傷寒脉緊然脉雖先見而病證猶未見尚可以藥解之故各立方耳 病人兩手脉浮數或緊或緩寸脉短反力小於關尺脉者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風者是邪氣在表陰氣獨有餘也素問曰陰氣有餘為多汗身寒是也即可投消陰助陽發表藥治之若立春以後清明以前宜六物麻黃湯主之清明以後至芒種以前宜七物柴胡湯主之芒種以後至立秋以前宜以發表湯主之

六物麻黃湯方

麻黃一兩去節 葛根三分 人參半兩 甘草半兩炙

蒼朮三分去皮

右㕮咀每服三錢水一鍾棗二枚煎至七分去滓

熱服如三五服後汗未止猶惡風者加荊芥三分如三五服後不惡風猶汗自出者加桂上丁香皮半兩

七物柴胡湯方

柴胡一兩去苗 蒼朮一兩去黑皮 荊芥穗一兩

甘草一兩炙 麻黃一兩去節

右㕮咀每服二錢水一鍾生薑一塊如指大擘破棗二枚擘破同煎至七分去滓熱服如服三五服後汗未止猶惡風者入葱白三寸如三五服汗猶

未止者加當歸一兩每服加棗三枚同煎服

發表湯方

麻黃去節一兩五錢　蒼术去黑皮二兩　人參半兩　當歸去蘆頭半兩
甘草炙五分　舶上丁香皮二分

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑一塊如指大擘破棗三枚擘破同煎至七分去滓熱服如三五服後汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度病人脉浮數或緊或緩其脉上出魚際寸脉力大如關尺者此名陽盛陰虛也若發熱悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春以後至清明以前宜人參湯主之清明已後至芒種以前宜前胡湯主之芒種以後至立秋以前宜石膏湯主之

人參湯方

人參半兩　芍藥三分　石膏二兩　柴胡去苗一兩
甘草炙三分

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑一塊如指大擘破同煎至七分去滓熱服如三五服後依前熱未解每服入豉三十粒水一鍾同煎至八分去滓熱服

石膏湯方

石膏三兩　芍藥一兩　升麻三分　黃芩三兩
柴胡去苗一兩　甘草去紅皮炙一兩

右為末每服三錢水一鍾半入豉一合煎至八分去柤熱服如服三五服後熱未解加知母一兩又熱未解加大青一兩病人兩手脉浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春以後至清明以前宜解肌湯主之清明以後至芒種以前宜芍藥湯主之芒種以後至立秋以前宜知母湯主之

解肌湯方

石膏一兩　麻黃去節一分　升麻半兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾半入豉半合煎至八分去滓熱服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯方

芍藥一兩 石膏三兩 荊芥一兩 甘草一兩炙半

右㕮咀每服三錢水一鍾入薑一塊如指大擘破同煎至七分去滓熱服如三五服後猶惡風每服加生薑一塊如指大擘破同煎

知母湯方

知母 石膏 麻黃去節 升麻各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑一塊如指大擘破同煎至八分去滓溫服三五服後猶惡風加麻黃半兩升麻半兩

仲景云傷寒爲病脉緩者名曰中風脉緊者名傷寒今分此二端者何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛於骨髓之內每至春夏發時因外傷寒引內邪出或外傷風而引內邪出及乎內邪既出而爲病一也故古人立此二端恐後疑其緊脉與緩脉治法別也若中風與傷寒脉異何故仲景無別治之此乃後人不究仲景之心也

前三段又將中風與傷寒一法治者何邑病人始得病後脉與證俱見若投解利藥必不得愈故立前方同法而治之

病人始得病一二日至五六日尚有表脉及表證者亦可以依脉證投藥丸解表及發表藥每日可飲三服滿證甚可至五服外不可頻服藥也如證未解次日依前再投如證依前未解可作熱粥內加葱白亦可也汗出勿厚衣蓋覆恐出汗太過作亾陽證也

傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時發散傷寒之脉頭小尾大傷風之脉頭大尾小李思訓保命新書亦分寸尺與韓氏同之非若前人總言尺寸脉浮而緊尺寸脉俱浮而緩緊則爲傷寒無汗緩則爲傷風自汗又有傷寒有汗者有傷風無汗者脉亦互差與證不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大即爲傷寒尾小頭大即爲傷風也人病間有脉證異于尺寸者故韓李述爲和解因時發也又恐後人疑其不與仲景合遂於本方藥又立加

減數條亦不越前人之意何其當哉兼二公者當宋之盛時故有戒桂枝麻黃不可輕用故用石膏麻黃葛根柴胡之平劑當時則非百世常行耶世遷移之活法也可汗一篇若從湯液隨證應用自有定規雖明哲不可踰　又寸口脉小飲冷與霧露所傷同作中焦治之　韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒寸口小者只與關以下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小況得有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無即不可解則只宜溫中不可不知

韓氏十四藥定經

調脉湯　陽明少陽也

葛根柴胡湯　陽明少陽也

人參桔梗湯　太陽陽明也

薄荷湯　陽明也

防風湯　陽明也

香芎散　陽明也

六物麻黃湯　太陽陽明也

七物柴胡湯　太陽少陽也

發表湯　太陽也

人參湯　陽明少陽也

石膏湯　陽明少陽也

解肌湯　太陽陽明也

芍藥湯　太陽陽明也

知母湯　六陽陽明也

右韓氏十四藥以經絡求之各有部分輕重緩急自有所宜運氣加臨各極其當因而在其中矣不必分至之遠近寒暑之盛衰而謂之因時也

仲景瓜蒂散例

仲景瓜蒂散

病人桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不能大息者此爲胸中有寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂　赤小豆各等

右爲細末每服一錢七豉一合湯七合先漬之須臾煮作稀粥去柤調散溫服頻服不吐少少加之得快吐乃止諸亡血虛家不可用此

宋氏仲景餘法搐藥瓜蒂散

瓜蒂十四箇　丁香一箇　黍米四十九粒

右細末噙水取一字搐鼻下黃涎

治偏正頭痛久不愈服諸藥及針刺莫能効者以其濕氣在頭也一味細末一味者瓜蒂也少許搐之鼻中清水徐徐出一晝夜濕盡痛止爲度此亦吐之意也經云濕氣在上以苦吐之故邪在胸中者服之邪在頭目者搐之皆吐之稱也張子和云點目出淚搐鼻瀝涕口含漉涎皆有以同乎吐也

又濕在胸中故發頭痛瓜蒂末一錢赤小豆末半錢米湯調下吐之或醋漿亦得濕氣在頭者此藥亦能吐之然莫若搐之爲愈也

瓜蒂散治傷寒三四日者或覺心滿堅硬脚手心但熱變黃不治而欲死者宜瓜蒂爲細末每用一

字吹鼻中令黃水出餘殘末用水調飲之得嘔黃水一二升乃愈

小兒久患風癇纏喉風痺及大人風涎潮熱發不省酒積食勞黃疸脾濕腫滿勞熱上喘肌熱咳嗽中滿眩暈胸實痰飲痰厥頭痛一切胸上病患脉沉實按之有力者並約量虛實輕重多少服之以上

瓜蒂吐不止用射香湯解之

勝金丸　病在上者吐之

薄荷半斤　瓜蒂末半斤　藜蘆末一兩　朱砂半兩

猪牙皂二兩

右牙皂搥碎水一升與薄荷一處揉取汁熬成膏子別將藜蘆瓜蒂硃砂研勻用膏子和龍眼大以餘朱砂爲衣溫酒化下一丸以吐爲度得吐而省人事者愈不省則不可救也或者謂中氣中風無吐法下金虎碧霞以爲戒且如卒暴痰生聲如拽鋸牙關不開湯藥不能入其命須臾若此無吐法其誤人之旨深矣

瓜蒂散

治痰飲酒積食勞留飲停滯或寒結胸中熱鬱所化并宜用之

瓜蒂七十五箇 赤小豆七十五箇 人參去蘆五分 甘草生用作二錢半

右細末每服一二錢量虛實加減酒調空心辰刻飲之

三聖丸散

防風三兩 瓜蒂三兩 藜蘆一兩或半兩

右粗末每用三錢以韲汁一大盞煎至七分去滓溫服飲挨引令吐爲度宜靜室煖不透風處用吐至以好醋葱湯解之

古今吐法不一在胸中者或嗌之在頭者或吐之何也答曰頭爲天之天肺爲天之地鼻爲肺之竅胸爲肺之腑總而言之則皆心君之上無形之神至高之分故用之錯而効之同也

衍義云瓜蒂即甜瓜蒂也瓜蒂成熟自落其蒂在蔓莖上採得曝乾不以多少爲細末量病輕重每服一二錢匕膩粉一錢匕以水半合用調勻灌之

治風涎暴作氣塞倒仆服之良久涎自出或服藥良久涎不出含砂糖一塊下咽則涎出此物甚不損人全勝石碌硇砂等

食療云瓜蒂主身面四肢浮腫殺蟲去鼻中息肉陰黃黃疸及暴急黃疾瓜蒂丁香各七枚小豆爲末吹黑豆許于鼻少時黃水出差

張文仲治傷寒熱病瘴瘧及胸中惡痰飲須可吐者鹽末一大匙以生熟湯調下須臾即吐吐不快者宜更服甚良又曰近効方與備急方用

經驗方治遍身如金色黃

瓜蒂四十九箇六月收者佳 丁香四十九箇

右二味用乾鍋子內燒烟盡爲度細碾末大人一字小兒半字吹鼻內及擦牙立効

外臺肘後方

療傷寒汗出不渴三四日胸中惡欲吐者

豉三斤以綿裹之 鹽一兩

右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升又煮三服頻服二升安卧當吐不吐再服

又方

苦參二分 甘草一分 瓜蒂二十枚 赤豆二七枚

右四味加以水一升煮取半升作一服服之當吐不止者作葱豉粥解之必忌海藻菘菜

又方

苦參二兩 黃芩二兩 生地黃半斤

右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌蕪荑

仲景治百合例 金匱祖方全

百合知母湯 百合滑石代赭石湯

百合雞子湯 百合地黃湯

又方

治傷寒腹中痛

百合一兩炒黃為末米飲調服

孫眞人治陰毒傷寒

百合煮濃汁服之一升良

素問解㑊 仲景百合諸湯 活人說百合證

右仲景百合諸湯名本草所言備矣後活人主治服餌載之百問學者當知其祖

百合知母湯 治百合發汗後者

百合七枚擘 知母二兩

右先以水洗百合漬一宿當去白沫去其水更以泉水二升煮取一升去滓別以泉水二升煮知母取一升半分溫服

百合滑石代赭石湯 治百合病下之後者

百合七枚擘 滑石三兩碎綿裹 代赭石如彈丸大一枚碎綿裹

右先將百合如前法製後去滓別以泉水二升煮滑石代赭石取一升去滓後合和重煎取一升半分溫服

百合雞子湯 治百合病吐之後者

百合七枚擘 雞子黃一箇取

右先將百合如前法製後去柤內雞子黃攪令勻溫服

百合洗方 治百合病一月不解變成渴者 百合一升

右水一斗漬一宿以洗身洗巳食煮餅勿以鹽豉也

百合地黃湯治百合病不經吐下發汗病形如初者

百合七箇 生地黃汁一升

右先以水洗百合漬一宿出白沫去更水共以泉水二升煮取一升去滓內地黃汁煮取一升分溫再服中病則止大便當如漆

百合滑石湯治百合病變寒熱

百合一兩炙 滑石三兩

右細末米湯調服方寸七若微利者止再服

百合栝蔞牡蠣湯治百合病不差

百合 栝蔞根 牡蠣已上各等分

右爲散湯服方寸七日二三

海藏百合四君子湯治老幼虛人不可下者

解㑊尺脉緩濇尺爲陰部腹腎主之緩爲熱中濇爲無熱而無血故解㑊而不可名之然寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯寧不可名爲之解㑊也㑊㑊合一證與此比比相若

病源小品萎蕤湯

療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛咽喉乾舌強胸內疼心胸痞滿腰背強痞者結病也

萎蕤二兩 石膏三分末之綿裹 白薇二兩 麻黃二兩去節

獨活二兩 芎藭二兩 杏仁二兩去尖 甘草二兩

青木香二兩無射香一分代

右九味切以水八升煮取三升分三服若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜古方錄驗同 一方有葛根二兩

千金療傷寒中風五六日以上但胸中煩乾嘔者宜栝蔞實湯上之方祖金匱

栝蔞實一兩 柴胡半斤 黃芩 甘草各二兩

生薑四兩 大棗十枚

右六味切勿令大碎吹去末以水一斗二升煮得六升絞去滓更煎取三升溫服三日

千金翼五苓散論云從後五苓散此當在大陽五苓散條下

猪苓三分 桂心二分 澤瀉五分 茯苓三分

白术三分

右五味擣篩水服方寸七日三多飲煖水汗出愈

甘草瀉心湯 傷寒中風醫反下之其人下利日數

十行水穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞以爲病未盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胸中虛客氣上逆故益堅甘草瀉心湯主之

甘草炙四兩 黄芩三兩 大棗十二枚 黄連一兩

乾薑二兩 半夏洗去滑半斤

右六味切以水一斗煮取六升分六服一方有人參三兩

古今經驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風頸強鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方

大棗十二枚破 桂心三兩 芍藥二兩 生薑三兩

甘草二兩 黄芩二兩

右六味㕮咀以泉水六升煮取四升分四服日三自汗者去桂心加附子一枚煩渴者去桂加括蔞三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若脉浮緊者不可與也千金同

海藏十餘證班并藥

傷風脉緊仲景大青龍湯主之 無汗惡風仲景葛根湯主之已上二證傷風得傷寒脉傷寒得傷風脉是也易老斷爲桂枝柴黄各半湯

中風傷寒萎蕤湯 中風寒陽旦湯

傷寒中風括蔞實湯

此先後所傷不同其中變證所苦各異故用藥雜非桂枝麻黄之正藥也

尺寸脉盛 重感于寒 變爲溫瘧

陽脉浮滑 陰脉濡弱 更遇于風變爲風溫

陽脉洪數 陰脉實大 更遇溫熱變爲溫毒

陽脉濡弱 陰脉洪緊 更遇溫氣變爲溫疫

中風傷寒

傷風見寒

中暑中濕 蓋因傷於寒邪 又感異氣而變 斤此襲病於季病也

中暑飲冷

海藏云已上十餘證前後所傷不同內外變證不一非精於持診者不能別也

又仲蘇傷寒白膏摩體中手當千遍藥力乃行並療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之着膏上摩向火千遍日再自消

天雄　烏頭炮　莽草　羊躑躅各等分

右四味各切以苦酒湯三升漬一宿作東向路竈又作十二聚濕土各一升許成膏豬脂三斤着銅器中加竈上炊以葦薪爲火令膏釋內所漬藥炊令沸下着土聚盡遍藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取汗咽痛含如棗核日三嚥之不可近目千金同

牙齒例

海藏云牙齒者足陽明經也手陽明經也足陽明之經走上牙中手陽明之經走下齒中牙齒者骨之餘也堅則令人強食或血出斷爛齒痛寒熱不一皆手足陽明也

陳希夷神仙刷牙藥白牙黑髮益精神

豬牙皂角及生薑　西國升麻蜀地黃

木律旱蓮槐角子　細辛荷葉要同當

青鹽等分同燒煉　研煞將來用最良

揩牙牢齒烏鬚髮　誰知世上有仙方

右用二兩並剉碎一新確子盡盛其藥用瓦子蓋口以麻索子繫定上用鹽泥固濟約厚半寸許煞乾作一地坑子坑子方闊二尺深約七寸先放一方磚後安藥確子以口向下坐用木炭一秤燒令透後清烟出稍存性去火發一宿取出研爲細末每用藥刷上下牙齒溫水漱口吐之

射香玉散

酸石榴皮　訶子各兩　升麻　綠礬半兩

豬牙皂灰　川芎　白芷　射香錢

五倍子　石膽礬各半兩　腦子錢半　青黛

白檀兩　零陵香　木別子各一錢

百藥煎　青鹽　細辛　荷葉灰

白茯苓兩一　藿香葉　沒石子各一兩半

好華撥

右細末用藥後茶清漱之又方無腦子加射香三錢

犀角升麻湯

治陽明受風熱口脣頰連發腫痛鼻額連頭痛

犀角七錢半 升麻五錢 防風三錢半 羌活二錢一字

川芎二錢半 白附子 白芷二錢半 黄芩二錢半

生甘草一錢半

右㕮咀作一服水五錢煎至三錢去滓分三服

梧桐淚散

治陽明經虛風熱所襲流傳牙齒攻斷肉則致腫結妨悶甚者為斷間津液相搏化為濃汁宜用此藥

梧桐淚 石膽礬 細辛根 亂髮灰一錢一字

黄蘗五錢 蘆薈五錢 射香一錢 升麻五錢

硃砂 川芎 當歸 牛膝各二錢半

右細末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之以常用少許擦牙齒去風退熱消腫化毒牢固牙齒永無宣疳血蛀之病

升麻丸

治陽明有熱攻注牙齒腫痛脉洪大而實宜以細辛 升麻 防巳 羌活 內加牽牛大黄瀉之加減丸數

右並等分為末煉蜜丸梧桐子大每服二丸臨臥溫水下

白牙齒藥

零陵香 白芷 青鹽等分 沙鍋別研

升麻半兩 石膏一兩別研 細辛二錢

射香半錢另研

右除內砂鍋石膏射香外細末入此五味同調勻早辰夜間用藥擦牙溫水漱

又方升麻散

細辛六錢 川芎二兩 升麻一兩 藁本一兩

石膏一兩 皂莢一兩 白芷一兩

右每用藥少許刷牙溫水漱用沙羅三次

三聖散 治齒斷腫痛動搖

甘葫蘆子一兩 牛膝一兩

右細末每用五錢七水一盞半煎至一盞去滓稍熱漱多時吐之嘔疾不妨食後臨睡

治齒根宜露動搖方

柳枝 防風 杏仁 青鹽 地骨皮

細辛 生地黄各一兩 蔓荊子半兩

右為細末藥一錢酒水各一盞煎至一盞去滓熱嗽冷吐

治牙齒脫落不牢方

熟銅末二兩 當歸一分 防風一分 地骨皮三分

細辛根一分

右為末將當歸末和銅末研如泥粉封齒日夜各二度三五日牢一月内忌硬物

簡要方治牙齒腫痛

白礬一兩 露蜂房[illegible]

右為末每用二錢水一盞煎十餘沸熱漱牙齒痛處冷吐之

二十八宿散治遠年近日發牙痛

丁香 華撥 大椒 蝎梢

右七味同碾為細末痛處用津點擦立止

華撥散治風蛀牙疼牙關緊急

華撥 草烏頭 細辛 升麻 良薑 蝎梢

右為細末如牙疼時擦少許漱涎痛即止

擦牙藥

川芎 細辛 訶子 五倍子 百藥煎各二錢半

膽礬半錢 綠礬半兩 射香如無以甘松代之

右為細末再入膽礬射香研勻為度每用一字臨臥刷之

立效治牙疼

小椒 露蜂房 青鹽各等分

右為細末煎數沸放溫漱之痛即止

益神散 一法加青鹽煮核桃棗燒灰同末刷牙

五倍子半兩 訶子[illegible] 石榴皮二錢

膽礬[illegible] 零陵香一錢 白芷一錢 射香

綠礬[illegible] 食擦大皂角[illegible] 加鹽半兩

右同炒令赤細碾夜夜用擦牙齒一月後有動者齒及血蛀並老其牙堅牢

反老還童丹

青鹽[illegible] 升麻一兩 羌活一兩 當歸半兩

五倍子（兩） 川芎（半兩） 熟地黄（兩） 猪牙皂角（兩）

右用罐子一箇隨藥多少用白巳退髮少許盖藥面用瓦子盖之塩泥固濟文武火煅存熟氣絕為度冷取煞研為末每日早晨及晚擦牙久而見効

病源曰手陽明之支脉入於齒齒是骨之所絡髓之所養若風冷寒入於經絡傷骨冷氣入齒根則齒痛

海藏云此骨與大腸俱熱大便秘經絡壅治而齒斷痛者治法不同也凡齒痛藥並見外臺秘要

古今巴豆例

本草云味辛溫生溫熟寒有毒可以通寒可以開胃可以磨堅可以止瀉又可以備急而隨腸或佐以寒或佐以熱加以五色各隨其藏具見於後以其此藥多治腸胃手足陽明之經也故入三陽拾遺例金匱玉函要畧傷寒論并雜療諸方皆張仲景祖神農法伊尹體箕子而作也唐宋以來如孫思邈葛稚川朱奉議王朝奉輩其餘名醫雖多皆不出仲景書也

仲

仲景備急丸

治卒暴百病中惡客忤治口禁停尸卒死

巴豆 大黄 乾薑（各等分）

右蜜丸杵千下丸如小豆大每服三丸苦酒下如幹口不開折齒灌之三物司空裴秀亦作散用治心腹諸疾與上同巴豆即斬關奪門之將散不及丸必用散者其急也

三物須精新好者細末蜜丸和搗千杵丸如小豆大胸滿卒痛如錐刀刺氣口急禁停屍卒死以煖水苦酒服之若不下捧頭起灌令下咽須臾差未知更與三丸當便腸鳴轉即時吐下得愈若口禁不開折齒灌之藥下即生

仲景白散

桔梗 貝母（各一字半末之） 巴豆（一字半熬研）

右巴豆入散內飯勻服強人半錢七弱人少減病在上必吐病在下必利不利進熱粥一杯不止進冷粥一杯若汗出已腹痛與芍藥三錢如上方

仲景飛尸走馬湯方

巴豆二枚去皮心　杏仁二枚去皮尖

右二味綿纏搥令極細投熱湯二合捻取白汁便飲之食頃當下量大小老幼虛實加減服之通治鬼擊病忌野猪肉蘆笋張文仲同

黑神丸治心腹諸疾

巴豆二錢半　鹽頭四兩

右為細末滴水丸桐子大麥麩炒香水上浮不用麥酒吞二丸

狀元丸　一名酒癖丸

神麯炒　葛根各半兩　半夏一兩湯泡　雄黃二錢

巴豆五十箇　白麵一兩

右六味滴水丸桐子大麥麩炒香水上浮不用麥酒下十二丸

酒癖丸

巴豆十五箇　雄黃六塊皂子大　蝎稍十五箇　白麵五兩

右為細末水丸豌豆大稍乾

神應丸

大治心腹脹滿宿食不消飲食所傷不喜飲食諸藥不効

巴豆一百一十粒　麵一斤炒盡油

右連麵一處為細末醋糊丸菉豆大冷水下二三十丸食遠

青娥丸　此後並巴豆杏仁例

一法加　青黛一錢五分　巴豆一錢五分　白礬半兩

右蒸餅丸菉豆大每服二丸甘草湯下食後

紅粉丸

一法加胭脂治婦人血不通　一法加朱砂

解毒雄黃丸

治纏喉風急喉閉卒倒失音不語不省人事

一法加　雄黃一分　鬱金一分　巴豆十四箇

玉霜丸

一法加　輕粉　滑石　一法加白礬

活人黑神丸

一法加　鹽豉　五靈脂　治濕痰食積

錢氏紫霜丸

一法加　代赭石　赤石脂　法加大黃治熱

一法加附子、烏頭[illegible]

感應丸(子[illegible]後製，此見本方)

丁香一錢 木香一錢 肉荳蔻三錢 乾薑半兩

巴豆半兩(制[illegible]) 杏仁半兩(製[illegible]) 百草霜 蠟二兩(製[illegible])

神應丸(治冷飲[illegible]止 每[illegible])

許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即知此方乃古方也惟此爲眞與局方高殿前家亦非也本方雖云秘者能下泄者能止用之少効予反覆本草味藥證但言巴豆得大者良予故法爲

神應丸

木香 丁香 乾薑 百草霜

四味[illegible]和勻 杏仁 蠟

巴豆[illegible]

右同研爲泥上四味和勻重羅細入泥中溶化蠟入小油半兩勻同入泥與細末中研勻及數百遍後至凝可搓作挺蠟紙封聚每挺可重一錢

局方感應丸

治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因

氣冷因飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻併後重遲澁久利赤白膿血相雜米谷不消除而復發又治中脘雪止痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新産有傷若久有積寒吃[illegible]藥不効者並悉治之又治久病形羸荏苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊愈此藥溫無毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積聚消逐溫冷療飲食所傷快三焦滯氣

新揀丁香(去[illegible])一兩半 南木香(去蘆)二兩半 用乾薑一兩(炮)

肉荳蔻(去皮)二十個 杏仁(揀肥者去皮尖)一百四十個(研) 巴豆七十個(去皮心膜研出油[illegible])

百草霜二兩(研[illegible])

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味餘四味搗爲細末與前三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾去滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上

取蠟釋用凡春夏修合清油一兩於銚內熬令沫散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟作汁和匱藥末同劑分作小錠子以油單紙裹之旋丸如菉豆大每服三五粒量虛實加減溫水呑下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯粪白鮮與下利水穀每服五粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項疾證經月日用熱藥攻取轉並不成効者不拘老

幼虛實服無不有神効

簡易感應丸修合分兩製之法並見前方

丁香 木香 杏仁 巴霜 乾薑 巴豆

百草霜各等分

右用丸成丸子半兩入巴豆十枚去殼爛碾成膏用烏梅三箇蒸過取肉三件一處別碾令極勻丸如菉豆大今人往往見巴豆不去油不敢輕服況飲食之人既有聲色之奉於心有怯危不肯用但不知巴豆之性秉以溫煖之劑上能去花並不動臟氣

有飲則行無飲則利若病形證雖不甚壯實既有飲氣積氣之患與夫邪氣入腹大便必秘若非疾動何由得去猶豫不決則病勢攻擾愈見羸乏莫若於病始萌之時對證用之流利之後或大腑不調則以石菖蒲解之自然平治却於吹嘔方中選藥調理治心腹疼痛不可忍服十丸菖蒲湯下若未通再服以利為期服藥之後痛或愈甚既以流利痛或未除仍陰陽攪亂臟腑未平且甚痛甚者至於厥逆或面青口禁當先以蘇合香丸灌之次投

此藥治惡心嘔逆食不納食此藥微微利通方服溫脾之藥治赤白痢病心腹疼痛先以此藥微利次方斷下兼治男子痃癖疝氣膀胱奔豚腎氣脚氣攻刺入腹亦用此藥微微利之酒利痰飲為患婦人血氣並宜服

五脂丸 名通膈丸

五靈脂淨一兩 青皮半兩取末 巴豆十餘粒

右為細末水調搗成丸大人菉豆大三丸溫水下食後臨卧小兒米粒大一二丸量虛實至三五丸

若人得經年陳久飽僻中有痰涎相混不能施化
亦加至七丸傷寒當下用承氣等湯不能下者可
煎承氣湯一服此丸二五丸或五七丸即可效也

木香五靈脂丸

木香一錢 丁香一錢 肉豆蔻半兩 三稜
青皮 陳皮各半兩 牽牛半兩 五靈脂半兩
巴豆四錢去皮油

右爲細末醋糊丸菉豆大每服十五丸至二十丸
溫水下治胸膈痞悶氣不順心腹疼痛酒食所傷
等證

一佰丸

黃蘗一兩 蛤粉一兩 巴豆去皮心一兩

右將蘗爲末入粉勻再入豆霜滴水丸桐子大每
服二三丸水下

解毒丸

雄黃一分 鬱金一分 巴豆七粒去皮油

右爲細末醋糊丸菉豆大熱茶淸下七丸吐出頑
涎立便蘇省未吐再服如至死者心頭尤熱灌藥
藥不下即以鐵匙斡開或折齒灌之藥下咽喉
無有不活微吐泄不妨及上膈壅熱痰涎不利咽
喉腫滿口亦難開一切熱毒並宜服之小兒咽喉
痛驚熱痰涎壅塞服二九或三九量大小加減

軟紅丸治驚熱

杏仁二十一粒 巴豆取霜 乾胭脂一錢

右滴水丸菉豆大每服二三丸生薑湯下

比金丸

治小兒驚風帶熱喘粗涎嗽心忪頰赤大小便不
利夜臥不安

膩粉一錢 滑石半兩 南星一錢 巴豆二十一粒去油取霜
青黛一錢

右細末糊丸麻子大每服一歲兒一丸薄荷湯下
如急驚風頭熱足冷口噤面青筋脈抽掣膈中頑
涎甚者加一二丸煎桃附湯下蘇醒熱涎出立
便安愈小兒瘡疹後餘毒宜服此藥解之食後

青哦丸治喘嗽

巴豆 青黛 白礬

右細末蒸餅丸菉豆大毎服一二丸甘草湯下食後

赤金丸 [illegible]

雄黃 杏仁 巴豆各等分

右細末寒食麪丸菉豆大乾糖炒令黃各一

導氣丸 治内傷積聚痰飲等證

大黃一兩 甘草一兩麪炒 皂角一兩去皮炙 巴豆一兩去皮油

右以咀醋糊丸作餅子以穰草盒如造曲法發色

上有黃衣爲度乘風日乾亦得別入

丁香 木香 縮砂仁各三錢

與上同爲細末醋糊丸黍米大毎服二三丸白湯

下加至四五丸米湯下食後病大者七丸去黃衣

中山陳之綱南頓傳得此方

安中丸

棗十枚去核 杏仁十五箇 白礬 巴豆二十箇和皮用

右用蒸餅劑四兩内藥味味各和匀與棗和餅劑

裹慢火燒黃熟去皮一處搗成膏子如蘿蔔子大

毎服五七丸白湯下食後

透羅丹 治留胃膈痰飲酒食所傷等證

半夏一兩 皂角二兩去皮弦 杏仁八十箇 巴豆十箇

右四味用麩五升同炒令黃色爲度去麩不用爲

細末入寒食麪二兩炒黃色醋煮糊丸如菉豆大

毎服二丸生薑湯下食遠臨臥

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無損亦

無損也帝曰願聞其故何謂也大積大聚其可犯也

衰其太半及太過者死衰其太半不足以害生故

止其藥若過則毒氣内餘則敗損中和故過積聚

潔古老人治積別有法少壯人無積虛人則有之

脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若遽以

磨堅破結之藥治之疾似去而人已衰矣乾漆硇

砂三稜牽牛大黃之類藥之暫快藥過則依然氣

食消疾愈大定何益哉故善治者當先補虛氣血

壯積自消如滿座君子縱有一小人自然無容地

而出矣不問何藏先調其中使能飲食是其本也

溫白丸

治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃疸宿食朝起

嘔吐滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傷及

十腫水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化成癥瘕連年不差及瘵一切諸風身體頑痺不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及瘵七十二種風三十六種遁尸疰忤及癲癇或婦人諸疾斷緒不生治下淋瀝五邪失心憂愁思慮意不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌如鬼所使但服此藥無不除愈

川烏二兩半去皮臍炮　紫菀去苗葉及土　菖蒲去鬚九節者佳

柴胡去蘆頭　厚朴去粗皮生薑製　桔梗去蘆頭

吳茱萸七次焙用湯洗　皂莢去弦子炒　茯苓用沉水者去皮

乾薑炮　黃連去毛　人參去蘆頭　巴豆去油心膜出油研炒

桂去粗皮　蜀椒去目炒各半兩

右爲細末入巴豆令勻煉蜜丸桐子大每服三丸生薑湯下食後臨臥服漸加至五六丸

易老治五積

肺息賁　人參　紫菀　心伏梁　菖蒲　黃連　桃仁　脾痞氣　溫白丸加　吳茱萸　乾薑　肝肥氣　柴胡　川芎　腎奔豚　丁香　茯苓　遠志

治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴三兩爲末空心溫酒下桃奴是實著樹不落實中者正月採樹上乾桃是也

萬病感應丸

主治修製并見本方後有全註於上溫白丸內加

羌活半兩　三稜半兩　甘遂半兩　杏仁半兩

防風半兩　威靈仙半兩　一加上六味却減蜀椒

萬病紫菀丸全註

此藥療治久患痃癖如碗大及諸黃病每地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一切蟲咬十種蟲病及胃冷吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病婦人多年月水不通或腹如懷孕多血天陰即發又治二十種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡服之皆効

紫菀去苗土　吳茱萸湯洗七次焙乾　厚朴一兩半薑汁製

菖蒲去毛　柴胡去苗　桔梗去蘆　茯苓去皮

皂莢去皮弦子炙　杜枝　乾薑炮　黃連各半兩
蜀椒去目及閉口者微炒　巴豆去皮膜出油研　人參去蘆各半兩
川烏炮去皮半兩加二錢　加羌活、獨活　防風等分
右為細末入巴豆勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸加至五七丸生薑湯送下食後臨卧初有孕者不宜服具引於後　有楊駙馬患風氣衝心飲食吐逆徧身枯瘦日服五丸至七丸服至二十日瀉出肉塊蝦蟆五六枚白膿二升　又趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞服至五十日瀉出青蛇五七條長四寸許惡膿三升愈　王氏患大風疾眉髮墮落掌內生瘡服之半月瀉出癩蟲二升似馬尾長寸許後愈　李𨰻患肥氣服五丸經一月瀉出肉鱉三枚　如黃門卒中風病發時服藥瀉出惡膿四升赤黃水一升肉蟲亂髮相似愈　李知府妻楊氏帶下病七年月崩不止骨瘦著牀日服五丸至十丸十五丸取下膿血五升黃水一升肉塊如雞子大愈　此藥治一切風患萬病如神惟初有孕者不宜服之

痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下
膿血痢米飲下　墮傷血悶四肢不收酒下
蛔蟲絞心檳榔湯下
氣噎憂噎荷葉湯下
一切風升麻湯下
寸白蟲檳榔湯下
霍亂乾薑湯下
咳嗽杏仁湯下
腰腎痛豆淋湯下
陰毒傷寒溫酒下
吐逆生薑湯下
食飲氣塊麵湯下
時氣井花水下
脾風陳皮湯下
頭痛及心下痛酒下
大小便不通燈艸湯下
因物所傷本物湯下
吐水梨湯下

氣病乾薑湯下
小兒天風吊搐防己湯下
小兒疳病葱白湯下
小兒乳食傷白湯下
月信不通煎紅花酒下
婦人腹痛川芎湯下
懷孕半年後胎漏艾湯下
有子氣衝心酒下
產暈痛温酒下

血氣痛當歸酒下
產後心腹脹滿豆淋湯下
難產益智湯下
產後血痢當歸湯下豆淋湯下
赤白帶下酒煎艾湯下
解內外傷寒粥飲湯下
室女血脉不通酒下
子死葵子湯下
又治小兒驚癇大人癲狂一切風及無孕婦人身

上頑麻状如蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾

耆婆萬應丸

牛黃 麝香 俱研 犀角 鎊 朱砂 飛研 雄黃 研
黃連 去毛 大戟 剉炒 芫花 醋炒令赤 人參 去蘆 茯苓 去皮
乾薑 炮 肉桂 去皮已上忌火 當歸 去蘆 芎藭 芍藥
甘遂 黃芩 細辛 巴豆 去皮心炒 桔梗 去蘆
前胡 去蘆 紫菀 蒲黃 微炒 防風 去蘆 葶藶 炒
川椒 去目微炒出汗 桑皮 各一兩剉炒 蜈蚣 二十八節去頭足炒
禹餘粮 醋淬水研 芫青 二十八枚糯米同炒去翅足

石蜥蜴 去頭尾足炙用

右爲細末入研藥勻煉蜜丸如小豆大療七種癖塊五種癲病十種疰忤七種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二種瘧病十種水病八種大風十二種痺風并大頭目暗漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿連及胸背鼓脹氣堅結流入四肢或腹脹心膈氣滿無時舉發十年二十年不瘥五種不利并蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰

飲令人多眠睡消瘦無力陰入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重不能久行立婦人因産冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷白帶流出不盡時時疼痛爲患或由此斷産并小兒赤白下利及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三丸爲一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆大亦以吐以利爲度　有近病及卒病皆用多積久病少服常服微溏利爲度卒病

欲死服三丸取即差　五注鬼刺客忤服二丸男女邪病歌哭腹大如妊身服二丸日三夜一間食服之　蠱毒吐血腹痛如刺服二丸若不差更服諸有痰服三丸冷癖服三丸日三服皆間服常令微溏利　宿食不消服二丸取利　癥瘕積聚二丸日三服　拘急腹脹滿心痛服三丸　上氣嘔逆胸滿不得眠服二丸不差再服大利服二丸服日三服　瘧溫服二丸以一丸如杏仁大和酢汁二合灌下部中　水病服三丸日再服間食服之

差即止人弱隔日服　頭痛惡寒服二丸覆取汗　傷寒天行服二丸日三間食服之　小便不通服二丸不差明日更服　大便不通服三丸又內一丸下部中即通　耳聾聤耳以綿裹如棗核塞之　鼻衄服二丸　癰疽丁腫破腫服一丸如麻子大日傅之根亦自出　犯丁腫血出以猪脂和塗有孔則內孔中差　癩瘡酢泔洗訖取藥和猪脂塗之　漏瘡有孔以一丸內孔中和猪脂傅之　痔瘡塗綿筋上內孔中日別易差　瘰癧以猪脂和

塗差　癬瘡以布揩令汁出以酢汁和塗日一易差　胸背腰脅腫以醋和傅腫上日一易又服二丸　諸冷瘡積年不差以酢泔和塗之　惡刺以一丸內瘡孔中即差　蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩欲絕者服二丸　蠍螫以少許塗之　蜜蜂以少許傅之　婦人諸疾胞衣不下服二丸　小兒驚癇服一丸如米許又以塗乳令咂之看兒大小量與服之　小兒客忤一丸如米大和乳塗頭與咂之以意量之　小兒乳不消心腹脹滿一丸

如米許塗乳頭令咂取瘥　瘧疾初發前服一丸
未差更服
小射香丸 治鬼注飛尸屬疾
射香二分別研　雄黃別研　當歸各　丹砂四兩別研各　乾薑炮
桂心　芍藥　細辛各五錢　莽草炙　犀角屑
梔子各三錢　巴豆五十箇去皮心生用　附子炮去皮臍
烏頭五枚炮去皮臍各　蜈蚣一條去足炒
右爲細末和勻煉蜜丸搗至千杵如菉豆大或小豆
大每服二丸日服漸加至四丸五丸
神保丸 王海藏修製 並見局方
治膀胱氣上至兩脇心腹疼痛一投而效
巴豆　胡椒　蝎稍一　木香
右末硃砂爲衣有人患項筋痛醫作風治不効久
久又注兩脇某嘗合一投而瘥
已上例中諸藥凡用巴豆新者峻利力大陳者緩熟
丸小欲急治者宜新欲緩治者宜陳或有用新者
云藥經年愈亦待陳之意也
醫壘元戎卷第六

醫壘元戎卷第七
趙州教授進士王好古筌次
明監察御史東萊桂亭綦才命梓　兩淮巡河四明屠本畯重刊
兩淮運副姚江嚴日世校正
太陰證　先足經從湯液　後手經從雜例
仲景理中例
仲景理中湯 生治修製手見金匱首
人參　白术　乾薑　甘草
後本經加減八法　錢氏減乾薑爲溫中丸　仲
景甘草乾薑湯　仲景治霍亂改理中丸　活人枳
實理中丸　局方消飲丸　理中湯去人參加茯
苓爲調中丸亦爲調中湯　陰陽論　桂枝湯解
表四逆湯溫裏　仲景加桂爲人參桂枝湯　活
人加青陳皮治胸膈病名和中湯　許學士密和
此六味爲補脾丸　虛則補其母未有子富而母
貧者也
脾者太陰濕土脾不足陰濕之劑以補之如何用
乾薑白术以燥之是反泄濕也如何是補脾　海

藏云黃芪湯加減陰證吐血與四物各半湯補氣血
本方言丸不及湯海藏云大便爽者宜湯大便結
者宜丸以其腸胃燥濕不同也　如何仲景用丸
以治霍亂泄瀉理中去參加朴爲和中湯
衍義云今人使理中湯多不効者何也
是不知仲景之意爲必効之藥蓋用藥之人有
差殊耳如治胸痺心下痞堅氣結胸脇下逆氣
搶心理中湯主之人參白朮乾薑甘草四物等共
十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知爲
度或作丸須雞子黃大皆可奇効今人使一丸如
彈丸胸中之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用
藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛
寒人當逐宜加減甘草　飲冷傷胃吐血以理中湯
理中脘分利陰陽安定血脈只用木瓜並無血
藥在王氏易簡條下楊氏飲冷傷血服對金散止
亦理中脘分利陰陽安定血脈之意也飲冷酒過
多啖炙煿熱食發衄者理中湯一料加川芎一兩
服之平昔素不飲冷者犀角地黃芩湯之類　海藏

二

湯飲冷加血凝

血受而白脾受寒又

既內寒及傷後因寒則血藥溫以行之得其歸也

伏陰在內理當溫治

云楊師三朝三大醉至醒發大渴飲冷水三巨杯
次又飲氷茶三碗後病便鮮血四次約一盆先以
吳茱萸丸翌日又與平胃五苓各半散三大服血
止復白痢又與神應丸四服白痢乃止其安如故
或問曰何爲不用黃連之類以解毒所用者溫熱
之劑予曰若用寒藥其疾大變難療寒毒內傷復
用寒藥非其治也況血爲寒所凝浸入大腸間而
便下得溫乃行所以用溫熱其血自止經云治本
病必求其本此之謂也胃既溫其血不凝而自行
各守其鄉也

三

衍義云有一男子暑月患血痢醫妄用以涼藥逆治
專用黃連阿膠木香治之此藥始感便治則可今
病久腸虛理不可服踰旬不幾至委頓故曰理當
別藥知是論之誠在醫之通變矣循經則萬無一
失引此爲例餘皆倣此　海藏云暑月久血痢不
用黃連陰在內也
王氏易簡理中湯
治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復嘔逆或大

病之後胸中有寒時時吐咳噦霍亂之後氣虛未禁
熱藥並宜服之
人參一兩　乾薑一兩　白朮一兩　甘草一兩
右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分服爲寒氣濕
氣所中者加附子一兩名附子理中湯霍亂吐瀉
者加橘紅青橘各一兩名治中湯乾霍亂心腹作
痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即進此藥
嘔吐者於治中湯内加丁香半夏一兩每服生薑
十片煎泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯

溏泄不已者於補中湯内更加附子一兩不喜飲
水穀不化者再加縮砂仁一兩共成八味　若霍
亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方中去白朮加
熟附子名四順湯若傷寒結胸先以桔梗枳殼等
分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起
急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳實理
中湯　若渴者再於枳實理中湯内加栝蔞根一
兩　一法霍亂後轉筋者理中湯加火煅石膏一
兩　一臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半

此論三門在
至今日脉同
而證不同依
古法用藥多
有不驗皆者
恭前時世不
可不變通也

腎

腎恐燥故去朮恐作奔豚故加官桂　悸多者加
茯苓一兩　渴欲飲水者添加朮半兩　若寒者
添加乾薑半兩　腹滿去朮加附子一兩　一法
治飲酒過多及啖炙煿熱食發爲鼻衄加川芎一
兩　一法專治傷胃吐血以此藥能理中脘分利
陰陽安定血脉只用本方　中附子毒者亦用本
方　或止用甘草乾薑等分煎服仍以烏豆煎湯
解之

韓氏溫中篇

夫傷寒病之説始自黄帝以開其端由至於仲景
方陳其條目自後賢文之學莫知其數立言者云
病在表可發汗病在裏可下之或云不可汗不可
下即未嘗有溫中之説仲景傷寒論傷寒例云尺
寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺
寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰證云太陰病脉
浮可發汗宜桂枝湯又自利不渴宜四逆湯又腹
滿時痛桂枝芍藥湯辨少陰證云始得之發熱脉
沉麻黄細辛附子湯又少陰病二三日麻黄附子

甘草湯又少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉附子湯又少陰病吐利手足厥逆冷煩燥欲死吳茱萸湯又少陰病脉沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是治三陰之良法於今世用之尚有未盡證者愚嘗校量自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及每夏至以前有病傷寒人十中七八兩手脉俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣寒或腹鳴或腹痛與仲景三陰病之說脉理同而證不同因茲豈敢妄投仲景治三陰病藥

醫者方見脉沉及胸滿便投藥下之往往不救嘗斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者即胸中便快病勢重者半日許滿悶依然或有病人脉沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力太熱後必發煩燥因校量此形證今别立方以治之多得病不可不傳焉

病人但兩手脉沉細數或有力或無力或關脉短及力小胸膈塞悶氣短不能相接者便可隨脉證投溫中藥以治之

病人兩手脉沉遲或緊或緩皆爲胸中寒也若寸脉短及力小於關尺者此是陰盛陽虚也或胸膈滿悶腹中脹痛身體拘急手足逆冷宜急溫之若立春以後至清明以前宜溫中湯主之清明以後至芒種以前宜橘皮湯主之芒種以後立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯方

舶上丁香皮一兩　乾薑一兩炮　白朮二分
陳橘皮二分　丁香一分　厚朴一兩薑汁炙去粗皮

右㕮咀每服二錢水一盞入葱白三寸荊芥五穗煎至七分去滓熱服如三兩服未快尚手足逆冷嘔吐更加舶上丁香皮二分乾薑二分炮

橘皮湯　七物理中湯　厚朴丸　白朮湯
橘葉湯　以上五方並見韓氏微旨及陰證論

仲景七物厚朴湯

厚朴半斤　甘草二兩　大黃三兩　大枳實五枚
生薑五兩　大棗十枚　桂二兩

右水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加

半夏五兩 下痢者去大黃 寒多者加生薑至半斤

三物厚朴湯 治腹脹脉數

厚朴半斤 枳實五枚 大黃四兩

右水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎取三升溫服一升腹中轉動更服不動勿服

平胃散 此常在陽明例以其與太陰相為表裏故列太陰條下

蒼朮八兩 甘草二兩 陳皮五兩 厚朴五兩

加茯苓丁香白朮爲調胃散此藥亦瀉脾濕一法

加藿香半夏 加減數例並見活法 正氣飲續局方 局方平胃散加乾薑爲厚朴湯 平胃散此方大抵治脾緩濕勝中寒者效 溫疫時氣溫毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十粒煎三二服微汗出愈如未得汗以稀粥投之取汗爲度若中風自汗者不宜出汗 五勞七傷脚手心熱煩燥不安肢節酸痛加柴胡 痰嗽瘧疾加乾薑製半夏 本藏氣痛加茴香 水氣腫滿加桑白皮 婦人赤白帶下加黃耆 酒傷加丁香飲冷傷食加高良薑 滑脫泄瀉加肉豆蔻 風痰四肢沉困加荆芥 腿膝冷痛加牛膝 渾身拘急及虛壅加地骨皮 腿膝濕痺加兎絲子 白痢加吳茱萸 赤痢加黃連 頭風加藁本 轉筋霍亂加楠木皮 已上佐使止加一錢此藥不問老幼胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢浮腫腿膝酸疼婦人宮藏久冷月脉不調者加官桂 若能每空心一服注顏容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸常助元陽益

眞氣健脾飲進食和氣祛痰自然榮衛暢寒暑不侵此藥去厚朴加防風療四時傷寒極有神効已上法並用水煎

陶隱居厚朴湯 治心下至小腹痞滿

厚朴 甘艸 枳實 桂

右爲細末生薑水煎

易簡平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脅肋膨脹刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌

體瘦弱怠惰嗜臥體重腹痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜治之

蒼朮八　甘草三　厚朴五　陳皮五

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎至六分去滓食前服　惟大便秘小便多中不寒者別加潤劑　常服調元陽暖胃氣化食消痰飲辟風寒冷濕四時不正之氣　一法加茯苓丁香各三兩共成六味　治胃寒嘔吐多加生薑煎服　一法若其人氣不舒快中脘痞塞加硇砂香附子各三兩共八味生薑煎服其効尤速　一方去蒼朮餘各等分白水煎服　治酒食所傷眼睛頭面徧身黃色服之神効　一法加草果烏頭各一枚治脾寒瘧疾平胃散與五苓散相合名對金散與六一散相合名黃白散與錢氏異攻散相合名調胃散　欲進飲食加神麴麥蘗吳茱萸蜀椒乾薑桂爲吳茱萸湯

平胃散加減大畧　加藁本桔梗爲和解散　加藿香半夏爲不換金正氣散　已上二藥通治傷寒吐利　腸滑者加肉豆蔲　瘧疾寒熱者加柴胡　小腸氣痛者加苦楝茴香

調胃散

藿香葉　陳皮　甘草炙　厚朴製　半夏製各等分

右爲細末每服三錢生薑水煎

調胃丸　已上調胃散細末薑糊丸梧桐子大生薑湯下三十丸

內應散　治胸膈不快腹脇刺不嗜飲食

青皮去白二錢　生薑一錢　乾薑炮二錢　陳皮去白一錢　甘草炙一錢

右作一服入棗二枚水煎服之

易簡養胃湯

治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭疼目昏肢體拘急不問風寒二證並宜服之先用厚被蓋睡連進此藥數服加以薄粥熱湯之類佐之令四肢微汗濈濈然候乾則徐徐去被謹避外風自然解散若先自有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱則以參蘇飲款款調之或尚頭痛則以濃煎生薑湯加

葱白下聖餅子二證既除則不必服藥但節其飲食適其寒溫自然平復大抵感冒古人不敢輕易用發汗者止緣麻黃能開腠理用或不得其宜則導泄真氣因而致虛變生他證此藥乃平和之劑止能溫中解表而已初不致於妄擾也兼能辟山嵐瘴氣四時溫疫或飲食傷脾發於咳瘧或中脘虛寒嘔逆惡心悉能治療

厚朴 蒼术各半 半夏各半兩 甘草一分 茯苓 人參

藿香各半兩 橘皮去白五分 草果子半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片烏梅一箇煎至六分去滓熱服或發寒瘧或感寒疫及惡寒者並加附子足爲十味不換金散藿香正氣散皆此藥也然不若此方大備

易簡滲濕湯

治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或利大便溏泄皆因坐濕處或因雨露所襲或因汗出衣裹冷濕久久得之腰下重疼兩脚酸痛腿膝或腫小便利反不渴悉能治之

蒼术一兩 甘草一兩 乾生薑一兩 白术一兩

茯苓一兩 橘紅一分 丁香一分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服 此藥兼治脾胃不和嘔逆惡心大便時時溏泄尤得其宜 一方加橘紅丁香名腎着湯腰重而疼者大宜服此 或不因濕氣所傷止是風寒相搏以致腰疼宜服生料五積散加桃仁數箇煎服若腎虛致疼當服補藥

活人厚朴黃連香薷湯

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂或飽食豚膾復飲酪漿海陸諸品無不食之或多飲冷或卧當風濕傷脾胃食結不消陽不能降陰不能升二氣相反交錯不通所以變成吐利也百脉昏亂榮衛俱虛冷搏於筋轉筋注下

厚朴去製二兩 黃連二兩 香薷穗一兩

右厚朴黃連二味入生薑四兩同炒紫色杵爲細末與香薷同煎每服三大錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水浸換極冷頓服之冷則効

遠煎時不犯銅鐵器慢火熬非時病者亦治其中
沉冷者尤妙
局方香薷丸　香薷散二藥主療備載並見本方
錢氏異功散
人參　陳皮　甘草　茯苓　白朮
四君子湯
錢氏異功散內減陳皮餘四味是也
四君子湯
人參　甘草　白茯　砂仁

右方在四物八珍湯後
易簡四君子湯
治大人小兒脾胃不和中脘停飲大病之後宜服
此藥但味甘恐非快脾之劑增損之法見於方後
人參兩　茯苓兩　白朮一兩　甘草五錢
右㕮咀水一盞薑七片棗一枚煎至六分去滓服
一方加橘紅等分名異功散尤宜病後調理
一方去人參加官桂等分甘草等減半名甘草湯
治停飲目眩　一方去甘草加枳殼橘紅半夏等

分名六君子湯專治素有痰飲胸膈痞滿脾胃虛
寒不嗜飲食服燥藥不得者大宜服之　一方去
甘草加木香煎附名加味四柱飲治丈夫元藏氣
虛眞陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭眩目暈四肢
倦怠小便數滑泄瀉不止加薑棗煎服大病之後
尤宜用此調理　一方加黃芪白扁豆等分尤治
腸風并五痔下血面色痿黃心悸耳鳴腳軟力乏
口淡無味薑棗煎服或爲細末尤佳　此方人未
之信服者頗劾李次伊云看不在面自有奇功

易簡惺惺散
治小兒風熱瘡疹傷風時氣頭痛壯熱目澀多睡
咳嗽氣麤身寒清涕
白朮　桔梗　細辛　瓜蔞仁　甘草
茯苓　人參各等
右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片入薄荷三葉
煎至半盞時時與服錢氏方小兒壯熱昏睡傷風
風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服惺惺散小
柴胡湯升麻湯用乾葛升麻芍藥甘草等分白朮

煎服此數藥均能治瘡用之甚驗惟傷食則大便酸臭水穀不化畏食吐食宜以藥下之加巴豆感應丸并參蘇飲治諸般發熱尤爲切當并耳冷骶冷手足乍冷乍熱面赤噴嚏驚跳不安皆瘡疹之候也已發未發升麻湯消毒飲皆得其宜若三日未見形跡當以生酒塗其身上時時看之狀如蚤痕者是也或發不透或倒靨黑陷極爲利害紫草木通甘草桔梗等分白水煎服之名曰如聖散更有小兒頭昏頰赤口內熱氣小便赤澁大便秘結

此爲裏熱當用大黃當歸芍藥甘草等分白水煎服名四順飲若審是瘡疹之證不宜用此

易簡白术散

治小兒泄瀉胃熱煩渴不問陰陽並宜服之

人參　藿香　甘草　乾葛　木香　茯苓

白术各一兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎至半盞量大小與服仍用香連丸間之渴欲飲水者時時煎服任意飲之彌多彌佳

白术散治嘔吐

白术一兩　人參一兩　半夏一兩　乾薑半兩

甘草半兩　茯苓半兩　薑棗煎服

錢氏方謂小兒吐瀉當温補之每用理中丸以温其中五苓散以導其濕還進異服兼用四君子加陳皮調之若以虛損用金液丹雜以青州白丸子爲末米飲調服多服乃有効可爲之後發熱必作驚風二藥服之累有神効若胃氣已生則旋減金液丹却以異功散等藥徐徐調之若食不消脾胃虛

寒嘔吐惡心者當服益黃散用陳皮半夏青皮訶子肉甘草各一分丁香一錢量大小煎服小兒若月吐瀉非[illegible]不一詳審用藥不可差誤　有伏暑者小便必不利宜五苓散香薷散　有傷食吐瀉者必酸臭氣宜服感應丸　若虛冷者[illegible]必多宜服六神散加附子服之用人參茯苓山藥白术白扁豆甘草等分薑棗煎服　風證加天麻痢者加罌粟殼　吐瀉初定當以天南星爲細末每服和冬瓜子七粒煎服以防變癇若瀉色青當

用驚藥小兒之病與大人無異用藥一同當量力
用之惟中惡臍風夜啼重舌變蒸客忤驚癎解顱
魃病痱氣不行數證大人無之並見錢氏方
半夏湯　後有小七氣湯
人參　白术　甘草　桂　半夏　茯苓
附子
易簡四獸飲
治五臟氣虛喜怒不節勞役兼致陰陽相勝結聚
涎飲與胃氣相搏發於瘧疾悉能主之兼治瘴瘧

最有神効
人參　白术　甘草　草果　半夏　茯苓
橘紅 各等分
右同棗子烏梅生薑前等分㕮咀以鹽少許淹食
頃厚皮紙裹用水濕之慢火炮令香熟焙乾每服
半兩水二盞煎至六分去滓未發前連進數服
一方治脾寒名快脾飲用草果人參白术橘紅半
夏厚朴硇砂仁附子等分甘草減半每服四錢姜
十片烏梅一箇棗子一枚煎至六分去滓不以時

候服用此藥下紅丸子尤妙　兼治脾胃虛弱中
脘停塞不進飲食四肢無力並熱多痰飲風飲宜
前胡柴胡各一兩官桂桔梗厚朴各三分黃耆甘
草乾薑各半兩右㕮咀每服四錢水一盞半生薑
五片棗二箇煎至六分去滓熱服　一方名七寶
散用常山陳皮青皮檳榔草果仁甘草各等分每
服半兩酒水各一盞煎至八分於當發日侵晨服
之此藥既有常山恐須吐人病後愈當日大作此
[illegible]不宜服此脾胃素虛寒者用

小附子一隻炮以鹽湯浸再炮再浸如此七次去皮
切作片用水二盞薑七片棗七箇煎至七分當發
日空心溫服名[illegible]多因中脘有飲用
當山作効者以其能吐[illegible]有用辰砂黃丹[illegible]隊
之為佳　其方用黃丹一兩大蒜去皮搗膏丸作
三丸當發日臨晨嚼一丸用井花水或熱水嚥下
一法用生硫黃辰砂各爲細末寒多倍硫黃熱多
倍辰砂寒熱等者勻用每服三錢臘茶清調服臨
發日早晨進之當日或作或不作皆是其効須早

用之爲佳

易簡斷下湯 治下痢赤白無問新久長幼

白术 半錢 茯苓 半錢 甘草 半錢 草果 連皮一箇

右㕮咀用罌粟殼十四枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹爲麄末同煎作一劑水一大碗薑七片棗子烏梅各七箇煎至一大盞分二服服之赤痢者加烏豆二十粒白痢者加乾薑半錢用罌粟殼治痢服之如神但性緊澁服之令人嘔逆既用醋製加烏梅不致爲害然嘔逆吐人則不可服大率痢疾古

方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴豆感應丸十餘粒用白梅茶下令大便微利仍以前藥服之無不應手而效若脾胃素弱用肉豆蔻橘紅罌粟殼各等分爲末醋煮米糊爲丸桐子大每服五十丸烏梅湯下乘治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍爲佳如覺惡心却以理中湯四君子湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯水煮木香丸定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤非所宜若果首

尾用平和之劑決難作効必致危篤雖已欲服此則已晚矣其如地榆秦皮黃蘗苦木桐之類其性苦寒却難輕服　血痢當服胃風湯并膠艾湯之類　血者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之　若五色雜下泄瀉無時當用熊烏頭一兩厚朴甘草乾薑各一分生薑煎服　今人治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連阿膠其性本冷若所感稍輕及餘痢休息不已則服之彌効若病稍重非此可療若用其穩當則悠悠

服之乃自取困頓也

海藏黃耆湯 [illegible]

本方無茯苓治三焦氣虛自汗

人參　白术　黃耆　白芍　茯苓　甘草

陳皮　藿香　乾生薑

黃耆湯與四物湯各半[illegible]　加桂名十全散　本方去茯苓加川芎當歸名黃耆解肌湯去芎藥加白荷豆爲君子湯加藿香葉以理氣此即補脾湯也

錢氏白朮散　和中散

養脾丸

人參一兩　白朮半兩　乾薑炮二兩　縮砂仁二兩

甘草一兩半　茯苓一兩　麥糵麪二兩

右為細末煉蜜丸彈子大細嚼生薑湯下

調中人參湯

人參半兩　木香一錢半分　茯苓半錢　葛根麪一兩

甘艸分半　藿香分半錢　兼治酒毒加白朮一味

右為麁末作散水煎如細末生薑點服

解酒毒例

葛華湯

葛根麪　小豆花　藿香葉　白豆蔻

益智子　縮砂仁　香附子　車前子

葛花　葛葉　白檀　木香

丁香　沉香　橙皮　陳皮

薑屑　官桂　白朮　澤瀉

茯苓　甘草　人參各等分

右為細末湯點服酒調亦得薑糊丸桐子大酒下之亦得

橙香丸一名萬杯丸

木香二錢　白檀半兩　白豆蔻三十枚　益智子三十枚

橙皮一兩　葛麪一兩　縮砂仁三十枚　橘紅半兩

甘草半兩　沉香二錢　生薑四兩切片[illegible]

右為細末水浸蒸餅為丸桐子大細嚼一二十丸白湯下或減甘草用甘草膏子丸

不醉丹

白葛花　天門冬　白茯苓　牡丹皮

小豆花　縮砂仁　葛根　官桂　甘草

海鹽　木香　澤瀉　人參　陳皮

枸杞

右為細末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼熱酒下一丸可飲十盞十丸可飲百盞

百杯丸

縮砂仁一兩　高茶一兩　訶子一箇　麝香一錢

腦子少許

右為細末煉蜜丸每一兩作一十丸未飲酒先細

嚼一丸酒下

局方勻氣散

丁香 藿香 甘草 白豆蔻 木香

檀香 縮砂 等分爲末白湯調服

集香丸 海藏云損其心脈者以此藥治之

白豆蔻 砂仁 藿香葉 白茯苓 丁香

白檀 沉香 益智 烏藥 陳皮

甘草 人參

一法嘔[illegible]食加柿霜一法加廣茂一法加香附子一

法加乾薑[illegible]等分兩爲末點服

局方七香丸 [illegible]

丁香 廣茂 益智 砂仁 木香 甘松

甘草 香附子

五膈寬中散 [illegible]

白豆蔻 砂仁 香附子 陳皮 丁香

青皮 甘草 木香 丁香 分兩依上文

烏沉湯 主治修製並見局方

沉香 烏藥 甘草 人參

小烏沉湯 主治修製並見局方

調中快氣治心腹刺痛

香附子 二十兩 烏藥 一兩 甘草 一分

右爲細末煎湯點服

益脾丸 一名三花丸 飲酒不醉當服 (在不醉丸下)

小豆花 一兩 綠豆花 半兩 葛花 二兩 木香 二錢半

一法加紅花二錢半右爲細末蜜丸梧子大每服

十丸煎紅花湯下夜飲津液下三五七丸不醉

東垣先生治飲酒心下痞三製三黃丸

黃芩 [illegible]

右三件分兩細末糊爲丸梧子大每服三十丸溫

水下量輕重加減治熱酒所傷若傷冷酒則下神

應丸主之

七香丸 [illegible]

木香 兩半 丁香 兩 乳香 兩 藿香 兩 沉香

檀香 各半兩 人參 半 檳榔 一錢 零陵香 半兩

右爲細末蜜丸桐子大每服數丸細嚼米飲下

大七香丸

砂仁二兩半　香附一兩八錢二分　甘草　麥糵炒一兩
橘紅二兩半　藿香二兩半　肉桂二兩半　丁香一兩一錢
甘松
右同爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸每一兩分作八丸亦可每服一丸細嚼湯酒任下

集香丸
縮砂仁一兩　丁香半錢　木香半兩三錢　甘松一兩二錢五
香附子半兩　白檀半兩一錢　蓬朮半兩一錢　甘草半兩七錢
白豆蔻半兩一錢　丁香半兩　廣茂半兩一錢　沉香一兩二錢
麥糵七錢　神麴二錢　一方加神麴
右爲末醋汁浸蒸餅丸如雞頭大細嚼下

木香餅子
與前集香丸俱能寬中理氣消酒逐痰飲進美飲食
香附子四兩　川芎一兩　木香　吳白芷
甘草半兩　砂仁一兩　薑黃焙洗　甘松
桂去皮一兩
右爲細末水浸蒸餅爲丸生薑白湯任下十餅至十五餅

易簡蘇合香丸主治修製之法並見局方
白朮　丁香　硃砂　白檀　沉香
烏犀　蓽撥　龍腦　麝香　蘇合油
青木香　安息香　薰陸香　香附子
訶黎勒子
右每服一大丸沸湯少許化服治卒中昏不知人及霍亂吐瀉心腹撮痛鬼疰客忤癲癇驚怖或顛撲傷損氣奄欲絕凡是倉卒之患悉皆療之此藥隨身不可暫闕辟諸惡氣併禦山嵐瘴氣無以踰此若弔喪問疾尤不可無但市肆所賣多用腦子當用火上辟去能飲者以酒調服當用心過度夜睡不安尤宜服之功效非徒筆舌難窮

木香餅子
丁香二錢　木香半四兩　縮砂仁十二兩
廣茂十兩　檀香四兩　甘松五兩
右爲細末甘草膏丸每兩作二百五十丸捏作餅子

丁沉煎丸

丁香一兩一錢 丁皮一錢 白豆蔻九錢半
木香半錢 沉香一錢
爲末薑糊丸桐子大酒下二十丸

沉香降氣湯 治脅下支結痛濕滯澀脚氣

沉香一兩八錢半 砂仁四兩八錢 甘草十二兩 香附一斤
右爲細末每服一錢入鹽少許沸湯點服已上三
味通治淩晨霧露之氣去惡邪諸瘴治酒尤佳

調中沉香湯

沉香二兩 木香一兩 麝香一錢 甘草一錢半
龍腦一錢 白豆蔻一兩
右爲細末龍腦和勻沸湯點服半錢入生薑一片
鹽少許

金匱下痢病脉證并治

後代名醫諸書所說者皆以此爲法 夫六腑氣
絶於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絶於內者痢
不禁不甚者手足不仁 下痢脉沉弦者下重脉
大者爲未止脉微弱數爲欲自止雖發熱者不死

藏陽
下虛

下痢手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微
而喘者死少陰負趺陽者爲順也 下痢有微熱
而渴脉弱者當自愈 下痢脉數有微汗出今當
自愈設脉緊爲未解 下痢脉數而渴者當自愈
設不解者必清膿血以有熱也 下痢脉反弦發
熱身汗者自愈 下痢氣者當利小便 下痢脉反
浮數尺中自濇者必清膿血 下痢清穀不可攻
其表汗出必脹滿 下痢脉沉而遲其人面少赤
身微熱 下痢清穀者必鬱冒汗出而解 病人
必微厥所以然者其面戴陽下虛故也 下痢後
脉絶手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者
死 下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏後攻其
表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯 四逆湯見上

桂枝湯方

桂枝三兩去皮 芍藥三兩 大棗十二枚劈 生薑三兩切
甘草二兩炙
右㕮咀以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾
飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗

下痢三部皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯方見

下痢脉遲而滑者實也利未止急下之宜大承氣湯

下痢脉反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯

下痢瘥至年月日時復發者以病不盡故也當下之

大承氣湯以上數承氣湯本虛者當以別議

下痢讝語者有燥屎故也小承氣湯主之方

大黃四兩 枳實三枚炙 厚朴二兩炙

右㕮咀以水四升煮取一升二合去租分溫再服

一服讝語止者更衣者停後服

下痢便膿血者桃花湯主之方

赤石脂一斤一半全用一半末 乾薑二兩切 粳米一升

右三味以水七升煮米熟去滓溫取七合內赤石脂末一方寸匕日再服若一服愈餘勿服

熱痢下重者白頭翁湯主之方

白頭翁二兩 黃連 黃蘗 秦皮各三兩

右四味以水七升煮取一升去滓每服一升不愈更服

下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之方

肥梔子十四枚擘 香豉四兩綿裹

右二味以水四升煮梔子取二升半內豉煮取一升去滓分再服溫進一服得快吐止後服

下痢清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之方

甘草二兩炙 乾薑三兩強人可四兩 附子一枚大者

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脉即出者愈

下痢腹痛紫參湯主之方

紫參半斤 甘草二兩炙

右二味㕮咀水五升先煮紫參取二升內甘草煮一升半去滓分溫三服疑非仲景方

主氣痢訶黎勒散方

右一味細末粥飲和頓服疑非仲景方

大便不通噦數讝語小承氣湯主之方見千金翼

乾嘔下痢黃芩湯主之方王叔和云人參黃芩湯

人參三兩 黃芩三兩 大棗十二枚擘 乾薑三兩
桂枝二兩去皮

右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓溫分三服

見外臺

右此下痢一章內有治傷寒數方仲景用治雜病今全錄之使後人知云治傷寒有法治雜病有方者非也傷寒雜病同一治法矣當在六陰下卷後今錄于此

王朝奉治喘例

夫喘者麻黃湯表證也小青龍湯表水證也然麻黃湯主喘也太陽證下之喘者表證未解桂枝加厚朴杏仁湯 喘家用桂枝湯加厚朴杏仁亦佳發汗下後不可更行桂枝若汗出而喘無大熱者可用麻黃杏仁甘草石膏湯太陽桂枝證醫反下之痢不止脉促者表未解喘而出汗者葛根黃芩黃連湯

活人與華佗喘說

活人與華佗云喘者肺氣有餘也梔子黃芩湯主之

經云帝曰人有逆氣不得臥而息有音者有不得臥而息無音者有起居如故而息有音者又有得臥而行喘者有不得臥不能行而喘者有不得臥而喘者皆何臟使然願聞其故岐伯曰不得臥而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六腑之海也其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也胃不和則臥不安此之謂也夫起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也絡脉不得隨經上下故留經而不行絡脉之病人也微故起居如故而息有音也夫不得臥臥則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也帝曰善

前太陽門麻黃升麻湯發汗藥後有王朝奉傷寒喘例諸喘皆屬於上當在手太陽例然內經云五臟皆有喘故例在此後

經曰驚恐恚勞動靜皆為之變也是以夜行則喘出於腎淫氣傷肺故有墮恐喘出於肝淫氣傷脾

有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者着而病也故動靜勇怯皆能成疾形志苦樂各有受病不可不知

聖惠方治十種水氣喘滿不得卧

右螻蛄五箇曬乾爲末米飲調下半錢至一錢小便通快爲便

潔古老人方

右用螻蛄去頭尾與蒲萄心同搗露七日曬乾爲

末淡酒調下暑月溫用尤佳

喘爲脾胃虛弱飲食持重少血飽氣滿久勞飲食勞傷脾主脾氣不及接行動而火上行則氣上衝不下水飲也

喘滿嘔噦皆屬於上嘔病吐噦皆屬於中噦病下痢皆屬於脾痞病腫滿皆屬於濕故手足太陰病手足陽明病嘔吐喘促傷胃虛實寒熱傷寒雜病俱混說於太陰條下

醫壘元戎卷第七

醫壘元戎卷第八

明監察御史東萊桂芹恭才命梓

趙州教授進之王好古纂次

兩淮運同四明屠本畯重刊

兩淮運副姚江嚴畧世校正

太陰證

草豆蔻散 食前服思食 食後服消食

草豆蔻 麪裹煨熟取藥去皮用仁半兩 乾木瓜 一兩半去瓤子

縮砂仁 半兩 黃蘗 一錢 甘草 二錢 益智仁 去殼二錢

陳皮 二錢 鹽 炒二錢

右一法加神麴一兩麥蘗七錢半一法加烏梅肉三錢

局方草豆蔻散 王宗顯解本 立見本方

草豆蔻丸 王海藏法

右以草豆蔻爲細末生薑汁打糊爲丸桐子大每服二三十丸米飲下嚼服亦得

易簡縮脾湯

解伏熱除煩消暑毒上吐下利霍亂之後服熱藥過多煩燥宜服之

草果四兩　烏梅四兩　縮砂仁四兩　乾薑二兩
甘草四兩
右㕮咀每服五錢水一碗生薑十片煎八分以熊水浸冷極冷旋旋服之一方治尊年人加附子一兩一方加炒白扁豆二兩暑月多以此代熟水飲之極妙若傷暑頭痛發熱宜用此下消暑丸若因飲食生冷過多至霍亂吐瀉者宜用此先以治中湯二陳湯之類煎服煩燥甚者方以浸冷[illegible]湯服之自然平治今人往往爲香薷飲之誤才見霍

亂遽爾投之殊不知夏月伏陰在內因食生冷以致霍亂豈可投以浸冷之藥故合先治中脘方以此藥解其煩燥不可不知若飲水過多小便赤澁當服五苓散　若盛夏於道塗間爲暑氣所悶倒不省人事急投在陰涼之處切不可與冷水以布巾衣物等蘸熱湯熨臍下及丹田氣海及續以湯淋臍上令徹臍腹溫煖即漸甦醒若商賈及備齎之人倉卒無湯捌路中熱土於臍上撥開作竅令溺其中幷以大蒜爛碾以水調灌下一法用道中熱土急爛碾冷水調服仍以蒜少許置鼻中氣透則蘇續以白虎湯竹葉石膏湯之類凡覺中暑者急嚼生薑一大塊冷水咽下暑氣中人愼不可以冷水亦不宜單以冷水灌之來復丹消暑丸皆可用也

橘皮丸　調中順氣　生津止渴

烏梅肉一兩　白朮半兩　木瓜二兩　乾生薑二錢二分
白茯苓半兩　橘皮半兩　沉香半兩　糖霜二兩

右爲細末煉蜜爲丸每兩作二十五丸欲作湯水用水化開寒熱溫涼任意飲之噙化亦可

法製陳皮　消食化氣寬利胸膈

烏梅肉半兩　白檀二錢半　茴香炒二兩　甘草二兩炙
乾生薑半兩　青鹽炒一兩　陳皮半兩湯浸去白取淨薄切細末

右件除陳皮外並爲細末用水一碗藥末三兩同陳皮一處慢火煮候陳皮極軟控乾少許別用乾藥拌勻焙乾每用不以多少細嚼嚥下無時

蓽撥丸

此方與衍義同治下之後不能食食後必胸痞常

服益氣消食　衍義有陳皮

薑屑　麥蘖　神麯末（各少許等分）

右麯糊爲丸桐子大米飲湯下三十丸

御方思食丸（並見活法）

神麯（一兩）　木瓜（半兩）　烏梅肉（二兩）　麥蘖（一兩）

人參（半兩）　乾生薑（二錢半）　茯苓（半兩）　甘草（七錢）

桂（半兩）

右爲細末蜜丸每兩作十丸、

熱則泄肝膽（口苦舌乾）柴胡　烏梅　寒則補脾胃

思食丸

木香（一錢）　沉香（二錢）　半夏麯（五錢）　麥蘖（一兩）

陳皮（五錢）　烏藥（一錢）　檳榔（一錢）　人參（三錢）

白朮（五錢）

右件爲細末煉蜜丸桐子大每服三十丸米飲下

一法有烏梅肉神麯麥蘖乾生薑爲細末蜜丸

蘭省香糊飯丸

丁香（二錢）　沉香（二錢）　木香（二錢）　縮砂仁（半兩）

益智（半兩）　神麯（三錢）　麥蘖（半兩）　白檀（二錢）

三稜（三錢）　陳皮（二錢）　青皮（三錢）　甘松（一兩）

藿香（二錢）　甘草（一兩）　蓬茂（半兩）　香附（一兩）

右爲細末蒸餅丸

大生薑丸

補脾胃治口苦舌乾中脘不和脹滿嘔吐食不化

酒病翻胃

人參（一兩）　良薑（一兩）　丁皮（一兩）　桂心（一兩）

丁香（半兩）　桔梗（半兩）　川芎（半兩）　白朮（半兩）

嘔噦一條本出於胃當例陽明條下以其脾病連

及於胃若食生冷硬物先入胃次傳脾所以中州之病並稱之曰脾胃故叔和云脾藏象中坤安和對胃門後又云二斤十四兩三斗五升存是爲脾連及於胃也戊與巳合何嘗有二哉今此嘔噦諸證湯丸等劑雖屬於胃姑例於太陰條下古人交經用藥何嘗相離

王朝奉嘔論

嘔者病源云熱在脾胃也胃家虛冷亦嘔也噦者胃家虛冷也又病人本虛伏熱在胃則胃滿故冷

氣逆故欬。傷寒證：桂枝證、小柴胡證、合病葛根加半夏證、黃芩加半夏證、小青龍證、四逆證、眞武證、梔子等湯證，皆有嘔，各自主治。然小柴胡湯等主嘔也。嘔而發熱者，小柴胡也。嘔而飽滿者，吳茱萸湯。乾嘔吐涎沫者，吳茱萸湯。金匱諸嘔吐穀不得下者，小半夏湯去茯苓。胸中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心憒憒然無柰者，生薑汁半夏湯。噦逆，陳皮竹茹湯。乾嘔而利者，黃芩加半夏生薑湯。嘔噦手足逆冷者，小陳皮湯。嘔噦胸滿虛煩不安

大橘皮湯

仲景云：傷寒咳逆脉散者死。成注云：火刑肺金也。朱奉議以噦者為咳逆，非也。噦，胃也，非咳逆可知。奉議小半夏茯苓湯，生薑煎；小半夏橘皮湯，生薑煎汁；半夏湯、橘皮湯，陳皮、生薑二味煎。

大橘皮湯 [illegible]

陳皮二兩 甘草二錢炙 人參半兩 生薑二錢

右㕮咀，分作二服，水煎服之。

橘皮青竹茹湯

陳皮二錢 竹茹二錢 人參二分 甘草二錢

右作三服，薑煎。

溫中丸 治胸寒嘔吐咳嗽自利

半夏湯泡 乾薑等分

右為細末，生薑和汁丸桐子大，每服二十丸，木瓜湯下，薑湯亦可。

海藏橘皮茯苓生薑湯 治咳逆解面熱止嘔吐

陳皮一兩 炙草三錢 生薑二錢 茯苓半兩

一法加葛根、神麯、半夏，㕮咀煎服。

活人治嘔噦手足逆冷橘皮湯

橘皮 生薑

活人大半夏湯 治痰飲脾胃不和

半夏 生薑 茯苓

右為麁末，水煎。如熱痰，加炙甘草；脾胃不和，加陳皮。

活人半夏生薑湯 治嘔噦欲絶

半夏 生薑 二味同煎服

桔梗半夏湯

治冷熱不合胸痞滿痰涎不利氣逆嘔噦
桔梗 半夏 陳皮各等分
右爲粗末水煎細末薑糊丸亦可
活人橘皮竹茹湯治噦逆
陳皮 竹茹 人參 甘草各等分
右剉薑棗煎服
大橘皮湯
治動氣在上不可下食則吐隨證加減
陳皮 人參 甘草 生薑 棗 竹茹

㕮咀水煎
橘皮半夏湯治積氣痰癖不下飲食嘔逆不止
陳皮二兩 半夏二兩 生薑一兩半
右㕮咀水五盞煎至二大盞去滓分三服食後臨
卧服之
半夏茯苓陳皮湯治痰飲止嘔和中順氣
茯苓 半夏泡 陳皮去白 生薑各一錢半
右㕮咀水二盞半煎一盞去滓臨卧溫呷之
湯簡二陳湯

治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不
快或發爲寒熱或因食生冷脾胃不和並宜服之
陳皮去白五兩 半夏五兩 茯苓三兩 甘草
右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎
至六分去滓熱服無時傷寒後不敢進燥藥者亦
宜服餌如痞疾加草果一兩半下紅丸子如因酒
食所傷發爲黃疸亦宜用此二藥嘔吐甚者加丁
香并服半碗丸一法仍用半夏爲末每一兩入丁
香一錢旋以生薑自然汁丸如桐子大先以湯二

盞煎沸次下丸子藥煮令極熱以匙挑服用藥汁
嚥下更服養正丹或來復丹黑錫丹之類候大便
利即愈如妊娠惡阻古方用茯苓半夏湯服者病
反增劇不若用此藥極有神驗一方名枳實半夏
湯治痰飲停留胸膈痞悶或咳嗽氣塞頭目昏重
喘嘔惡心項背拘急半夏陳皮各一兩枳實減半
加生薑煎服一方名丁香茯苓湯治久積陳寒流
滯腸胃嘔吐痰沫或有酸水全不思食用木香丁
香乾薑附子半夏橘皮肉桂縮砂仁等分加生薑

煎服一方名曰白术半夏湯治脾虛停飲痰逆惡心中脘刺痛腹脅攪疼頭目昏暈肢節倦怠不思飲食用白术丁香赤茯苓各一兩半夏六兩肉桂半兩陳皮二兩半亦加生薑煎服生薑乃嘔家聖藥凡嘔吐宜多用之爲佳

易簡四七湯

治喜怒悲思驚恐憂之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情之氣所爲也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏五兩 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇葉二兩

右㕮咀每服四兩水一盞半薑七片棗一枚煎至六分去滓熱服無時若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最爲切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方七氣湯有半夏五兩人參甘草官桂各一兩生薑煎服大治七氣幷心腹絞痛然藥味太甚恐未能止疼順氣 一方治七氣所傷中脘不快氣不升降腹脅脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤妙好事者謂其耗氣則不然蓋有此病服此藥也

赤茯苓湯

順氣消痰止嘔調中益氣補胃祛濕

陳皮 半夏 川芎 人參 白术 赤茯苓

右爲粗末薑水煎服

衍義有人留患氣嗽將期或教以服陳皮生薑焙乾神麴等分爲末糊丸桐子大食後臨睡服三十丸米飲湯下舊有膀胱疾自此皆愈

乳和薑皮湯治赤白下痢神驗

陳皮一兩 薑屑二錢

右二味用牛乳一大盞和藥煎熱去滓入生牛乳一半頓服

溫胃和痰丸治中寒停飲胸膈痞塞痰涎

半夏三兩湯洗 橘皮二兩去白 乾薑一兩炮 白术二兩

右爲細末薑汁糊丸桐子大每服二十丸薑湯下

無時

大橘皮丸 趙十一郎家製之

陳皮去白 茯苓 甘草 塩淹薑 葛根麯

右細末煉蜜丸彈子大細嚼白湯下

小七氣湯 當在大半夏湯條下

治虛冷上氣喘塞不通

半夏洗六錢 桂心一錢 人參一錢 生薑半兩

右㕮咀水四盞煎至二盞去滓三服相繼服無時

活人小半夏加茯苓湯

治諸嘔噦心下堅滿膈間有痰火心悸

半夏五兩湯洗七次 茯苓去皮三兩

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞秤生薑四錢取自然汁投藥中更煎三兩沸熱服無時

青龍散 治咳嗽上氣不得

人參 陳皮 紫蘇葉 五味子

右細末每服三錢水一盞薑五片煎至七分去滓溫服

活人橘皮湯 治小兒傷暑痰逆咳嗽

陳皮 甘草 人參

右為麁末竹茹生薑棗煎如不惡寒者加竹葉

玉液丸 玉芝丸 主治修製並見局方

文潞公生犀丸 並見藥準

易簡消暑丹 見暍證附

局方玉壺丸 主治修製並見本方易老加黃芩名大煮食化丸

治頭風目眩喎斜及風痰等證並見活法機要

南星 半夏 天麻 白麵

辰砂化痰丸 主治修製見局方

辰砂 南星 白礬 半夏

易老水煮金花丸 主治修製並見活法機要

南星 半夏 天麻 寒水石 雄黃

白麪 生薑

右細末滴水丸桐子大煮熟生薑湯下

小黃丸 修製並見活法機要

黃芩 南星 半夏 生薑

右薑汁打糊為丸

定喘丸

治虛人咳嗽胸滿及鼻息音大喘行坐無時連年不已或遠或近並能治之

人參二錢半　南星三錢　半夏三錢　葶藶半兩

右末之以生薑自然汁糊丸黍粒大每服三五十丸生薑湯下漸加亦可小兒服減丸數

二炒丹

治精滑夜夢鬼交溲出白液飲食少虛勞病或嘔或吐

半夏半斤　木猪苓半斤

右先以猪苓去皮切作片子同炒微黃色半夏另爲細末用陳米飯搜和爲丸豌豆大風涼一夜次日將猪苓爲粗末炒熱下丸子同炒稍乾爲度乘熱以紙褁至冷用木合子盛貯一法酒糊丸

消痰丸

細辛　桔梗　陳皮　旋覆花　神麯

枳實　半夏　茯苓　麥蘖　白朮各等分

右爲細末薑汁糊丸桐子大薑湯下三五十丸食後服

安和丸老虛人丸宜服之

粟殼二兩炒　陳皮二兩　炙草二錢半

一法加烏梅半兩爲細末薑糊丸

玉芝丸　玉液丸

加生薑人參霍香名人參半夏丸

易簡參蘇飲　惺惺散主治並見少陽柴胡例

仲景葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰不得臥兼治支飲不得息又見金匱

苦葶藶炒香搗　大棗二十枚

右丸如彈子大每用水三升大棗十枚煎二升化一丸再煎一升

三聖丸治喘嗽而目微腫

甜葶藶二

右末棗肉爲丸菉豆大每服三十丸臨臥薑湯下

仲景猪膏丸

治少陰病下痢咽痛胸滿心煩邪氣自少陽經傳入少陰客熱

右用猪膚一斤水一斗煮取五升去滓入白蜜一

升白粉五合熬香和粗得分作六服

仲景白通猪膽汁湯　四逆猪膽汁湯 並見仲景本經

仲景猪肚丸

白朮四兩　牡蠣燒碎　苦參三兩

右爲細末猪肚一枚內藥末線定煮軟熱切碎碾泥成膏和丸桐子大每服三十丸米飲湯下

又猪肚黃連丸 見本草

錢氏香連丸　橘連丸 並見本門

猪肚丸

治骨蒸唇紅頰赤氣粗口乾身壯熱多虛寒大便秘小便赤食減少

鱉甲醋炙一兩　柴胡一兩　木香一兩　生地黃一兩

青蒿一兩　黃連一兩　青皮半兩

右爲細末嫩大猪肚一枚入藥在內緊定蒸軟藥肚仍碾勻可丸如菉豆大每服三十丸米飲湯下食前日三服忌熱物濕麪

補眞丸一名大眞丸

天門冬二兩去心　羊肉三斤去筋膜　肉蓯蓉十兩去皮

當歸五兩去蘆

右已上俱作片子焙乾爲末焙先將羊肉煮去羊血水洗淨再煮至熟去綿細筋膜研爛再入無灰酒煮至成膏入上項藥末及糯米粉子半斤再煮數十沸至稠粘膏子爲度再入下項藥

黃耆六兩　遠志　白朮二兩　赤茯苓四兩

枸杞二兩　沉香半兩　神麴五兩　乾山藥二兩

右爲細末入上件膏子內同和更入宿蒸餅麪上數兩搜和成劑至可丸即止丸如桐子大每服空心溫酒送下七八十至百丸

猪蹄湯

知母　貝母　牡蠣

右爲細末猪蹄四筒慢火煮軟熟用調服三錢七後滋味汁一碗投之以時就蹄任意食用或先食蹄飽後服亦得

海藏評解利傷寒丸藥雜例 並見本方注後

玄胡丸 方缺

玄胡(□□) 青皮(□半) 陳皮(□半) 三稜(□□)
廣茂 當歸 乾薑(各半兩) 雄黃(五錢另研細)
右醋糊爲丸酒亦得每服二三十丸白湯下無時
解利内外傷
紫霜丸
治傷寒温壯内夾冷食或因得汗身熱不除及變
蒸發熱日久不解飲食成癖俗呼爲食迷風
代赭石(火煅醋淬一兩) 杏仁(五十箇去皮尖麩炒另研)
赤石脂(爲末一兩) 巴豆(三十粒去皮心油淨)

右合碾勻湯浸蒸餅爲丸黃米大小兒生三十日
以外可一丸一年二年可三丸乳下米飲亦可
無名丸(解内外傷) 與四生丸例相似在半夏條下
代赭石 貫衆(一兩) 自然銅(三兩二錢醋淬九次)
寒水石 黑豆(去皮□兩) 茯苓(一兩)
右件通爲細末水糊丸菉豆大每服三五十丸鹽
湯下米飲亦得
無名丸料
寒水石(一兩□□) 貫衆(末之三錢半) 代赭石(火燒醋淬末三錢半)

黑豆麪(去皮一兩) 茯苓(末之二錢半) 自然銅(□□□末)
右無名丸此藥不知來例別無解利味數止是貫
衆治頭風有毒大抵解疫癘毒氣則効非若古法
之分經也本草云代赭石苦甘寒治鬼疰賊風自
然銅辛平無毒療折傷散血止痛貫衆治頭風半
夏治傷寒寒熱巴豆辛温主傷寒温瘧寒熱或煎
亦解利右此三藥雖云治傷寒只治因内感而發
出者多効若外感一日太陽受之不宜用此等之
藥性者不可執此以解利外傷此藥大抵只治内

而不治外不能行經若要行經非湯液不能也代
赭石自然銅二味兼以醋淬過煅以苦酒上火亦
同能上行故解利也若以代赭石自然銅二石性
論下行之體無疑更宜詳紫霜丸主治傷寒温壯
内夾冷食一句即知無名體也
天麻辰砂丸(治内外傷)
天麻(□兩) 雄黃(半兩) 硃砂(三錢) 巴豆(□□□□)
右爲細末每服三五丸白湯送下温酒亦得食後
麪和丸黍米大

玄胡丸內有雄黃乾薑苦酒與此一體解利在厥陰

門木香檳榔例後

安先生傳易老解利二藥

狼毒　大戟　草烏頭 生各等分

右爲末醋糊丸桐子大每服五七丸或十丸温水

送下

解利傷寒嗃藥

乾山藥 兩　藜蘆 [illegible]

右細末以紙撚嗃之

楊氏內解丸

芫花　紅棗子 各等分

右細末醋糊丸菉豆大温水下二三丸無時以葱白

醋米湯投之

四生丸

南星　半夏　芫花　自然銅 等分以上皆生用之

右爲細末醋打蕎麪糊爲丸菉豆大如酒積痰飲

胞膈脹滿飲食不消每用五丸臨卧温水下忌熱

物如傷寒時疾煎豉湯下一十丸三服解如心氣

大痛醋湯下海藏云非湯液所用丸藥解利世多

不同皆取此例

拾遺

大腸泄　小腸泄　大瘕泄　飧泄　洞泄

寒中　寒濕　溏泄　泄瀉　濕淫

燥濕　濕熱　風濕　鶩溏　胃泄

脾泄　脫肛　臟毒　瘀血

凡此數條俱見湯液大法後

翻胃例

御醫楚待藥白能丸

治膈氣翻胃吐食大便結硬大便如常者不可

服

半夏 洗　輕粉 [illegible]　白麪 [illegible]

右搗末和勻水和作其字或丸湯煮熟漉出放温

臨卧作一服生薑湯下取下燥糞核爲度

生薑半夏湯 止嘔吐開胃消食

半夏 二錢洗　生薑 二錢切作片子

右量水多少煎至七分

殺鬼體散 [illegible]

帝曰脾脈鼓脹可刺耶岐伯曰先泄其脈血絡後調其經刺其血絡也

薑棗湯　此後二藥辛甘以助天五之氣

乾棗十枚　甘草二兩炙　生薑五兩切片

右件盆盛布蓋淹一宿焙乾為末每一盞入鹽少許點服鹽二兩炒白另入藥

棗艾丸 補胃

乾棗去核　熟艾搗如棗核大入棗中

右以綿纏定濕紙裹塘灰火內煨紙焦為度一日服二個空心細嚼鹽酒下每日加一個至九日後日減一個至三個依前再加一個十三遍當進飲食也胃氣壯即止不飲酒鹽湯下

太陰拾遺

脾後癖脾胃所傷變易形法

凡諸脾脈微洪傷苦澁物　微弦傷冷硬物

微澁傷辣辛物　微滑傷腥鹹物

微遲傷冷痰積聚惡物　弦緊傷酸硬物 [illegible]

微實主膈間有伏痰或吐　洪緩傷甜膩物

緊惡膈間有硬積寒熱　單伏主物不消化

微浮胸中有小蟲動又主寒熱　單緊主胸中急痛

單弦主胸中氣聚喘促　單洪主寒熱吐不食

單滑主脾寒吐逆　單浮男寒不進食

浮洪而數皆中酒

海藏所定脾脈一十七道安方大畧

傷苦澁物經云鹹勝苦　傷辛辣物經云苦勝辛

傷腥鹹物經云甘勝鹹　傷酸硬物經云辛勝酸

傷甜膩物經云酸勝甘　傷冷硬物經云以克之

冷痰積聚惡物溫胃化痰膈間有伏痰或吐春夏吐之秋冬導之

膈間有硬積寒熱溫化　胃中有小蟲檳榔之類

物不消化麴蘖三稜莪朮之類　胃中急刺痛理中元之類

胃中氣聚喘促勻氣湯　寒熱吐逆不食橘皮半夏白朮茯苓

脾寒吐逆枳實理中湯　胃寒不進食烏梅白朮

弦洪而數皆中酒葛根陳皮茯苓

金匱痰飲咳嗽病脉證治後代名醫所說皆取此爲法

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲又問四飲何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲○後水流在脅下欬唾引痛謂之懸飲○飲水流行歸於四肢當汗出而不出汗身體疼痛謂之溢飲○其人欬逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲○水在心心下堅築築短氣惡水不欲飲　水在脾吐涎沫欲飲水　水在肺少氣身重　水在肝脅下支滿而痛　水在腎心悸　夫心下有留飲其人背寒冷大如手　留飲者脅下痛引缺盆欬嗽則輒已（輒作轉）胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛　脉沉者有留飲　膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背疼腰疼目眩自汗出其人振振身瞤劇必有伏飲　夫病人卒飲水多必多暴喘亢食少飲多水停心下甚者則悸微者氣短　脉反弦者寒也皆大下後善虛脉偏弦者飲也　肺飲不弦但苦喘短氣

支飲亦喘不能卧加短氣其脉平也　病痰飲者當以溫藥治之　心下痰飲胸脅支滿目眩　以茯苓桂白术甘草湯主之方

茯苓（四兩）　白术（五兩）　炙草（二兩）　桂枝（去皮三兩）

右㕮咀以水六升煮取三升去滓分溫服作三服小便則利夫氣短有微飲當從小便去也亦以上藥主之腎氣元亦主之（方見脚氣論中）

病者脉伏其人當自利利者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也以甘草半夏湯主之方

金匱要略卷之八

甘遂（大者三枚）　半夏（十二枚以水一升煮取半升去滓）

芍藥（三枚）　炙草（如指大一枚）

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤和藥煎取八合頓服之

夫病懸飲者十棗湯主之方

芫花（熬）　甘遂　大戟（各等分）

右三味擣篩以水一升五合熬大棗十枚煮取八分去滓內藥強人一錢七弱人半錢平旦溫服之不可者明日更加半錢下後糜粥以養之

病溢飲者當發其汗宜大青龍湯方

麻黃去節六兩　桂枝去皮二兩　炙草二兩　生薑三兩

石膏如雞子大細研　杏仁四十枚去皮尖　大棗十枚去核

右七味㕮咀以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升被覆令汗出汗出者溫粉撲之一服汗出者勿再服若復服汗多出者亡陽逆虛惡風煩躁不得眠也

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之方方見咳嗽論

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈防己湯主之方

防己三兩　桂枝二兩　人參四兩　石膏雞子大十二枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫再服虛者即愈實者三日復愈如不愈者宜去石羔加茯苓芒硝湯方

防己二兩　桂枝二兩　人參四兩　茯苓四兩

硭硝三合

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利止

心下有支飲其人苦眩冒澤瀉湯主之方

澤瀉五兩　白朮二兩

右二味㕮咀以水二升煮取一升去滓分溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之方

厚朴一尺去皮　大黃六兩　枳實四枚熬

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓溫再服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之方

嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

半夏　生薑

右以水七升煮取一升半去滓分溫再服

腹滿口乾舌燥此腸間有水氣防己椒目葶藶大黃湯主之方

防己　椒目　葶藶　大黃各一兩

右四味為末蜜和丸桐子大米飲服一丸日三服稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯

主之方
半夏二升洗 生薑一斤半 茯苓三兩一方四兩
右㕮咀水煎服
師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不
能消穀胃中虛冷故吐也脉弦者虛也胃氣無餘
朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之令脉反
或名曰虛寸口脉微而數則無氣無氣則胃虛胃
虛則血不足血不足則胸中冷趺陽脉浮而濇浮
爲虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐宿食不化
名曰反胃脉浮而濇其病難治 病人欲吐者不可

下之 噦而腹滿視其前後知何部不利利之則
愈 嘔而胸滿者茱萸湯主之方
吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩 大棗十二枚擘
右四味㕮咀以水五升煮取一升去滓溫服七合
日三 則乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之方
嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之方
半夏半斤湯洗 黃芩 人參 炙草 乾薑三兩切合
黃連一兩 大棗十二枚

右七味以水七升煮取六升去滓再煎服一升日
三服
乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之方
黃芩三兩 炙草三兩 半夏半斤洗 芍藥二兩
大棗十二枚 生薑半兩切
右㕮咀水一斗煮取三升去滓分溫三服日二服
夜一服
諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之方方見痰飲中
嘔吐而病在膈上後思水者急與解之猪苓湯主之
方

猪苓去皮 白朮 茯苓各等分
右㕮咀水煎服
欬滿則止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱
藥此法逐渴反不止者爲支飲也支飲法當治胃
胃冷者必嘔水復與半夏以去其水方
茯苓四兩 乾薑三兩 五味子半斤 細辛三兩
炙草三兩 半夏半斤湯洗七次
右六味㕮咀以水八升煮取三升分溫三服

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐痺故不內麻黃乃內杏仁也若逆而內麻黃者以人必厥所以然者爲其血虛麻黃發其陽故也

茯苓四兩 乾薑三兩 甘草三兩 五味子半斤碎

細辛三兩 半夏洗 杏仁去皮尖各半斤

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓溫又服

若面熱如醉狀者此爲胃中熱上薰其面令熱加大黃湯主之

茯苓四兩 乾薑二兩 細辛二兩 大黃三兩

五味子碎 半夏洗 甘草炙 杏仁去皮尖各等分

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服

並見于金方

先渴却嘔爲水停心下此屬飲家小半夏加茯苓湯主之方

金匱嘔噦下痢病脉證治後代名醫諸書皆取此以爲法

夫嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自已 先嘔却渴此爲欲解先渴却嘔爲水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以其心下有支飲故也此屬支飲 問曰病人脉數數爲熱當消穀引飲而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數云見前

假令病人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也五苓散主之 方見局方

如心胸有停飲酒宿水自出水後心胸中虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲方 附方

茯苓三兩 人參二兩 枳實二兩 生薑四兩

白朮三兩 橘皮二兩半

右㕮咀以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之 見外臺

欬家其脉弦爲有水十棗湯主之 方見上

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯 久欬數歲其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸故也治屬飲家 欬逆倚息飲小青龍湯主之 方見肺癰中

青龍已下多唾口燥寸沉尺微手足厥逆氣少復

上衝咽喉手足痺其人面赤如醉因復下流陰股
小便難時復冒者可與桂枝五味子甘草湯治其
氣衝方

茯苓四兩去皮　桂枝四兩去皮　炙草三兩　五味子半斤

右四味㕮咀用水八升煮取三升去滓分溫三服

衝氣即低而反更欬滿者茯苓五味子甘草去桂加
乾生薑細辛治之方 一名甘草五味薑辛湯

茯苓四兩　炙艸三兩　細辛三兩　五味子半升碎

乾薑三兩

右㕮咀水八升煮取三升去滓分溫三服

嘔吐而滿在膈上後思水者猪苓散主之方 見前

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯
主之方

炙草二兩　乾薑一兩半切片　附子一箇去皮切作片子用

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫
再服強人可伏附一枚乾薑三兩

嘔而發熱者小柴胡湯方

柴胡　人參　黃芩　生薑三兩

炙草　半夏　大棗十二枚去核

右七味㕮咀水一斗二升煮取六升去滓再煎取
三升溫服一升分三服

胃反嘔吐者大半夏湯主之方 今主膈間支飲

半夏三升洗　人參三兩切　白蜜一升

右三味以泉水一斗二升和蜜揚之二百四十遍
煮藥取二升半去滓溫服一升餘分再服 千金云治胃反不受食食已即吐或嘔心下痞硬者

食已即吐者大黃甘草湯主之方

大黃四兩　炙草二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升去滓分溫再服 外臺云治吐水

胃反吐而渴欲飲水者茯苓白朮澤瀉湯主之方

茯苓半斤　澤瀉四兩　桂枝二兩去皮　炙草二兩

白朮三兩　生薑四兩切

右六味㕮咀以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取
二升半去滓溫服八合日三服 外臺云主消渴脉絕胃反吐食之方

小麥

吐後渴欲得飲而貪水者文蛤湯主之方（兼主微風脈緊頭痛）

文蛤（五兩） 麻黄（三兩去節） 炙草（三兩） 杏仁（五十枚去皮尖）

石膏（五兩碎） 生薑（三兩切） 大棗（十二枚擘破）

右七味㕮咀以水六升煮取二升去滓溫服一升汗出愈

乾嘔吐逆涎沫半夏生薑散主之方

半夏（洗） 生薑（各等分）

右二味杵爲散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無柰者生薑汁半夏湯主之方

生薑汁（一升） 半夏（半升洗）

右二味㕮咀以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半去滓水冷分四服日三夜一若一服止停後服

乾嘔噦若手足厥冷者橘皮湯主之方

橘皮（四兩） 生薑

右二味切以水七升煮取三升去滓溫服一升下咽即愈

噦逆者橘皮竹茹湯主之方

橘皮（二升） 竹茹（三升） 大棗（三十枚擘） 生薑（半斤切）

人參（一兩） 炙草（五兩）

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分服一升日三服

右此痰飲欬嗽一章內有治傷寒數方仲景用治雜病今余錄之使後人知云治傷寒有法治雜病有方者非也傷寒雜病同一治矣

醫壘元戎卷第八

醫壘元戎卷第九

趙州教授進之王好古纂次
明監察御史東萊桂亭綦才命梓
兩淮運同四明屠本畯重刊
兩淮運副姚江濮昌世校正

少陰證　先足經從湯液　後手經從雜例

仲景真武湯 主治修製並見本方

茯苓　芍藥　生薑　白朮　附子

茯苓四逆湯 主治見本經修製亦存

茯苓　乾薑　人參　甘草　附子

四逆湯

甘草 炙　乾薑 [illegible]　附子 生

四逆加人參湯　四逆加豬膽汁湯 主治見本經 [illegible]

四逆散

柴胡　枳實　芍藥　甘草

欬加五味子　悸加桂　腹痛加附子

泄痢下重者煎薤白內藥小便不利加茯苓海藏云此散因從少陰四逆從舉或欬或悸故用此散若果四逆手足厥冷下痢腹痛更不復用此散也

薑附湯 [illegible]

乾薑 炮　附子 炮

朮附湯 [illegible]

白朮　附子

白通湯 [illegible]

附子　乾薑　葱白

易簡真武

治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉四肢沉重疼痛大便自利小便或利或澁或嘔者皆宜服之若已經汗下不解仍發熱者心下悸頭眩暈身瞤動振振欲擗地者此由渴後飲水停留中脘所致並宜服之

茯苓　芍藥　熟附 各二分　白朮 二分

右㕮咀每服四錢姜五片水一盞半煎至八分去查溫服小便利者去茯苓大便利者去芍藥加乾姜二分嘔者每服加生姜五片同煎欬者加五味子二分細辛乾薑各一分發熱而渴者服此未退當投四逆湯仍服震靈丹用之應手而愈此藥不

性陰證傷寒可服若虛勞之人發熱自利將復增
寒皆宜服因取名固真湯增損亦如前法
易簡四逆湯
治陰證傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱作小
便或澁或利脉微緊腹脹滿手足厥冷或悸或欬
內寒外熱下利清穀四肢沉重或汗出厥逆者或
汗出熱不去並宜服之及治一切虛寒冷厥或傷
寒病有表證誤下之續後下利不止雖覺頭疼體
痛發熱惡寒四肢拘急表證悉具未可攻表宜服
此藥以助陽救陰次服桂枝以解表證
甘草一兩　乾姜三分　熟附三分
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
利止虛者加人參半兩嘔者加生薑一兩面赤者
每服加葱白一根腹痛者加芍藥一兩利止脉不
出者加人參一兩○霍亂吐瀉之後尤宜服之陰證
傷寒或無汗唇青面黑身背強痛四肢厥冷蹷不
知人如欲服四逆易湯先與附子散用附子三分官
桂甘草白朮各半兩半夏乾姜各一分為煎服被

寒取汗或氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省人
事者當灸臍下丹田氣海灸以葱一握以索纏如餅大
切去根葉存白二寸以烈火熁一面令通熱勿令
灼人乃以熱處搭病人臍上以熨斗盛火熨之
溫則易以他餅其人蘇醒手足溫而有汗乃善仍
服四逆姜附之類
易簡姜附湯
治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口
吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治陰證
傷寒大便自利而熱者
乾姜　熟附各二兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓服或虛
寒藥大燥即以附子理中湯相繼服餌姜附本治
傷寒經下之後又復發汗內外俱虛身無大熱晝
則煩燥夜則安靜不嘔不渴六脉沉伏並宜服此
不知脉者更宜審之兼治中脘虛寒久積痰水心
腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆一方附子易以生者
名白通湯治寒下利一方用白通湯加白朮倍

之則草減半名生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹滿身重手足緩縱自汗失音不語便利不禁一方用姜附湯加麻黃白朮甘草人參等名附子麻黃湯治中寒濕昏[illegible]緩弱項背强急口眼喎斜語聲渾濁心腹䐜脹氣上喘促不能動轉更宜審而用之

易簡附子湯

治風寒濕合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著四肢緩縱腰脚痠疼 仲景附子湯方內亦有此方在厥陰門

生附 去皮　芍藥　官桂　甘草　茯苓

人參 各等分　白朮 [illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎至六分去滓食前服惡甜者減甘草一半兼治疲極筋力氣虛倦怠四肢痠疼 一方治歷節風四肢疼痛如搥鍛不可忍者加乾姜半兩去生附加熟附等分名附子八物湯煎如前法若尋常寒濕相搏頭疼兩脚軟痛及氣虛頭眩止用白朮附子各一兩甘草半兩棗姜同煎服合增損朮附湯久履濕地腰重脚軟凡宜服之若爲濕氣所中則白朮倍附子之數仍用白朮半兩酒一盞煎至六分連進數服取微汗即愈不能飲者以水煎若冒雨濕著于肢體肌膚或腠理開汗出澡浴得病於增損朮附湯中加茯苓官桂如甘草之數名茯苓白朮湯

白通加猪膽汁湯

附子　乾姜　葱白　人溺

猪膽汁

通脉四逆湯

減溺　以上通治寒藥

麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯 以上通治和表藥

仲景附子湯

附子　人參　白朮　茯苓　芍藥

甘草附子湯　四物附子湯內減生姜是也

四物附子湯

附子　官桂　白朮　甘草　乾薑

易簡附子湯 見前姜附湯後 與下方主治異

附子[illegible]湯　四君子湯加桂附芍藥

外臺五六日傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不
能轉側不嘔不渴下之脉浮虛而澀者加桂枝附
子湯若大便鞕小便自利者附子白朮湯

桂枝附子湯

桂心四兩 附子二枚炮去皮破 生薑三兩 炙草二兩 乾棗十二枚破

右五味切以水六升煮取二升去滓分温三服忌
生葱豬肉海藻菘菜

附子白朮湯

白朮四兩 棗十二枚擘 炙草二兩 生姜三兩 附子三枚炮作四片

右五味切以水六升煮取二升去滓分温三服初

一服其人身如痺半日許復服之都盡其人如冒
狀勿怪此以朮附性走皮中逐氣未除故使人如
冒狀也 本云附子一枚加之二枚名附子湯忌見
前 千金翼同 張仲景治法當加桂枝四兩此本一
方二法以大便鞕小便自利故去桂也以大便不
鞕小便不利當加桂枝附子三枚恐多也虛弱家
及產婦宜減服之 一句即知男子婦人同一治也
男子服四物以滋血亦與婦人同

少陰證 王朝奉論辨

悸者動也肺深內有虛熱則渴而飲水水氣乘心故
寒而心悸也 傷寒二三日心中悸而煩小建中湯
發汗臍下悸欲作奔豚 發汗過多心下悸欲得
按者桂枝甘草湯 發汗止仍發熱心下悸身瞤
動眞武湯 傷寒脉結代心悸動炙甘草湯 少
陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃不和煩而悸
小柴胡湯 傷寒厥而心下悸宜先治水茯苓甘
草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利矣 中風
往來寒熱或心下悸小柴胡湯 錢氏曰病見夏

水勝火腎勝心也當治腎悸者病甚重者當悸動
者小搐也 易老云腎水乘心者悸仲景不治木
火調其水也

丁朝奉辨陰陽證

夫病發熱而惡寒者發於陽也不發熱而惡寒者發
於陰也發於陽者可攻其外發於陰者可温其內
發表以桂枝温裏以四逆湯 張仲景論少陽通
脉四逆證面色赤又少陰下利脉沉遲面色小赤
此二證皆戴陽然當下利清穀爲異也凡少陰證無

陰病過用熱藥反見熱證不妨涼解
陰證發狂熱實便硬承氣慎用

汗出茵蔯湯[illegible]證脈陰陽俱緊少陰脈微細欲吐也又汗出為陽微故仲景云陰不得有汗脈陰陽俱緊而反汗出為亡陽屬少陰也仲景論傷寒脈浮自汗出小便數脚攣急反與桂枝攻表誤也常器之云使合用桂枝加附子湯治之若誤服桂枝湯即便有發厥吐逆讝語等證治具本論太陽上篇中孫兆云陽證即頭痛身熱脈洪數也陰證則微頭痛而身不熱脈沉細遲微　凡陰病宜與四逆理中輩皆自愈若夏月得陰證亦用四逆大熱宜與理中最佳也　又云大抵發熱惡寒者是表證屬太陽也只惡寒是陰證也然陰證即有發熱者盡是表從裏寒故脈必沉遲或手足微厥或下利清穀更以別證驗之可知也　又云本是陰病醫與熱藥過多卻見熱證者亦斟酌以涼藥解之　又云陰證形靜無發狂者惟餌溫藥過多胸中熱實或大便硬有發狂者亦宜用承氣湯輩下之不可輕用　本是陽病熱證斷決吐下過多遂成陰證者卻與理中四逆輩溫之　病源云傷寒病過經而不愈脈反沉遲手足厥逆者此為下部脈不至陰陽隔絕邪客於足少陰之經毒氣上熏故咽喉不利或痛而生瘡

仲景甘桔湯例

仁宗御名如聖湯治少陰咽痛

炙甘草兩一　桔梗兩三

右麄末水煎加生姜煎亦可　一法加訶子皮二錢煎去查飲滿名訶子散治失音無聲如欬逆上氣者加陳皮如涎嗽者加知母貝母如酒毒者加葛根如少氣者加人參麥門冬如吐膿血者加紫菀如疫毒腫者加黍粘子大黃如徒渴者加五味子如嘔者加生姜半夏如目赤者加梔子大黃如胸滿膈不利者加枳殼如不得眠者加梔子如心胸痞者加枳實如腹痛者加黃芪如面目腫者加茯苓如咽痛者加黍粘子竹茹如肺痿者加阿膠能續氣如發斑者加防風荊芥如聲不出者加半夏

喘痰門

經云帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在肺下其爲病也使人強上冥視唾出若涕惡風而振寒此爲勞風之病帝曰治之柰何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出清黃涕其狀如膿如彈子大從口中出者從鼻中出者則傷肺傷肺則死也

肺痿之門在太陽門

孫思邈單方一門並見金匱極方

甘草二[illegible]

右㕮咀以水三升煮取一升半分作三服

此證初得可治久則難愈脈微緊則膿未成脈緊數則膿已成喘而不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶[illegible]

右件件成丸以水三升煮大棗二十箇取二升去查內藤黃五味子各半兩取清飲頓服令三日服一劑差叔和云衂血吐血沉細宜忽然浮大即傾危唾血之脈沉弱吉忽然實大死來侵脈要云肺脈搏堅而長當病吐血法云肺虛極則終逆逆血渴故唾血出也

無汗惡寒脈浮緊

傷寒得者麻黃

肺痿上枯水之源下竭水之本

傷酒得者葛根

有汗惡熱脈沉實

甘桔二生湯

治欬胸中滿振寒脈數咽乾不渴時濁唾腥臭久久吐膿如米粥肺痿作癰也膿在胸中者爲肺癰

甘草　桔梗[illegible]

右剉以水三升煮取一升去滓分二服必然吐出膿血矣　又一方治一切欬唾膿血及欬及出不止　好酥三十斤三徧煉停取凝成醍醐服合日三服差

海藏紫菀散

善治欬唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參　紫菀　知母　桔梗　貝母　甘草

右麁末生姜水煎一法加五味子一法加茯苓一

法加阿膠

經云陽明司天嗽出白血者其狀淺紅如肺色故曰白血

海藏云以正對化分輕重

人參紫苑散

治唾膿血以有甘桔故入少陰例以肺腎爲子母當補肺以生腎水之源以泄命門使五液不上行也及以金花丸酒製冬葉丸青黛爲衣隨經增損並見本條又以易老門冬飲加天門冬人參保定

肺家有以四君子湯倍生姜大益脾胃以固中州又以三才丸加當歸以補肖氣如嗽血從治者加桂枝乾姜

寸口脉虛實之圖

微爲發渴者欲危始病可救

虛小者爲肺痿熱之所過傷肺爲膿

寸口脉二者皆欬唾膿血在胞中

實大者爲肺癰血爲凝滯化爲五色

數爲發不渴者難治成膿難已

如聖丸

治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰咳嗽膿血胞滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久久咯膿狀如米粥

龍腦 研另　牛黄 研另　桔梗　甘草 生用各一兩

右爲細末煉蜜丸每兩作二十丸每服一丸噙化

嗽藥青龍散

石膏 兩八　朴硝　甘草 一兩生用各　青黛 兩半

右爲細末每服二三錢薄荷湯點熱漱冷吐

治肺痿唾膿涎痰唾多出血心中温温方

右以甘草一味重二兩以水三升煎作一升半分爲三服

百部丸 治諸嗽不得氣息唾膿血

百部根 兩一　升麻 半兩　桂心　五味子

甘草　乾姜 各一兩

右爲細末蜜丸桐子大飲服三丸日三以和爲度

衍義蛤蚧散 在陽明經

治肺虛欬久成瘡吐膿血

犀角 羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧炙

排膿散 治諸瘡膿汁不絶腐盡

黄耆 白芍藥 香白芷各等分

右為細末乾上患處上用膏藥敷貼一日一換

海藏云此方雖云止瘡吐膿血久不盡者亦宜用此

藥作湯散煎調服之又宜糊為丸桐子大白湯下

三五十丸或乾糝細末咽津大妙

錢氏如聖散

桔梗 甘草 阿膠炒白

煎甘桔取清內膠化

桔梗枳殼湯

陳皮一兩 桔梗一兩半 甘草七分 枳殼半兩

姜煎服

橘皮茯苓湯

陳皮一兩 茯苓半兩 甘草七錢

右為細末生姜煎服 一法加麻黄杏仁治外感

咳嗽嘔加半夏 如嘈加竹茹寒者加乾姜

桔梗湯

桔梗 半夏製 陳皮各一兩 枳實半兩

生姜煎服

黄耆鱉甲散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥

咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脅不利減

食多渴欬唾稠粘時有膿血

知母焙 桑白皮去皮 黄耆去蘆 甘草炙

赤芍藥 紫菀去蘆已上六味各五分淨 秦艽去蘆

白茯苓去皮 [illegible] 忌火 生地黄

柴胡去蘆 地骨皮去骨已上各八分淨

肉桂去皮不見火 人參 苦桔梗已上三味各二分淨

鱉甲 [illegible] 天門冬湯泡去心忌火令焙已上一味各二錢

[illegible] 半夏五分

右為麄末每服二大錢水一盞煎至七分去滓溫

服食後 海藏云此方內用黄耆疑當是黄耆

也然內有黄芩有小柴胡今治虛熱妙 有盜汗

亦無妨也兼加知母地骨皮亦芍藥即錢氏地骨

皮散也治盜汗亦妙內有桂枝治發熱惡寒即柴

從傷寒而唾膿血表症猶在故用麻黄等捐

胡加桂也天門冬人參地黃即三才丸也參北丸皆胡甘草鱉甲芍藥即黃龍湯也紫苑桔梗甘草即紫苑散也桂芍黃耆甘草即黃芪建中湯也又云此方治本無傷寒風而得仲景麻黃升麻湯治唾膿血從傷寒而得孫真人治唾膿血用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒而得也內多五味子皆祖仲景法盤以解傷寒傷風皆可加五味子又云桔梗一味有辛有苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

御藥院方

珠砂[illegible]

珠砂 珍珠末 生犀角 人參

琥珀末 甘草 金箔

粉 蘇合油 牛黃 麝香

龍腦 南鵬砂 琥珀 羚羊角

遠志 赤茯苓

安息香

右爲細末入研藥極細煉蜜丸蘇合油和諸藥爲

一氣子更以金箔爲衣每兩作五錠每服一錠角子大噙化人參湯下亦得並阿膠丸相雜服尤勝至

寶鑑

肺痿癰其皮如麩糠有胃脘成癰其皮緊如甲錯有腸癰裹大膿血於腸間之證 叔和云寸芤積血在胞中關內逢芤腸裏癰

定肺散

知母 貝母 人參 枯芩

烏梅肉 御米殼 白术

右爲細末水煎生姜湯點亦得蜜丸彈子大噙化亦得

定肺丸

欵冬花 紫花 知母 貝母 人參

甘草 桑白皮 御米殼 麥門冬

百部 馬兜苓 五味子 烏梅肉

已上十二味各等分

右爲細末煉蜜丸彈子大噙化一丸

[illegible]丹

桔梗 生甘草 大黃 當歸 荊芥

癟吞

右等分細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸

蛤蚧散 治勞嗽

蛤蚧一對 炙甘草 麻黃去節 南星炮 人參

半夏泡 知母 貝母 烏梅肉 瓜蔞

槐花子炒各等分

右爲細末生姜五片水煎服

古方紫菀散

紫菀一兩 款冬花一兩 百部一二錢

右爲細末烏梅湯點服生姜亦得 如欬加五味

子喘加杏仁 渴加烏梅 氣逆加陳皮 頭痛

加細辛一錢甘草二錢 氣脫者加御米殼蜜炒

麁末水煎

增損防風通聖散

桔梗 桑白皮 紫菀茸 鼠粘子各半兩

荊芥穗二兩 甘草一兩五錢

右爲麁末防風通聖散各一半和勻每服四錢水

一盞半生姜五片煎至七分去查溫服食後

咽痛例

仲景有口瘡赤爛之證上實下虛熱重咽喉又脾熱

重上焦故口生瘡宜

升麻六物湯

升麻 梔子各二錢 大青 杏仁 黃芩各一錢半

右爲粗末每服五錢七水一小盞半葱白三莖煎

至一盞去查溫服又法黃蘗蜜漬一宿噙之嚥汁

勿絕差

咽喉備急丹

青黛二兩 芒硝二兩 姜蚕一兩 甘草四兩

右四味爲細末用臘月牛膽汁見有黃者盛藥於

其中懸於背陰處四十九日裝過多尤妙如用時

旋取如腮喉咽閉用箄子大塊碾碎爲末以竹筒

子吹入咽喉內愈

人參清肺散 治咽喉腫痛並痰閉

人參一兩 白附子七錢 盆硝一兩 連翹一兩生用

黃連一兩 山梔子一兩 大黃半兩 黃芩半兩

甘草（生用二兩） 薄荷（生一兩）
右為麄末水煎每服三錢水一盞半煎至七分去
查食後温服
代鍼散（治咽喉腫痛氣急難咽）
硼砂（一錢為君） 白礬（一錢半為臣） 牙硝（一錢為良）
硝石（四兩為佐） 黄丹（五分） 巴豆（十粒去殼）
右為末吹喉中
發聲散（治咽喉腫痛語聲不出經驗方）
栝蔞皮（□） 白殭蚕（炒去頭） 甘草（各等分炒黄）

右為末每服三錢温酒調下或生姜自然汁調下
更用半錢綿裹噙化津液亦得不拘時服三日兩
服
解毒丸見前安肺丸後治熱上攻咽喉腫痛 又治
咽喉腫痛飲欬者喉閉急也（小兒□備丸實熱□定奪用之）
白殭蚕 南星（各等分）
右件生用同為細末生姜自然汁調服立愈
鵬砂散
治心氣熱毒內發咽喉生瘡腫痛木舌脹腫甚悶

塞水食不下
玄參 貫衆 茯苓 縮砂仁 滑石
荊芥穗 山豆根 甘草（□）
南鵬砂（三兩） 薄荷（一兩）
右為細末每服半錢新汲水調下或乾摻舌上嚥
津
消毒散
治咽喉腫痛小兒瘡疹已出不匀雖出不快壯熱
狂躁咽膈窒塞卧睡不安大便秘澁
牛蒡子（炒四兩） 甘草（一兩） 荊芥穗（一兩）

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去查温服
食後
漱藥地黄散
治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞不通或生
服舌
黄芩（八兩） 甘草（一兩） 荊芥（一錢） 薄荷葉（一兩）
右為細末每服二錢水一盞入薄荷少許同煎三
五沸去查熱漱冷吐無時

玉壺丸治三種癭在少陽條下

海藻　海帶　昆布　雷丸各等分

右細末米飲為丸如榛子大噙化徐徐使藥不斷食後神効

五痺散治五種痺

大黃　白姜蚕炒各等分

右細末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一處調服以利為度

赴筵散治舌上瘡不能食

銅綠研半兩　香白芷末一兩

右拌和勻摻舌上溫醋漱立愈

振悸酸棗仁例

胡洽酸棗仁湯治虛勞不得眠

酸棗仁　人參　白朮　茯苓各二兩　甘草五錢

右切以水斗半升生姜六兩同煎三升分作四服

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸

酸棗仁一兩生用　金錠茶二兩生姜汁塗炙令微焦

右為細末每服二錢水七分煎令六分無時服之

活人酸棗仁湯治傷寒吐下後心煩乏氣晝不得眠

酸棗仁四升　麥門冬去心一升　甘草炙二兩　川芎二兩

知母二兩　茯苓三兩　乾姜三兩

右麄末每服四錢水煎服

酸棗仁飲子

酸棗仁半炒二錢　人參一錢　陳皮去白一錢　五味子一錢

桂心半錢　茯苓一錢　生姜

右㕮咀水三盞煎至一盞半去查分作二服

海藏百合四君子湯治老人虛不得眠

心虛則熱收于內定志丸補心丹

腎虛則寒動于中八味丸腎氣丸此二藏不足者補之

心盛則生熱瀉心湯三黃湯

腎盛則生寒姜附湯四逆湯此二藏有餘者寫之

收于內動于中則異于所生之寒熱豈可止一熱字便作熱斷止一寒字便作寒斷哉矣當看前後上下文勢則可也

定志丸臨證加料

體竭不足加生地黃當歸　肺氣不足加天門冬麥門冬五味子　心氣不足加上黨人參茯苓菖蒲　脾氣不足加白朮白芍藥益智仁　肝氣不足加天麻川芎　腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮　膽氣不足加細辛酸棗仁地榆　神昏不足加硃砂預知子茯神

八味定志丸

補益心神安魂魄治痰去胸中邪熱理肺腎

人參　菖蒲　遠志　茯苓　硃砂　白朮

麥門冬各等分

右煉蜜丸桐子大米飲湯下三十丸無時每服十丸日三服亦可

局方定志丸

治心氣不足五臟不安悲憂不樂忽多夢遊朝差暮劇狂旺不寧

遠志　菖蒲　茯苓　人參各三兩　茯神二兩

硃砂另研

右細末煉蜜丸桐子大硃砂爲衣米湯下五十丸日三作散服亦佳名茯神丸

保眞定志丸

黃連　破故紙　藕節　蓮子肉

保神丸調和心腎補養精神

白茯苓　黃連　菖蒲各二兩　遠志一兩

硃砂半兩一半入藥一半爲衣

右爲細末浸蒸餅爲丸如桐子大硃砂爲衣陰乾每服五十丸煎人參湯送下臨臥加七八十丸一法定志丸加保眞黃連丸治勞

黃連　茯苓各等分

右爲細末酒糊丸桐子大茴香酒鹽湯下破故紙湯下亦得說不盡者一切製度並取前後例

又方此陰陽各半

黃連　茯苓各五錢　破故紙　菖蒲各十錢

右爲細末酒糊丸桐子大每服五十丸空心鹽酒湯任下

預知子丸主治并法見本方於定志丸內加預知子

山藥　枸杞子　柏子仁　地骨皮　黃精

人參茯神湯

人參　茯神　遠志　菖蒲　甘草

麁末水煎服

千金翼聖惠同補心虛治健忘令人耳目聰明用戊日取東引桃枝三寸枕之開心目不忘

菖蒲

右擣爲細末服方寸匕食後令人耳目聰明從外見裏坐見千里之外令人長生去三百病毒不能

侵

開心明目使人不忘

遠志去心　茯神去木　菖蒲各等分

右合服方寸匕食後服之令人不忘大聰明

神注丹　後丁香與神注同法

延壽丹

人參　菖蒲　遠志　白朮　枸杞　茯苓

天門冬　麥門冬　生地黃

栢子仁　車前子　地骨皮

五味子　茯神

右爲細末煉蜜千杵石木臼丸各從製法

補心丹

茯神　遠志　人參　菖蒲　硃砂

右爲細末糊丸桐子大猪心血拌和丸亦可

保眞秘一丹

白茯神　木猪苓各一

右切作塊微煨透去猪苓不用茯神細末一兩好蠟一兩溶開和作八丸平旦向東空心細嚼嚥津

服吸一口同嚥

張天師草還丹

此藥久服輕身隨風而去如列子之乘也若髮白者從根而黑如未白者永不白有不信者將藥拌飯與白猫食者一月黑

地骨皮　生地黃　石菖蒲　牛膝酒浸一宿

遠志去心　菟絲子酒浸三宿焙黃

右等分細末煉蜜丸桐子大每服三十丸空心溫酒下鹽湯亦得修製忌婦人雞犬見此上下少臣上下徵除之藥也

海藏云若加天門冬人參則爲三才丸也又爲上下太陰與增損三才丸相爲表裏

日月丹

麝香二錢　乳香一錢　茴香炒一錢　沒藥炒二錢

丁香二錢　木香一錢　木通二錢　代赭石

蓮子肉二錢　蛤蚧一對　硃砂一錢半

青娘子六箇去頭足　紅娘子六箇

右細末糯米糊丸櫻桃大單日一丸雙日兩丸空心溫酒下至十日爲度後再服

醫壘元戎卷之

仲景腎氣例

仲景八味丸

熟地黃補腎真水　肉桂補腎益火　附子能行諸經而不止

牡丹皮補神志不足　白茯苓　澤瀉去胞中

乾山藥　山茱萸

右八味皆君主之劑若不依易老加減服之終不得効若加五味子爲都氣丸述類象形之藥也

聖惠云名地黃丸能伐腎邪皆君藥也宜加減用

楊氏云常服去附子加五味子桃公張文仲削

此方可治半身不遂及痺證

加石膏不解疑是石斛

後加減不同其說雖甚然莫若易老之說爲念

易老云治脈耗而虛西北二方之劑也金弱木勝水少火虧或脈鼓按之有力服之亦効何也答曰緊者爲寒火虧也爲內虛水少也爲木勝也金弱也故服八味丸亦得効　益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光錢氏地黃丸減桂附

無比山藥丸　一名萬安丸

茯苓丸箧中秘室方與上方同且錙銖異耳欲進食者加鹿茸欲身肥者加石斛欲體潤者加栢子仁欲能記不忘者加遠志

醫壘元戎卷之

易老天麻丸

天麻　牛膝

玄參　杜仲

萆薢　當歸

附子　羌活

獨活　生地黃一斤

易老云治脈強而虛東北二方之劑也木弱水少火虧西南有二濕熱一也燥熱一也視上二法則三間

可知爲孀苟而者更當以逆順推之天下之能事畢矣易老補丸春秋二分之氣

東坡四神丸

一翳又云專此四味者久服可以愈大風疾

羌活　玄參　當歸　熟地黄

素問云不知持滿不時御神務快其心逆於生樂常御一十女而登天令人有妾而喪命以不知陰陽之要故也人之交會陽氣秘密神不妄施生氣以強而能久長有若空瓶小口頻濺不入爲無出者氣故不得入也又如虛管以水注滿拈竅懸之水滴不洩無爲入者氣則不得出也故當志不亂意不狂真不泄是謂得要世以戰勝氣交河逆龜飲諸法皆不及黃帝法内即用藥固裏外不用陰引陽陰陽合會氣過屏翳倒行上入升至九天即成太丹素問云兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂至度大凡陽氣發盛中外相應先得陰氣女子而亦然後陽施而不縱爲則無傷也又云勇者氣強而已怯者着而爲病爲得陰之氣能養

足陽不可肆行以失其精所以陽勝則強也陽氣能狼陽氣絕傷陰平陽秘精神乃治荀或力強努氣乃傷高骨乃壞何以久常帝曰以人療人真得其真所以長久百觀爲補

孫真人口訣　東坡先生論議當在此下　後有仲景治陰股汗出一條在仲景沒石子條下續以此條在三才丸後并螽斯等丸

天門冬例

古方天地丸 一名保真丸

天門冬　地黄　二藥忌鯉魚

右各等分不犯鐵石器用木杵臼搗爲細末煉蜜和丸桐子大空心酒下三五十丸誤犯鯉魚以浮萍草解之

補隨煎

天地丸内加當歸是也 三才天地丸以人參足也

增損三才丸 一名補腎丸 一名延壽丸

天門冬 去心　熟地黄 洗 酒蒸　人參 去蘆

茯苓 去皮　遠志 去心　五味子　鹿茸 酥炙

一法加白馬莖酥炙　一法加附子補相火不足
一法加麥門冬令人有子　一法加續斷以續
筋骨　一法加沉香暖下元虛冷　右木杵臼搗篩
可搗細稀綃羅則可若密恐不下煉蜜杵千下然
後丸如梧桐子大每服五十丸空心好酒下　年老
加沉香衣全一入藥
服天門冬例
…降令曰聞卿年出一百歲而體力不

衰耳目聰明顏色和悅此蓋奇事也何所服食施行
可得聞乎相密不封上疏對曰臣聞天地之性人
爲貴人之所貴莫貴於生生荒唐無始劫運無窮人
生其間或如電過每一思此惘然心熱生不再來
逝不可追何不抑情養性以自保惜今四海晏定
大平之象豆須展才布德萬年無窮當修道
道甚易知但不能行臣嘗聞道人蒯京年已百七
十八歲而甚丁壯常服食玉泉啄齒使人
丁壯有顏色去三蟲而堅齒玉泉者口中唾也朝

以古治婦人手
宮寒冷玖服
蒯姑君由共
乾益下疾大

旦未起早漱津令滿乃吞之輒啄齒二七遍如此
者亦名曰煉精蒯道人年二百而少告臣言但取
天門冬去心切乾之搗取方寸匕日三服令人不老
有補益無損可以壽而康也諸藥本草及諸子書
具傳其載功德久服皆能成僊不爲虛語

二茸丸

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　兎絲子酒浸　石斛去蘆　枸杞子
巴戟　山茱萸　沉香　白茯苓　澤瀉
乾山藥　五味子　杜仲炒各二兩

冬夏二至加鹿茸四兩酥炙四十巳上加天雄二
兩　右爲粗末煉蜜丸梧子大空心溫酒下三五
十丸

螽斯丸治婦人無子經產

厚朴　杜仲　秦艽　桂心各三錢　防風
附子各六錢　白薇　半夏　乾姜
牛膝　沙參各二錢　人參四錢　細辛五錢
茯苓六錢
右並生用杵羅爲末煉蜜丸小豆大每服五丸空

心温酒下漸加至十九不妨十餘日覺娠三日絞
不可更服　有一人妻年二十九歲服藥十二日
有娠餘藥與石門主簿其妻斷産十三年服此藥
有子又餘藥與前太守子中舍孚交其妻年四十
九歲亦十服此藥十三日有娠若妳婦不宜服此
藥　婦人有娠若食馬肉難則當産出月始皇母
先懷而後御恐知鬼教食馬肉則延期而生
混元丹此藥可增入三才丸
胞衣一箇頭次兒者尤用酒浸焙乾細剉爲末

經驗後方
華山錠子茯苓研側如栗許大令四方有肉安新
瓶罐中以好酒浸三重紙封其頭候百日開其色
如餳糖可日食二塊百日後肌體潤澤服一年後
可夜視物久久服之血化爲筋延年耐老面如童
子
治婦人始覺妊娠養胎轉女爲男
雄黄一兩囊盛帶之
又治耳聾方

雄黄　硫黄
右等分爲細末綿裹塞耳中
神注丹 在定志丸前
茯苓四兩　硃砂四錢
右糯米酒煎茯苓至輕切作片子陰乾爲末入硃
砂末二錢和勻乳香水打糊爲丸桐子大硃砂爲
衣餘不盡者養藥陽日二丸陰日一丸要穀新汲
水下要逆氣過空心温酒下疑作陽一陰二可較
也

丁香丸
丁頭代赭石半兩　丁香三錢有君者　舶茴二錢
南乳香三錢紫色者另研
右二味先杵碎爲末次二味搗羅爲末後入香和
勻重羅至勻好釅醋浸蒸餅爲丸如雞頭大好心
紅三錢爲衣當辰火日合藥并火日初服一日一
丸次日二丸三日一丸四日二丸週而復始至十
日爲度許十丸每服早晨汲新水迎日光照水然
後飲嚥送下

孫眞人枕中記服茯苓百日百病消除二百日夜如晝三年後能使鬼四年後玉女來從

抱朴子云任子季服茯苓十八年玉女來從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

紫石英丸 治婦人絕子宮 [illegible]

紫石英 二兩研水飛 天門冬 去心 當歸 切 川芎

紫威 卷柏 去根 桂 川烏 炮去皮臍 熟地黃

蕪荑 石斛 去根 禹餘糧 [illegible] 辛夷仁 各二兩

桑寄生 續斷 細辛根 厚朴 [illegible]

乾薑 [illegible] 食茱萸 牡丹皮 人參 牛膝 [illegible]

[illegible] 柏子仁 另研 甘草 炙 烏魚骨 燒灰 山預

右二十六味爲極細末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫酒米飲任下空心食前日二

溫經湯

當歸 川芎 人參 芍藥 牡丹皮 桂

甘草 阿膠 炒 吳茱萸 各三兩 見炒已上 半夏 二兩 [illegible]製

麥門冬 五兩去心洗

作羔大

治子宮寒

右剉每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去查得清內膠化開溫服食前空心此劑即調和也

抱朴子法

婦人絕嗣孕 弓弦用緊腰 三箇月足候

胎氣受逍遙

內藥續生丸 並見珍珠囊藥後

母丁香 附子 枯礬 肉豆蔻

烏魚肉

右製度綿裹內陰中打糊入藥內爲裹丸綿裹內之

又方治帶下絕產

川烏 枯礬 炮

右等分細末蜜丸彈子大綿裹內陰中

太白薇丸 小白薇丸 熟地黃丸

澤蘭丸 [illegible]

牡丹煎丸 [illegible] 保安丸 保命救生丹 並見[illegible]

御方茯苓丸多服宜子孫

肉蓯蓉 [illegible]

透風

羊脊骨連髓二三兩別物研銀器中水一大盞煮十二四件澄清

鹿腰脊髓或羊腰脊髓不拘多少 松子仁湯浸去薄皮研半兩

胡桃仁湯浸去薄皮研泥半兩 山藥不拘多少

右將上件物於羊骨汁內先入松泥胡桃仁作羹熟入五味隨意調和空心與服餌鵝鴨飛琉黃鱔魚鷄等皆可作羹食用鴨子亦可

粳米與熟雞頭泥相和作粥食之可以益精髓強心志耳目聰明粳亦作糕夏月食鷄頭肉次食粳米粥俱亦妙

萬安丸一名山藥丸一名茯苓丸

茯苓酒浸四兩 山藥半二兩 五味子半二兩 杜仲切焙三兩

牛膝酒浸 兎絲子酒浸 赤石脂 紫巴戟去心各二兩

白茯苓 澤瀉 熟地黄

山茱萸各一兩七錢

右各搗細末另拌茯苓末酒熬膏和丸桐子大每服五十丸空心温酒下忌犬醋羊血白水物七日內發色精神 茯苓丸四加法欲進者加白馬莖骨如無以鹿茸代之陰下濕痒者加蛇床子一兩

保安丸

治胎前產後三十六種冷血風半身不遂手脚疼痛又治八風十二痺疝瘕乳中風淋血聚胎動不安子死腹中胎衣不出赤白帶下嘔逆惡心痰滿臍下痛此方出草細辛條下

赤茯苓 牡丹皮 芍藥各三兩 茱萸一兩 沉香一兩

人參 當歸 桂 牛膝 白芷

木香 藁本 麻黄去根節 川芎 附子

細辛根 澤蘭 甘草炙 凝水石 防風

桔梗 蟬殻各半兩 生地黄 馬胡退各一兩用新出卷紙并泡吞一頸退下皮即眞馬病退也先頭蟻非退也乃生地蚕人以其無退實故以茶蠶蠶蛾月既應習以六家可皆當以筆之

一法加細墨乳香各少許 一法以硃砂爲衣

右爲細末煉蜜丸彈子大每服一二丸細嚼酒下

大効牡丹皮散

治五臟虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱支節拘急疼痛胞膈不利大腸不調陰陽相干心驚

忪悸或時旋運支節勞倦

牡丹皮一兩 桂一兩 陳皮半兩 玄胡半兩

川芎二兩 木香三分 白术三分麩炒 甘草半兩炙

芍藥二錢 三稜半兩炮 乾姜半兩炮 當歸一兩

訶子肉二錢 羌活半兩 枳殼一兩麩炒 半夏半兩先

右細末每服二錢水半盞煎至五七沸食前溫服

此藥婦人常服益血海退血風勞攻注消寒痰實

脾胃理血氣攻刺及氣虛惡潮熱等證至妙

仲景治陰汗

沒石子燒灰先以溫湯浴了以綿輕裹然後傳灰

囊上甚良

玉胞肚

川烏 細辛 良姜 乾姜 桂 天仙子

牡蠣粉 胡椒

右為細末醋調塗臍下綿衣覆之

綿福法去陰汗溫寒戢汗瘡

荊芥 地骨皮 小椒 廣零陵香

何首烏 牡蠣 細辛 蛇床子

吳茱萸各一兩 大艾葉

右細末每用一匙入葱白三寸許煎數沸得藥力

熱滌淋洗

七寶散治汗熱浸漬成瘡癢不已

黃耆 當歸 防風 荊芥穗 木通

地骨皮各三兩 枯礬

右麄末每服一兩水三大碗煎至六七沸去滓熱

淋洗患處拭乾避風少時

千金方丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之良

陰囊濕痒槐枝煎湯滌洗

乾荷葉散

治陰腫痛及陰瘡囊濕痒又陰下濕痒若熱則拖

子金華丸

蛇床子 乾荷葉 浮萍葉各等分

右粗末每服三大錢水一碗煎三五沸去查淋滌

避風寒

問曰翁奄沈名曰滑何謂也然沈為純陰翁為正陽

陰陽和合故令脈滑關尺自平陽脈微沈食飲自

可少陽脈微滑者緊之浮名也此爲陰實其人必
股內汗出陰下濕也若痒則有風宜以
白附子　白蒺藜　黄耆　獨活　防風
右等分若虚則補宜八味丸
烏金散 治夢泄精骨不生
丸筋覆再每服一字用淸酒半盞童子小便半小
盞葱白七八寸同煎至七分和滓空心溫服
玉粉散 治汗後出汗及濕生瘡陰痒癢痛
定粉　蛤粉各半兩　白石脂半兩　滑石八兩
白龍骨半兩　粟米粉　寒水石一兩　石膏半兩
右爲細末乾摻患處
神効丸
原蚕蛾取速連者不以多少去頭尾毛羽
右乾爲細末煉蜜丸桐子大每服七丸至十丸臨
卧菖蒲湯下
千金云臨其時當使玉莖至陰節間而止不爾則過
子宮矣予問其故師曰深則少陰之分肅殺之方
何以生化淺則厥陰之分融和之方故能生發所

以受胎之處在淺而不在深也
忌辰非月絳後皆不可用事惟經後一日男二日女
三日男此之外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰
晦日月蝕八節非常之變犯之皆不可交接所生男
女痴聾痞瘂四肢不完多窮下賤永戾異常若不
犯此即大聰明智慧富貴之子
五補例　局方五補丸
人参　牛膝　茯苓　地骨皮　熟地黄
右細末煉蜜丸桐子大空心酒下三十丸本方服
數服以七寶丸泄之　易老云凡十補必一瀉之
數瀉必一補之所以不失通塞之道補虛必泄滯
實必虛滯則通之使後藥必能成功若不泄有服
八味丸一二年不成効者但補後泄滯不必七寶
丸瀉之可以去滯者皆是也
海藏大五補丸 此當在二才丸下
天門冬　麥門冬　茯神　石菖蒲　人参
益智　枸杞　地骨皮　遠志　熟地黄等分
牡蠣地黄丸 [illegible]

上字當作下字

論曰火多水少亡精血損之源火少水多腸胃津液之本精過水衰者熱退而飲消衰熱盛者腸消而痛經云尺內兩傍以候脅尺外以候腎注云脅之上腎之分脅之內腹之分若脾胃得積濕寒其水路肝臟不足無血漬其腎熱也又曰伏穀氣以生精托臟實以逆熱者服此味養命延年

生地黃一兩　牡蠣一兩燒存性　天門冬一兩去心

人參一兩　當歸一兩酒浸　車前子二兩

括蔞一兩

右細末生姜自然汁糊丸梧子大　如足腫炒葶藶湯下　如脅下滿指姜湯下　如潮熱小便赤梔豉湯下　如腹痛芍藥甘草湯間服五十丸服空心　如飲食少無味人參湯下

瓊玉膏鐵瓮先生方

人參二十四兩去蘆為末　生地黃一十二斤取汁仔細搗石木臼內搗

白茯苓四十八兩去皮木臼內搗

右件人參茯苓為末用白沙蜜十斤生用濾過地黃取自然汁木石臼皆可取汁盡去查用藥一處拌勻入銀器內或好瓷器內封如器物小或兩處亦可用淨紙二三十重封閉入湯內以桑柴煮六日連夜火煮三日夜取舊湯內煮一日用蠟紙數重包紮瓶口懸井口以去火毒一伏時取之再入舊湯內煮一日以出水氣取出開封取三匙作三盞好溫酒化開服不飲者白湯化之此膏填精補髓髮白變黑返老還童行如飛羽日進數服終日不饑不食通心強志日誦萬言神識高邁夜無夢寐人年二十七歲已前服此一料壽三百六十歲四十五以上服者可壽二百歲六十三以上服者可壽一百二十四歲八十一歲已上服者可壽百歲戒不虛說若服之十劑絕嗜慾修陰功可地仙矣一料分五處可救五人癱疾分十處可救十人勞瘵合時須齋戒沐浴淨室焚香志勿輕易當謹慎修製無示非人惟此藥可以與二才丸為表裏

醫壘元戎卷第九

醫壘元戎卷第十

趙州教授進之王好古纂次

明監察御史東萊桂亭恭才仝校　兩淮運同四明翁本畯重刊

兩淮運副姚江嚴自世校正

此卷癰疽一條幷眼藥數方內有天門冬地黃之類故入少陰例

素問寒癰疽例

經云腎移寒於脾發爲癰腫少氣脾移寒於肝發爲癰腫拘攣又云寒痺此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云天地之邪氣感則害人皮肉筋脈聖濟云氣脈道厚表易著其所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸漸而成膿如泔而稀久不能差瘡口不合變爲疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以此骨碎補丸主之方[illegible]

骨碎補　補骨脂　熟地黃　川當歸　續斷

石南葉　黃耆　石斛　牛膝　杜仲

萆薢以上各一兩　附子炮一兩　白芍藥　川芎

兔絲子　沙參　羌活　防風　獨活

天麻子各一兩五錢

此方與大傳方相表裏前桂枝拾遺後有

木瓜　兔絲子　白朮

刑三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿山甲湯透之後以地黃當歸湯補之繼以骨碎補丸外治

骨碎補丸見局方

諸痺筋骨疼痛腳膝痺痛

骨碎補　虎骨　自然銅　天麻酒浸　當歸

沒藥另研　牛膝酒浸　川芎去皮臍各半兩　乳香

硃砂各二錢

右爲細末酒糊丸桐子大每服三五十丸食前溫酒下

虎骨散出局方爲末酒糊丸

千金翼乾地黃丸

治壯熱人常服之終身不發癰疽悅澤酬勞苦

生地黃　天門冬去心各四兩　巴戟天　栝蔞

肉蓯蓉　人參　桂心各六兩　大黃三兩　當歸

元陽
元陰

黄耆 黄芩 遠志 石斛 甘草各二兩炙

右為細末煉蜜丸桐子大酒服十丸加至二十丸或三十丸

明目例

按經云天明則日月不得明邪害空竅天所以藏德者為其欲隱大明故大明見則小明滅故大明之德不可不藏天若自明則日月之明隱矣所論者何言人之真氣亦不可泄露當清淨法道以保天真苟離於道則虛邪入空竅空去音孔竅若弔反陽氣者閉塞地氣者冒明陽謂天氣亦風熱也地氣謂濕亦雲霧也風熱之害人則九竅閉塞霧露之為病則掩翳精明取類者在天則日月不光在人則兩目隱耀也靈樞經曰天有日月人有眼目易曰喪明于易豈非失養正之道也雲霧不精則上應白露不下霧者雲之類露者雨之類陽盛則地不上應陰盛則天不下交故云露不化精微之氣上應於天而為白露不下之咎矣陰陽應象大論曰地氣上為雲天氣下為雨出地氣雲出天氣明二氣交合乃成雨露又盛衰論曰至陰虛天氣絕至陽盛地氣不足明氣不相召不能交合

六合丸

天門冬 麥門冬 生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮

七仙丸

兎絲子 車前子 巴戟 蓯蓉 熟地黄一 枸杞子 甘菊花

一名駐車丸菊花丸相合七味

益陰丹

熟地黄四兩 蓯蓉酒浸三兩 枸杞子二兩 巴戟[illegible]

右為末酒糊丸桐子大

永壽丹

天門冬 熟地黄 枸杞子 甘菊花

已上方皆煉蜜丸桐子大米飲湯下酒亦得

諸風例

風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與衛氣

相干其道不利故使肌肉憤䐜而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮衛熱胕其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰癘風或者曰寒熱病本癘風又云因而露風乃生寒熱亦癘風也

易老祛風丸

治疥癘經云風中血脉而成癘風癘風即癩也

黃耆　枳殼　防風　芍藥　甘草　生地黃
熟地黃　地骨皮　枸杞子

右九味等分為細末煉蜜丸桐子大空心白湯下五十丸此藥與摩風膏子外治相表裏

衛方祛風丸

生地黃　熟地黃　防風　甘草　枳殼
芍藥　枸杞子　地骨皮

右細末煉蜜丸桐子大每服三十五丸溫酒下

烏白散 治大風徧身生瘡癢不可忍者

白花蛇酒浸焙乾三兩　烏蛇同上　地龍三兩去土
白芷一兩　細辛去土　天麻各一兩　荊芥二兩

當歸一兩　蔓荊子二兩　苦參二兩　杜蒺藜
不灰木　菖蒲　天門冬去心　紅芍藥
定風草　川芎　胡麻子炒　何首烏
木鱉子去皮油　羌活　草烏頭
蒼朮二兩　威靈仙去土　甘菊花　沙苑蒺藜
木賊　甘草　沙參　紫參各二兩

治細末每用二三錢溫酒調服日二三服忌動風之物并房事

大僂方曰陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂

羌活　防風　細辛　附子　當歸　甘草
川芎　續斷　白芍　白朮　桂　麻黃
黃耆　熟地黃

此藥當與洛山骨碎補丸相表裏

仲景旋覆花條下注疰痹二證

龍蛇散

治風虛頑麻遍身白癜紫癜癮疹痒痛者

白花蛇去骨炒　烏稍蛇去骨炒　萆薢

天麻 骨碎補 金毛狗脊 自然銅（醋焠）
黃耆 楓香（另研） 地龍（去土） 草烏頭（鹽水浸各一兩）
乳香 沒藥（各三錢） 麝香（一錢）
右細末酒糊丸桐子大每服一十五丸酒下食後
為細末酒調亦得內有佐經丸亦可例草烏後

復肌丸

治肺氣赤白癜瘋痒耳鳴癱瘓口眼喎斜
白花蛇（酒浸去骨） 烏蛇（去骨） 天麻 牛膝（酒浸一兩）
白附子（炮） 白姜蚕（炒各一兩半） 白芷（一兩）

右為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二十丸
温酒下

追風散

治浮肺風攻注皮膚癮疹痛痒一切肺風
苦參 白蒺藜
右等分為細末酒調下食後

黃蘗例

大鳳髓丹

半夏（炒） 木猪苓 茯苓 紅蓮蕊
黃蘗（炒二兩） 縮砂仁（一兩） 甘草（半兩） 益智仁（各三錢半）
治心火狂陽大盛補腎水真陰虛損心有所欲速
於感動應之于腎疾於施泄固真元降心火益腎
水大有神効

正鳳髓丹

黃蘗（二兩） 縮砂仁（一兩） 甘草（半兩）
經云腎惡燥以辛潤之縮砂味辛以潤腎燥又云急
食苦以堅之黃蘗味苦以堅腎水又云以甘緩之
甘草味甘以緩腎急又云甘補之甘味以生元氣

古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑若以
黃蘗為心火則黃連當瀉何經（二藥等分並用水和一十二槌為丸如梧子大八十丸温）
（酒下三十丸日三服）

小鳳髓丹（與丹名各）

甘草（一兩） 黃蘗（二兩）

梔子金花丸 即活人解毒湯也
加蘆薈沉香為蘆薈丸青黛為衣 去大黃加防
風為五黃丸 加連翹為連翹金花丸蘆薈丸治
小兒疳熱發黃糊丸黍米豆大温水下二十丸無

解毒丸
治大小積熱咽喉目赤癰腫心忪不安中暑發熱渴
寒水石一兩六錢　青黛八錢　石膏一兩一錢已上各研細
右和勻蒸餅丸雞頭子大每服一二丸新水化下導赤湯亦得
拔毒丹 一名拔毒散
治肉色變赤四肢胞背游走焮熱腫痛
黃栢　甘草各一錢　石膏二錢　寒水石七錢
右細末水調掃
海藏云予觀此方極有理不惟外治內治亦效量兒大小以水調服方寸匕更與掃之內外俱治也凝水洩腎石膏洩三焦大熱黃蘗又治命門相火之本甘草以消毒緩急所以多效故入小鳳髓丹例
固元丹
治血枯大脫血崩中漏下不止房室過度氣竭肝傷五心煩熱盛勞保真益血脉尺中及三部而實脉洪有餘者主之
黃蘗四兩　生地黃三兩　縮砂仁二兩　益智仁一兩
甘草二兩生用
右為極細末滴好醇酒為丸桐子大每服三十丸空心淡鹽湯下漸加至八十丸以意消息治之加真續斷二兩治心火加黃連一兩治風加當歸川芎各一兩代蛤粉為衣
易老珍珠丸
黃蘗一斤　蛤粉二兩
右剉黃蘗新瓦上炒細末水丸鹽酒溫任下治陽盛陰虛精不禁之奇方也
秘真丸
紅蓮蕊一兩　益智子一兩　豬苓半兩　縮紗仁二兩
半夏半兩　黃栢一兩　茯苓一兩
右細末蒸餅丸桐子大每服五十丸空心米飲下
保真丸 脈右尺命門相火盛強甚方主之
黃蘗　黃連　黃芩　梔子　大黃　縮砂仁
甘草　生地黃　白茯苓　益智　人參

豆黃恐作

地骨皮　道子皮
右為細末生地黃汁糊丸桐子大
賀蘭先生解毒丸一名保命丹一名化毒丹
善治毒諸藥山嵐瘴氣魚果肉菰菜毒冬丹毒夏月暑毒傷寒餘毒小兒疹瘡斑毒熱毒喉痺惡毒凡有名之毒悉皆治之
黃蘗　管仲　茯苓　藍根　乾葛　地黃
雄豆　甘草　滑石　縮砂　陰地厥
薄荷各二兩　山豆根　士馬槊　豆粉
益智　大黃　寒水石生　紫河車　馬勃
龍膽　白姜蚕　百藥煎　山梔子各一兩
右為細末煉蜜丸每一兩作十丸細嚼新水下一丸津嚥亦得　小兒驚風薄荷湯下　或蜜水浸蒸餅為丸亦可夏月尤宜時服永無熱病冬服無傷寒　昝云賀蘭仙人也有日帝問曰朕聞卿能點化瓦礫為黃金然否公雍容對曰陛下貴為天子富有四海臣願以堯舜之道點化天下帝嘶
予嘗以此推之先生聖明君猶存此心術後之人當如何耶

清心丸
黃蘗生二兩　麥門冬　龍腦
一法加天門冬黃連　右細末煉蜜丸桐子大每服十丸麥門冬酒下薄荷湯亦得
錢氏瀉心湯瀉丁也　導赤散瀉丙也
火府丹瀉丙丁
黃芩一　黃連一　生地黃二　木通二
右細末蜜丸桐子大每服二三十丸溫水臨卧

經進十精丸
賜紫金魚袋監中岳重福宮臣覽諸方一千餘卷檢見此方其功大如臣服半材多病眼昏而復明氣衝而實四肢輕健百節舒暢萬病消除臣今進方於後政和二年月進
枸杞天之精　熟地黃地之精　乾山藥山之精　兎絲子金之精
桂木之精　栢子仁陰之精　甘菊花陽之精　肉蓯蓉水之精
茯苓土之精　漢椒火之精
右件十味各揀淨擇制依法造如法搗羅為細末就蒸

酒打糊爲丸梧子大每服二十丸茶酒鹽湯任下
空心日進二服男子元氣損耗精神虛弱面色痿
黄肢體瘦乏臍腹久冷五淋損傷夜夢遺精五勞
七傷上實下虛行步艱難小腸疝氣腎虛脚弱及
婦人子宮久冷血氣滯多損胎石結飲食無味四
肢沉困夜夢難分臍腹虛痛心疼頭痛此藥服之
立有神効

神仙六子丸

治男子血氣衰敗未及五十歲髮班白若服此藥
百日黑如漆

兎絲子　金鈴子　枸杞子　覆盆子
五味子　蛇床子　何首烏　舶茴各一兩
牛膝　地骨皮　木瓜各一兩　熟地黃三兩

右蜜爲丸每服五十丸空酒下要髮黑前件藥內
別加人參茯苓石菖蒲各一兩忌蘿蔔生韭薤菜
蒜

十補丸

治男子腎藏虛精氣寒滑婦人血海冷經脉不調
治久寒濕養脾胃手足溫和

玄胡索　胡蘆巴　破故紙　茴香　川芎
附子　桂　當歸　紫巴戟
肉蓯蓉

右等分酒糊爲丸每服三五十丸溫米飲下空心
食前酒鹽湯亦可

神虛五味子丸主治修製並見局方

治婦人五淋小便赤

古方鹿角霜丸乃驪珠太和之祖也並見湯液本草
白膠條下白膠阿膠皆鹿角膠也

太和膏

劉快活仙進方補其壯下元治本藏虛弱進食強
筋骨助脾胃補損傷久服延年益壽長生不老消
除百病

當歸酒浸 兩　川芎一兩　蓯蓉酒浸 四兩　舶茴六兩
川練子　破故紙　楮實子　遠志去心
白朮各三兩　葱白根十　韭子三兩　胡桃五十箇切作片
黄蠟一兩　白茯苓　枸杞子　胡蘆巴各三兩

木用鹿角三十斤東流河水三十擔銅灶鐵鍋二
隻兼鹿頂截角用赤石脂鹽泥於截動處塗閉之
勿令透氣於甑内煎一炊時用馬蔺刷就熱湯刷
去鹿角上血刺麤垢訖可長三四寸截斷鹿角外
將前件藥一十六味拌和勻停先鋪一層角於鍋
内角上鋪一層藥如此勻三層鋪之將河水添在
藥鍋内其水於角上常令高三寸無烟木炭熬令
常小沸勿令大沸外一鍋内專將河水煎湯亦勿
令大滾如藥鍋内水積下却與熱湯内取添上令

三寸却取河水添在熱湯内[illegible]倒添至二十四
時住火候冷時將鹿角撈出[illegible]白霜處取汁其藥
滓不用外將藥汁如煎法再煎更不用加水如膏
滴水不散凝結方成

驪珠丹

鹿角霜　白茯苓一斤　澤瀉四兩　白龍骨二兩水飛

右同為細末以醇酒一斤鎔開太和膏六兩入煉
蜜四兩更熬令勻搜和前藥成劑丸如桐子大每
服三十七丸空心温酒下漸至百丸其効不可具

述海藏云大抵益陽之藥本為命門相火衰陽事
不舉有誤子孫計故聖賢著書立意扶虚補不足
也後人耽嗜色慾喪身夭命惜哉

腎氣内消丸

山茱萸　食茱萸　馬蔺花　川楝子炒
陳皮　吳茱萸　茴香　木香各等分

右為細末醋糊丸桐子大每服二三十丸空心鹽
湯送下

又方

青皮　川烏　葫蘆巴　蓽撥　木香
茴香　紅皮　破故紙　苽仁各等分

右細末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯下

金鈴子丸治小腸氣[illegible]

金鈴子　茴香　當歸　葫蘆巴　蝎梢各等分

右為末酒調下一二錢

枳殼五倍丸治痔漏

枳殼炒　五倍子炒各等分

右蜜丸空心温酒下三五十丸一本枳殼五兩五

附子一兩蜜丸米飲下

碩夫枳殼茴香丸

枳殼二兩麩炒去穰另為末 茴香一兩另為末鹽炒

好酒半碗入茴香末熬成膏子次入枳殼末丸桐子大却用龍骨末一二兩磁鉢內培養服時去龍骨末每服三十丸酒鹽湯任下

又一法用

枳殼二兩 茴香一兩 龍骨半兩

酒糊為丸如用飲五味子數枚熬津

香殼丸

枳殼麩炒去皮 茴香炒黃各等分

右為細末酒糊丸桐子大空心酒下二三十丸亦得

局方桔梗枳殼湯見七十六卷痞滿門

易簡枳殼湯

服之縮胎易產姙婦臨月服之特有神效丈夫婦人寛中下氣治腸中諸痛尤得其宜

枳殼兩五 甘草兩一

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服或為細末更加香附子一兩尤妙 如丈夫婦人冷氣攻刺脇疼痛加葱白二寸火煨入煎藥服能飲者細嚼葱白熱酒調下服之 如胞膈氣閉飲食不進葱白湯調服 腎氣膀痛煨葱白二寸茴香一大撚同嚼熱酒服若久服之永不發動 腰背氣痛用葱白湯調服訖即臥少時旋能作効 脚氣發動空心熱湯調服 婦人因脾寒血閉成塊熱酒服之 産後血氣不和熱湯調服心腹氣痛口吐清水飲食不消胞膈膜脹葱白湯調服 冷物傷脾發痛無時胡椒煎湯調服大小便秘煎白牽牛湯調服 婦人血暈兩太陽痛頭旋欲倒者煎艾湯調服 婦人經脈不行手足發熱或身潮熱先用葱白湯次用薄荷湯調服若經脈不調脾胃稍壯者當用大聖散服之數有神效若經血不調血藏疼痛者當用小溫經湯以當歸附子二味等分白水煎服

小兒面黃閑令吐食煎木瓜湯調服

水氣

一者因而飽食筋脉横解腸澼爲痔二者因而大飲則氣逆肺氣舉故氣逆而上奔三者因而強力腎氣乃傷骨乃壞強力入房骨之體枯

金匱要畧水氣病脉證治（後代名醫論著諸說皆取此以爲主）

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黄汗。風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風。皮水其脉亦浮外證跗腫按之沒指不惡風其腹如鼓不可當發其汗。正水其脉沉遲外證自喘。石水其脉自沉外證腹滿不喘。黄汗其脉沉遲身體發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿也。脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虚此爲風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黄汗太陽病脉浮緊法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗出則愈此爲風水惡寒者此爲極虚發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫冷狀如周痺胸中渴不能食反聚痛暮躁不眠此爲黄汗。痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脹其狀如腫發汗則愈然諸病此者渴而不便小便數者皆不可發汗裏水者一身面目洪腫其脉沉小便不利故令病水。假如小便自利此亡津液故令渴也。趺陽脉當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之即胸滿短氣也。趺陽脉當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水。寸口脉浮而遲浮脉則熱遲脉則潛熱潛相搏名曰沉趺陽脉浮而數浮脉則熱數脉則止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脉虚伏則小便難虚難相搏水走皮膚即爲水矣。寸口脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走在腸間。少陰脉緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便則難。脉得諸沉當責有水身體腫重水病脉出者死。夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病水腹大小便不利其脉沉絕者有水可下之。問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利反汗出者自愈。心水者其身

重而少氣不得臥煩而燥其人陰腫　肝水者其腹大不能自轉側脅下腹痛時時津液微生小便續通　肺水者其身腫小便難時時鴨溏　脾水者其腹大四肢若重津液不生但要小氣小便難　腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦　師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰已上腫當發汗愈師曰寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏趺陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分　問病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師曰脉之不言水及言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脉何類師曰寸脉沉則為水緊則為寒沉緊相搏結在關元如時當盛年或不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動緊氣上衝咽喉塞噎脅下急痛醫以為留飲而大下之氣上衝緊不去而病不除後重吐之胃家虛損咽燥欲飲水小便不利

米穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下當時如小差食飲過度腫復如初胸脅攻痛象若奔豚其水揚溢則浮動喘逆當先攻擊衝氣令止治欬上其欬自差先治新病病當在後　風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之腹痛加芍藥　風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱者越婢湯主之

麻黃去節六兩　石膏　生薑二兩切　棗十五枚擘

甘草炙二兩

右㕮咀五味以水六升先煑取麻黃再沸去上沫內諸藥煑取三升去滓分溫三服惡風者加附子一枚炮古今錄驗云風水加朮四兩

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防已加茯苓湯主之

防已二兩　黃芪三兩　桂枝去皮三兩　茯苓去皮六兩

甘草炙二兩

右五味㕮咀以水六升煑取二升去滓分溫再服

裏水越婢加朮湯主之　方見脚[illegible]

又甘草麻黃湯亦主之方
甘草二兩 麻黃四兩去節
右二味吹咀以水五升先煮麻黃去上沫內甘草
煮取三升去滓溫服一升重覆汗出不汗復服慎
風寒
水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者
為氣水發其汗即已脈沉者宜附子麻黃湯浮者
宜杏子湯
附子麻黃湯
附子一枚炮去皮破切作八片 麻黃二兩去節 甘草二兩炙
右三味吹咀以水七升先煮麻黃再沸去上沫內
諸藥煮取二升半去滓溫服八合日三服
杏子湯 未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯
厥而皮水者蒲灰散主之 方見消渴中
師曰黃汗之為病身體腫 一作重 發熱汗出而渴狀
如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脈自沉問曰從何
得之師曰以汗出入水中浴汗從孔中入得之黃
汗黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之

寒氣寒字
疑作陽字

黃耆五兩 芍藥三兩 桂枝三兩去皮
右三味吹咀以水七升苦酒一升相和煮取三升
去滓溫服一升當心煩也至六七日乃解若心煩
不止者以苦酒阻故也一方用美清醯代苦酒
黃汗之為病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗
出又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反
發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡
若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤即胸中痛
有又從腰已上必汗出下無汗腰髖弛痛如有物
在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此
為黃汗桂枝加黃耆湯主之方
桂枝三兩去皮 生薑三兩切 芍藥三兩 甘草二兩炙 黃耆
右吹咀入棗一十二枚擘以水八升煮取三升去
滓溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫
覆取汗若不汗者更服之
師曰寸口脈遲而澀遲則為寒澀則為虛不足 陽
脈微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足
逆冷手足厥冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿胸

鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰
氣不通則骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁
陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失
氣虛則遺溺名曰氣分氣分心下堅大如盤如旋
杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主
之方
桂枝三兩去皮 生薑三兩切 大棗十二枚 甘草二兩炙
麻黃二兩去節 細辛二兩 附子一枚炮去皮破八片
右七味以水七升先煮麻黃去沫內諸藥煮

取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中愈
心下堅大如盤如旋杯水飲所作枳朮湯主之方
枳實七枚 白朮二兩
右二味以水五升煮取三升分溫三服
腹中耎即當散也
附方
夫風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病病者
但下重故知從腰以上為和腰以下當腫及陰難
以屈伸防己黃耆湯主之方 方見風濕中

首足一身
上下俱腫
亦宜汗之

經云諸水身半以下腫者當利小便身半以上腫者當發
汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之
天氣主之者其在皮也其在皮者故汗而發之
問肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作
何治答曰亦宜汗之也此身半以上同法身半以
上汗之者尺寸之天地也故汗之肌肉之外皮膚
之裏一身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉尺
治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中
州以下皆宜下之小便利而渴不宜汗不宜下以
其重亡津液故也問曰仲景云腎脉陰脉緊而沉緊

則為痛沉則為水小便則難脉得諸沉當附骨身
體腫重水病脉出者死王叔和云水氣浮大即延
生二者不同何也答曰少陰脉當沉故脉出者死
也此水附骨故當沉而下出則當微出本部即是
得生也此脉出字出本部之外故死也經云陰陽
俱虛脉出者死與此同意水氣浮大即延生者總
而言之也五臟六腑上下表裏及諸部分俱在其

中矣此陰盛而陽虛也故暴出者如何以然少陰
沉知周身無陽也水病滯塞不通脉出陽何以
周流於一身養育一體故然也　腹上腫者屬厥
陰腰腫者屬腎

海藏集仲景水氣例 水氣證治並出素問水熱穴論

高低內外輕重表裏隨經補瀉要當謹察肺胃腎
三經病作差也

仲景葶藶大棗瀉肺湯 治喘咳不得臥面目浮腫
甜葶藶　苦葶藶各等分　大棗

仲景枳朮湯治心下水結如盤

仲景牡蠣澤瀉散治腰已下有水氣

仲景生薑瀉心湯治脅下水氣腹中雷鳴

仲景甘草附子白朮桂枝湯治除濕自汗身微腫風
濕相搏小便不利

仲景真武湯治少陰三二日不已至四五日腹痛小
便不利四肢沉重疼痛則不利此爲水氣其人或
欬或小便利不利而嘔者

仲景十棗湯

大戟　芫花　甘遂各等分

三花神祐丸
十棗湯加　牽牛　大黃　輕粉　水丸

除濕丹
神祐丸加　乳香　沒藥

玄青丹
神祐丸加　黃連　黃栢　青黛
右已上四味藥極有毒不可輕也

趂痛丸
大戟　甘遂　白芥子　大麥麪各等分
右三味藥爲末拌和勻作餅大慢火炒黃熟再爲
細末用大麥麪一兩同上拌勻糊丸桐子大空心
冷酒下十丸至十五丸

明理趂痛丸
治脚氣上攻風毒走注疼痛神効又治水氣浮腫
白芥子炒　肥甘遂炒　大黃一兩作末各等
右件用白麪一兩半滴水丸作餅子煿令黃不可
過焦爲末醋糊丸桐子大冷酒下二十丸無時量

虛實加減

水氣下為跗腫上為喘呼不得卧者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧者分為相輸俱受者水氣之所留也

伏梁水氣日華子云在本草羌活條下

五皮散

生薑皮 陳皮 茯苓皮 桑白皮 大腹皮

一法加牽牛 各一 白朮 少

海藏老人法

調胃白朮澤瀉散

治痰病化為水氣傳為水鼓不能食

白朮 澤瀉 芍藥 陳皮 茯苓 生姜

木香 檳榔 各等分

一法加白朮木藥各半治臍腹上腫如神心下痞者加枳實下膨者加牽牛

紫菀散

木香 人參 白朮 鐵脚紫菀 川芎 各二兩

右為末生薑烏梅煎次日又一服

夫水氣者胃土不能制腎水逆而上行傳入于肺故令人腫治者惟知泄水而不知益胃故多下之強令水出不依天度流轉故胃愈虛食不滋味則發而不能治也莫若行其所無事則為上計不可不知

仲景十棗湯治太陽中風吐下嘔逆者可攻也若病懸飲者此湯亦主之

芫花 甘遂 大戟 等分

右大棗十枚水一升半煮取八合去查內諸藥強人一錢七弱者只半錢七溫服之不下明日再服下後以粥補之

胡洽方治支飲澼飲於十棗湯中加大黃甘草五兩同煎服之故以相反之劑欲其上下俱去也

李仁破澼氣能下四肢水 大抵去水藥多泄熱郁當求脉之虛實下之 叔和云水氣浮大即延生沉小命殂須努力

水氣求責法 有沉而有力 有沉而無力 有浮而有力 有浮而無力

中得之亦有有力無力

水氣脉并藥

肺沉大腸浮

大腹皮　茯苓　甘遂　大戟　芫花

旋覆　紫苑　陳皮　桑皮　杏仁

木香　葶藶　麻黄　梔子　芍藥

生姜皮　白朮

心沉小腸浮

桂　枳實　牽牛　芍藥　木通

脾沉胃浮

白朮　芍藥　生薑　赤小豆　棗　檳榔

黄耆　甘草　石膏

肝沉膽浮

川芎　芍藥　細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉　茯苓　猪苓　白朮　木通　燈艸

通草　牡蠣　滑石　澤蘭　附子　葶藶

瞿麥　車前　防巳

化水丹[illegible]

烏頭大者四箇炮　牡蠣燒一兩　蛤粉六兩

右細末醋糊丸桐子大冷水下三五十丸飲水一擔者一服愈

易老云益火之源以消陰翳則便溺有節烏附之類是也壯水之主以制陽光則渴飲不思蛤蠣之類是也

取瘡跟中痛例

子和泄水丸改名大智丸泄水散改名大智散藏用丸加減例

局方神功散治十種水氣小便赤澁大便自利

葶藶炒香另研一兩　牽牛炒末弍兩五錢　澤瀉三兩

猪苓去黑皮二兩　椒目一兩五錢

右細末每服三錢七葱白漿水入酒調下次以葱白湯投之忌麺鹽等物大小便利後大宜將息斷鹽房室三年　男子腑瘡或痛在莖之竅或在竅之標皆手足太陽不利熱毒下傳入手足厥陰致爲紫黑色作蝕瘡壞其莖而死以子和泄水丸散

藥其濕毒無不愈者如已成瘡先泄其根蒂次從
標而外治以葱白黑豆汁渫洗拭乾以黄連木香
密佗僧乾胭脂之類細末塗之如内潰濃不出以
追膿散上之後瘡如膿少可用黄連木香胭脂等
貼之
泄水丸散亦能治足跟中痛腎主濕濕主痛故大泄
之而愈以去其濕也 丙傳壬壬傳一一與庚合
故以水泄丸泄之則愈
涌水風水石水之源
陰陽結邪少陰少陽名曰石水小腹腫二陽獨至者
是三陽并至由此則但有陽而無陰也石水者謂
冬月水水如石之時故曰石水也火墓於盛冬陽
氣微微石水而死也 腎肝並沉爲石水並浮爲風水
帝曰有病腎氣者面跗痝然壅害言可刺否岐伯曰虚
不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至
何如岐伯曰至必少氣時熱時從胸背上至頭汗
出手熱口乾苦渴小便黄目下腫腹中鳴身重難
以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬

病名曰風水論在刺法中帝曰願聞其說岐伯曰
邪之所湊其氣必虚陰虚者必湊之故少氣時熱
而汗出也小便黄者小腹有火也不能正偃者胃
中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微
腫見於目下也帝曰何以知之岐伯曰水者陰也
目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使
目下腫也眞氣上逆故口苦舌乾臥不得正偃正
偃則欬出清水也諸水病者故不得臥臥則驚驚
則欬甚也腹中鳴者病本於胃也薄胃則煩不能
食食不下者胃脘隔也身重難以行者胃脉在足
也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞
中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也帝
曰善帝曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者牝藏也
地氣者屬腎而生水液也而陰勇而勞苦則腎汗
出腎汗出逢於風内不得入於臟府外不得越於
皮膚客於元府行於皮裏傳於跗腫本之於腎名
曰風水帝曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對
曰腎者至陰也盛水也肺者太陰也少陰冬脉也

治水須從脚起通隨利小便

故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故爲胕腫者腫胃水而生病也陰陽別論云三陽結之爲水（注云胕之寒）無脈絹脾腫實精化爲水此但二陰而少腎一陰也湯液醪醴論云三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體痞腫潔淨府治水之法也　平人氣象云頸脈動喘疾咳曰水目窠微腫如臥蠶起之狀曰水足脛腫曰水此上下之別也　帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯曰水之起也目窠上微壅如新蚕臥起狀狀其頸脈動時欬陰股間足寒脛瘇腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也　諸水大抵胃土不能制腎水　凡治水者人惟知治水而不知補胃如補胃多失之壅滯當用何法本草云赤小豆治水腫通氣補脾胃

神方

烏雞子一箇去頂取清黃汁調膩粉一大錢令勻內殼中以蒸餅劑裹之蒸熟去殼取熟黃一葶藶等分炒爲末與上併黃蒸餅等和丸如豆大每服三五十丸車前子湯下小便澁不通煎瞿麥湯下

又方治單腹脹水氣

右隔紙炒苦葶藶二錢細末無根水下

百一方卒大腹水腫

青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚覆取汗

食治十種水氣不差垂死

以青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥食之

又法治水氣脹滿小便澁

白鴨子一隻去毛腸洗饋飯半升與椒姜同釀鴨腹中縫定如法蒸熟食之

又法治十種水氣垂死

鯉魚一頭重一斤者和冬瓜葱白羹食之

治鼓氣方

滑石一錢　槐花一錢半　輕粉一錢

右不犯鐵器爲細末服生地黃自然汁生姜自然

汁得潤在藥中爲丸桐子大一日服三丸次日服
四丸五日以來早辰只一服用生地黃汁温送下
小便中水盡爲度得驗後日服嘉禾散十日永不
再發

胞轉小便不通非小腸膀胱厥陰之氣也盖因強力
房事或過小便以致此疾非可利之藥所能利之
也法當治氣宜以
沉香湯主之方
沉香 木香各二錢
右爲細末煎陳皮茯苓湯調服空心食前服

錢氏蝎氣丸
胡椒一兩 蝎梢半兩
右爲細末麪糊丸粟米大每服五七丸至一二十
丸陳米湯下無時

木香蝎氣丸 治腹脹
丁香 胡椒各二錢 蝎尾半兩 枳實一兩
郁李仁四錢 白牽牛一兩 木香半兩
檳榔半兩
右爲細末飯丸菉豆大每服十丸至十五丸陳皮
生薑湯任下

木香散 治腹脹
木香 青皮 白朮 薑黄 草豆蔻以上各半兩
阿魏一兩 蓽澄茄一兩
右細末醋糊丸菉豆大每服二十丸生姜湯下

又方治鼓氣
大蝦蟆一箇新瓦二箇相合麻繩纏定盛在内塩
泥固劑厚令慢火燒之成灰存性温酒調服三五
錢

折傷門
乾坂劉家接骨丹良方
虎骨半兩 當歸一兩 生硫黄半兩 附子炮一
川烏炮一兩 澤烏炮一兩 白附子 官桂
陳皮 青皮 金毛狗脊去毛 骨碎補去毛一兩
川楝一兩 縮砂一兩 赤芍藥四兩 自然銅四兩火煅醋淬七次
木鱉子一兩去皮 乳香半兩 没藥半兩 半兩錢醋淬一
羊脛骨一兩炙 狗脛脊骨一兩炙 蓯蓉一兩酒浸

牛膝（酒浸一兩） 川芎（兩）

右二十五味爲細末爲二七分細者每服一錢酒調溫服三分小黃米粥爲丸桐子大溫酒下二三十丸隨病上下食前後間服之

接骨丹

治從高墜下馬踏車碾筋斷骨碎痛不可忍接骨續筋止痛活血

硼砂（一錢半） 定粉（一錢） 當歸（一錢）

右爲末煎蘇木湯調下二錢服訖時時服蘇木湯

投之

接骨丹（治打撲損傷骨節痛不可忍之）

乳香（另研） 當歸（酒浸一兩） 威靈仙（酒浸一兩）

骨碎補（去毛酒浸） 兎絲子（酒浸一兩） 龜死（酒浸入）

龍骨（酒浸） 虎骨（酒浸酥炙以上各半兩）

右爲細末蠟丸彈子大十歲以下服半丸二十歲以上服一丸好酒三盞煎用柳篦子攪勻和查只一服不得再服恐遇節必至蘆節後用貼藥

貼藥

黃松柏（兩） 乳香（兩半） 沒藥（三錢半）

右細末用麵油調勻攤在緋帛上貼傷處用綿竹篦夾定封須要子細對得骨正更用紙封

神仙正骨藥異金散

半兩錢（一箇） 白文足炭 水蛭（炒黃半兩）

自然銅（醋淬半兩） 乳香（半兩）

沒藥（一兩） 麝香（一錢）

右細末四十以上服半錢四十以下服一字二三服即効如蘆節用生薑自然汁溫酒一盞調服

如腰已上損折食後腰已下食前若骨不損者藥自吐出無忌　繆刺云人有所墮惡血留止腹中脹滿不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡刺足踝之下然骨之前血脈出血刺足跗上動脈衝陽骨之原刺入同身寸之三分留五可灸三壯不及刺三毛上各一痏見血立已左刺右右刺左謂大敦穴厥陰之井也其後議論當在此條下

初虞世治從高墜下及打撲內傷神効

麝香 水蛭（各兩）

右剉炒令烟出研為末酒調一錢當下畜血未从
再服其効如神

𡚶師方打撲傷損瘀血在内不散

蒲黄

右末酒調服　産後惡血不下蒲黄水煎服日月未足欲産蒲黄水調服

又一方法

大黄一兩　當歸二錢半　麝香一字　生乾地黄二錢

右剉水煎或醋童子小便亦得

聖惠方

延胡索一兩

右為末豆淋酒下二錢七不計時

導滯散

治重物壓傷或從高墜下發熱口内吐血下血出不止或瘀血在内脑腹脹滿粗氣短

當歸三錢炒　大黄三錢剉炒

右細末豆淋酒調下二錢七不計時候

又方治從高墜下打撲損傷或損骨不損骨亦有瘀血者

當歸一兩　生地黄一兩　川大黄一兩

穿山甲半兩炮另研

右粗末秤三錢好酒煎服水煎入酒亦得煎成調穿山甲末一錢

又方

乳香二錢　没藥三錢　當歸三錢　自然銅半兩醋淬

木香一錢　青皮二錢半　白芍藥二錢半　穿山甲一錢炮

右為細末酒調服

又方

[illegible]子一分　黄米一分　烏梅[illegible]

右為末蜜丸彈子大嚼一丸温酒化開亦得隨上

[illegible]膏

川烏　草烏　南星　半夏　當歸　芍藥

木鱉　官桂　白芷已上各等分

右細末黄蠟鎔開小油和勻前藥末熬成膏子灸軟捏作餅子攤紙上貼損如前依常法固濟如法

三日一易神效
治腳骨破及骨折葱白爛研和蜜厚封損處立效
一方葱白煎米粉同炒為末醋調糊承煖封傷損處
接骨丹
沒藥　乳香　當歸　川椒　自然銅（醋淬）
紅芍藥　骨碎補　敗龜板（炙）　虎骨
白芷（已上各半分）　千金藤（作郁李仁是也各一分）
右細末化蠟半兩丸如彈子大每服一丸好酒半
升化開煎用東南柳枝攪散熱服
又方加　龍骨　川芎
此二味不加亦不妨若服藥人凶後骨折處如金
色團之此方係黃大夫秘傳神驗
貞觀七年七月十三日唐相王珪進尉遲恭經驗傳
到針入肉不出者用之神效丁酉十一月五日第
二來人備細傳寫出簡要方五月初四日尋下天
仙子窠木麼微動其根用水灌之回來至端午日
早起不語前去看根掘一聲曰先在此一木麼麼
出背上至家勿令婦人視之放乾用石杵臼之成

劑丸如彈子大緋絹袋盛之掛梁間勿令婦人見
如用時置劑中以裹肚繫之一伏時自出如至其
皮不能出者撥開皮肉自出也箭出後不復瘡愈
若登高墜下重物撞打箭鏃刀傷心腹胸中停積
瘀血不散以上中下三焦分之別其部分以易老
犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當丸之類下之亦有以
小便酒同煎治之者更有內加生地黃當歸煎者
有大黃者又法虛人不禁下之者以四物湯加穿
山甲煎服妙亦有用花蕊石散以童子小便煎或
酒調服之者此藥與前寒藥正分陰陽可不辨也
若瘀血已去復元通氣散加當歸煎服亦可又一
法筋骨損傷用佐經丸之類或用草烏棗肉為丸
服之以諸行經者以其內熱瘀血無故用之藥性
寒熱溫涼不一惟智者擇之不可偏執也（[illegible]）

瘡瘍疥癬例
神仙太乙膏
治癰疾八法癰疽一切惡瘡軟癤不問年月遠近

已成膿未成膿貼之即効蛇蝎虎犬傷湯火刀斧所傷並可内服外貼發背先以温水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼用水下　血氣木通湯下　赤白帶下當歸酒下　咳嗽喉閉纏喉風綿裹含化　一切赤眼貼太陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼藥仍用橘皮湯下　腰膝痛貼吃塩湯下　唾血桑白皮湯下　諸漏先以塩湯洗其瘡並量大小以紙攤藥貼之　已上藥每服一丸旋丸櫻桃大蛤粉爲衣其藥可收十年不愈久愈烈神効不可言

玄參　大黃　白芷　當歸　肉桂

右用麻子油二斤浸春五夏三秋七冬十日濾去查油煎得所次下黃丹一斤滴水中不散爲度

金寶膏

治楊梅癰疽腫毒發腦發背發頤發鬢或瘰癧結核或膿血已出如此等證并寒濕氣刺冷痹頑麻牙癰外腫打撲閃挫金瘡杖瘡小兒頭面聚熱雜瘡蜈蚣蛇蝎傷螫狗咬馬嚙或蜘蛛咬遍身成瘡腹脹大而不可治者先飲生羊乳一杯後貼此藥大効及諸蟲傷毒湯火漆瘡丁注臁瘡深口内上白朮細末乾後貼此藥一切大小瘡癤藥到毒消痛止排膿生肌滋潤瘡口愈後常貼之落後忌再貼之三五次後可以滅絶瘢痕　婦人乳癰丸如桐子大新水下二十丸難産敗血復痛每服一二十丸温水下凡貼瘡先以煎湯洗去膿垢次以軟帛拭乾後用此藥貼之

小油八兩　黃丹　新柳枝　沒藥

乳香　白芨　白蘞　白芷　桂

木鱉子　當歸　杏仁

右除乳香沒藥黃丹外餘藥浸七日炭火上用鐵鍋熬令藥變色黃濾去不用澄清入黃丹用柳枝五寸長如錢粗攪令黃色變褐撥鍋在地又令柳枝攪令烟出盡然後入乳香沒藥在内柳枝攪勻候冷傾磁合内候藥硬切作塊乾以油紙包裹此藥春三月秋八月合餘月不可

白龍膏 治一切惡瘡

沉香一錢半 白檀一錢半 木香一錢半 瓦粉十四兩

白茯苓一錢半 白附子二錢 白芨二錢 白歛一兩半

白芷一錢半 桔梗一錢 防風一錢半 芍藥二錢半

當歸半兩 白薇一錢半 白朮一錢半 黃耆二錢半

川芎一錢半 甘草一錢 生地黃一錢 瓜蔞根一錢半

杏仁去皮尖二錢 桑白皮二錢 蕤仁一錢半去皮 木通一錢半

木鼈去皮二錢半 人參二錢 獨活一錢 升麻一錢半

苦參一錢 槐白皮一錢半 零陵香一錢半 清油一斤

右剉碎油浸七日夜內銀器內慢火煎候白芷黃色濾去滓入油於磁器碗中慢火煨動次下黃蠟一斤四兩攪勻次下瓦粉再攪勻慢火熬成膏用貼旋攤白絹上用

[illegible]膏 治一切[illegible]膿腫[illegible]御院方

黃耆半兩 當歸 芍藥 白芷 杏仁

蕤仁 白附 白歛 零陵香 川芎

天麻子 防風 獨活 木通 龍腦

清油一斤 黃蠟夏十二兩冬九兩半 瓜蔞穰一兩半

仲景治婦人陰瘡蝕爛方

狼牙三兩㕮咀水煎去柤入醋一小鍾以綿濾湯瀝患處四五次愈

又方以雄黃末傅之

御藥大紅膏

珠子青一斤 白膠香二兩

右二味銀銅鍋內鎔開慢火不可火緊綿濾過後與藥同熬

當歸二兩 木鼈子二錢 小油二兩

此三味同熬稍變色濾去柤下前二味內攪勻下

乳香一錢 沒藥一錢

同研細再下前四味都用綿濾過鍋內熬成不住手攪勻攤紙上貼之

追膿錠子

雄黃二錢 巴豆一錢半 輕粉一錢半

右為細末油和作餅子生麵亦得

替鍼膏

雄黃一錢 巴豆一錢 蛇皮一錢 信霜一錢

右用石臼研為膏

治大小癰癤無頭方

皂角刺鍼不拘多少右燒存性研爲末酒調服即可見烙處薄頭也此藥內亦可加穿山甲炮焦爲末酒調服之

治下疳先用張子和泄水丸泄去其根本後用此藥乾上

黃連半兩 滑石半兩 定粉二錢 蜜佗僧一錢

乳香一錢 輕粉少許

右細末乾摻或加乾胭脂或加木香檳榔

頑惡瘡方

銅綠 硇砂 石膽礬半錢

生肌藥

龍骨 虎骨 烏魚骨 白石脂 乳香

惡瘡入腹心逆藥食不下

豆粉三錢 乾胭脂二分 定粉三錢

右細末新水調下神効

生肌肉

乳香一錢 白芨一錢 龍骨一錢 凝水石燒三錢

滑石一錢 沒藥一錢

右細末洗淨瘡上藥貼

銀絲膏

乳香一兩 水銀一兩 硃砂一錢 膩粉半錢

麝香半錢 瀝青五兩 小油二兩

右各研爲細末定磁器內油熬沸下乳香末次下水銀次下朱砂次下瀝青次下輕粉次下麝香熬成膏勺傾水中洗令白色沒十日磁器內盛之緋帛攤貼

五枝膏

槐枝 榆枝 柳枝 桃枝 桑枝各二十

陳皮 蒼朮 杏仁 巴豆

沒藥 當歸 木鱉 枳殼

赤芍藥 人參

右㕮咀好酒一升慢火煎令焦色濾去查下瀝青半錢黃蠟五分黃丹四兩炒黑入前藥同熬成爽膏入乳香二錢半輕粉一錢麝香半錢攪令勻帛攤貼之

治惡瘡或有小蟲

膽礬一錢 龍骨二錢 輕粉一錢 虎骨二錢

白礬二錢半 麝香半錢 乳香一錢 硇砂二錢

腦子一錢 上蜂窩二錢 露蜂窩二錢半 雄黃二錢

右為細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神効

外臺治惡寒毒似欲發背或已生瘡腫癮疹起方

消石三兩

右暖水一升和消令冷取冷故青布摺三重於赤

處方圓濕布搨之熱即頻易立差

治疥瘤疥 此方易取所貴摩風膏相似

柏苓 白膠 當歸 防風 杏仁 草麻

黃蠟 小油 鉛丹 若有槐枝與摩風膏相似此方要數

拈痛神應膏

乳香二錢研 沒藥一錢研 油半斤 鉛丹四兩

當歸 杏仁 木鱉各三錢 槐枝

柳枝各半兩

右熬成膏滴水不散放稍冷入乳沒末

金絲膏

珠子青半兩 楓油二兩 小油一兩

右熬成膏

肉紅散

凝水石燒 黃丹

右同研細末

追膿去死肉生肌

白丁香 蔄茹 雄黃少許

消腫痛

大黃 黃蘗

右細末溫水調掃涼水亦得

又方

龍骨 寒水石燒

右為細末先傅徧微用銅綠末再傅肉自下而不

成膿

丁瘡腫

白姜蚕

右為細末津調塗根自出

治瘡努肉如蛇出數寸俗呼翻花瘡是也硫黃研細

薄傅之便縮
丁瘡垂死菊花葉一握搗汁一升下口卽活如神冬
無葉用根
足跟瘡久不愈毒氣攻注
白朮 不以多少 爲細末
右將鹽礬水溫洗乾貼二日一換可以負重涉險
鍾惡瘡
銅綠二錢 硇砂一字 石膽礬一錢
右細末少上齊貼一法摘瘡加金頭蜈蚣一條非
久敗惡勿輕用之
檳榔散
治瘡疽瘡瘑潰之後外觸風寒腫焮結硬膿水
清稀出而不絕肉奔空虛惡汁臭敗瘡邊乾及好
肌不生瘵瘑瘻惡遲滯不差下疰臁瘡浸清不歛
黃連 木香 檳榔
右各等分爲細末貼藥
金瘡痛甚者
凝水石

右生爲末小油調傅此人唇口肉內有傷者粉乾上
之其痛立止一法內藥有金頭蜈蚣
治發疽發背巳成瘡
寒水石入輕粉上出膿
治腦疽發背不可忍者
凝水石燒粉研細上之
治破傷血不止
大竈底踠黑灰四兩 麝香一錢
右碾勻先令病人驚而使之氣促乃以此藥上摻
捻之當止不發以至乾愈
治大小諸瘡不問者兼至內外臁瘡久不愈先以礬
水溫洗拭乾上瘡乾小油調塗
羌活 獨活 白礬 右各等分爲細末
治便癰外貼方
大黃 牡蠣 梔子 白芥子 小黃米麵
豬牙皂角
右等分細末小油調攤緋絹上貼之
治熱油澇火燒瘡疼不可忍
凝水石

石膏搗末細研粉貼瘡
治一切傷見血
寒水石細末貼瘡即愈不疼
外臺秘要治丁瘡
磁石搗爲粉好醋酢和封其根立出差
小兒丹毒
黄芩細末水調服大人小兒毒亦然
婦人飲酒食魚兎發風等物臍下二陰俱生瘡男子
同治並見馬齒莧青黛條下服藥入正散等燒灰
上瘡法亦在此中
治背瘡肉長疾皮不及裹成膿
寒水石火煅細
石微傳上再用銅緑細末微上之肉即當下皮乃
及長而不作腫
蚰蜒咬徧身成瘡
青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯引一條捉兩頭不
令透氣搓動化水點咬處差
聖惠方治馬咬毒入心

馬齒莧煎湯食之
又方治翻花瘡
馬齒莧燒灰臘猪脂調脮清泔洗瘡拭乾傅之
日三壯者玄明瀉之
王繼昌方治蝎螫毒不可忍
米粉略 葱白三根細切
右二味同炒焦研爲細末以津唾調傅毒腫痛之
處
外臺秘要治五十年毒不愈塗熊膽取差神効諸方
不及此
千金方治百蟲入耳
杵韮汁灌入耳中立差亦治漆瘡
又方
雄雞冠血滴耳中立出即差
治蚰蜒入耳
酪灌耳中若入腹飲酪一升化爲黄水馬糞汁
酪灌即差乾酪滕濕酪
治蝎蜘蛛蛇毒

雞卵輕敲小孔合咬處即差

又蜈蚣蜘蛛毒

雞冠血傅之

治蛇咬

男子陰毛口含二十莖嚥其津毒不入腹

治下疳久不愈

橡斗子二箇合成黄丹令滿相和以亂髮厚纏定燒烟盡爲度同研爲細末先以葱白熱漿水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

劉禹錫治牡痔酒痔腸痔血痔氣痔食痔羊妳痔五痔服此以

小蛻一枚 大者温用掘地坑燒之有板穴蓋坑坐孔上燻盡爲愈大効

醫壘元戎卷第十

冷厥
熱厥

醫壘元戎卷第十一

趙州教授進之王[illegible]

明監察御史東萊桂亭恭才命梓 兩淮運同西明啓本

兩淮運副姚江嚴[illegible]

厥陰證 先足經從湯液 後手經從雜例

王朝奉厥陰例 此[illegible] 未厥者手足厥逆也亦有陰厥有陽厥設使藥則死可不審乎 脉滑而厥者表有寒裏有熱白虎湯 常器之應云下者宜用柴胡加芒硝湯此陽厥也

張翼云冷厥者四肢逆冷脉沉微而不數足多攣卧惡寒或引衣自覆也其伏熱在内而厥者脉雖沉伏按之至骨而來數也其人或引飲或揚手擲足煩燥不得眠或發狂或大小便不利所見皆熱證也宜隨證下之 假令大便難讝語發狂宜承氣湯下之小便不利發黄宜茵陳蒿湯下之若忽人便下黑物是兼有瘀血以桃仁承氣湯下若發斑宜白虎湯紫雪之類若兩脉俱不見者亦非以外證辨冷熱也後須參以脉爲之 常器之云

凡厥當求得病之因若初得病便四肢逆冷脈沉細而不數或身上粟起下利清穀或清便自調大小便如常者爲寒厥也若初得病便身熱頭痛外別有陽證至二三日乃至四五日方發厥者須至三四日後也更以餘證參之　孫兆云陽病深熱而厥畢竟脈緊外證須狂語揚衣被也陰厥按之脈沉遲而形靜也若證不明未辨陰陽者且與四順丸試之是陽厥便見熱證若陰厥便見寒證可漸進理中四逆也　四順丸即理中丸加甘草一倍是也　前條議云寒厥則證多靜而了了脈雖伏若重按之遲而弱也熱厥外證多昏塞脈雖伏若重按之滑數而有力也

仲景吳茱萸湯　當歸四逆湯　當歸四逆加吳茱萸湯　已上三藥並見陰證論

活人論厥陰藥　並見陰證論

正陽散（有皂莢）　霹靂散　火焰散（有臘茶）

肉桂散（有柴胡吳茱萸）　四陽丹（有茱萸蝎稍）

已上四藥皆有厥陰之劑隨經所宜則可

厥陰身青黑見厥一條（可見陰證論）

古方治頭痛欲裂者

右用當歸一兩酒一升煮取六合如心痛細末調服方寸七　小便出血細末酒煮服　治頭痛不言末只言二兩酒煮意在取清也治心痛言末酒調意在取濁也乃清則行而上濁則沉而下小便出血酒煎細末比之心疼又熱欲入下極之分故治頭治心治小便自有高低之別古人已分治之不得不辨耳

四物蒼朮各半湯（與活血丹相表裏治四肢疼痛不能舉動）

仲景治嘔而胸滿者茱萸湯主之

吳茱萸（一升）　棗（十二枚）　生薑（一兩）　人參（一兩）

右水五升煎取三升每服一合日三　如乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之　又南行竹枝主大小便卒關格不通取之度如手第二指中節合之在下出

活血丹（與四物蒼朮各半湯相表裏治遍身骨節疼痛自效）

熟地黃（三兩）　當歸　白朮　白芍藥　續斷

人參（各一兩）

右細末酒糊丸桐子大

益血丹（治[illegible]人便秘[illegible]人虛亾血）

當歸 酒浸 熟地黃 各等分

右細末煉蜜爲丸彈子大細嚼酒下

四物湯例

四物湯 主治並見局方

熟地黃 當歸 芍藥 川芎

右依古法多不效易老四時通氣加減例與諸六介等湯十餘條並見二十五論婦人有身傷寒斎血不宜用墮胎藥下之宜四物加酒浸大黃湯及生地黃下之子母兩全經云有故無殞也四物與紫蘇飲相合名補心湯治虛熱四物與調胃承氣各半爲玉燭散四物與理中湯各半流濕潤燥四物與縮砂四君子湯各半名八珍湯保胎氣令人孚

四物膠艾湯治胎漏血崩不止

四物湯加阿膠甘草艾

右通七味治諸漏不止小産胎傷産後餘血仍作堅硬子宮不閉淋血不止數月不定宜斷血湯牡丹皮散主之

活人四物加減例

姙婦下血者加膠艾 熱與血相搏口舌乾渴飲水加栝蔞麥門冬 腹中刺痛惡血不下加當歸芍藥 血崩者加地黃蒲黃黃芩 頭昏項強者加柴胡黃芩 因熱生風者加川芎柴胡防風 臟秘澁者加大黃杏仁 滑泄者加官桂附子 嘔者加白朮人參生薑 大渴者加知母石膏 發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥柴胡 水停心下微吐逆者加豬苓茯苓防己 虛寒似傷寒者加人參柴胡防己

潔古老人加減法數條並見二十五論雲岐子加減法并治傷寒例並見金匱玉函經

四君子湯合四物湯爲八珍湯

治女子不孕慶閉遺溺嗌乾女子因服熱藥嗌乾者亦亾血損氣之所致也宜八珍湯

人參 縮砂 白茯苓 甘草

麄末水煎服清

芎歸湯 易簡十全大補湯與校正同並見局方

治產後去血多崩中不止去血多金瘡破傷去血多牙齒去血一切傷心懸眩暈目暗耳聾舉頭欲倒

當歸 川芎各三兩

右水四升煮取二升去查分作二盞血定後次第湯藥治之

保安湯

縮砂 甘草 與四物湯各半是也

四君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草

右四君子湯當在太陰證後條下 四君子湯加半夏附子桂為大半夏湯 四物加桂湯與海藏黃耆湯各半同十全散加桂附子芍藥為附子湯 百合四君子湯治老弱虛人不能眠 易老八物湯並見證二十五條黃芩芍藥湯治血不止 四物膠艾湯藥內有甘草 易簡芎歸湯 產婦

諸證各隨六經以四物湯與仲景藥各半服之其效如神四物湯與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯 此易老用藥大略

當歸地黃丸 安胎補虛

當歸酒浸 地黃酒煮

蜜丸桐子大酒下食前

四物二連湯

治男子婦人五心煩熱或因傷酒或因產亡血或勞虛發熱之並治之

四物湯加黃連 胡黃連各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至八分溫飲清或為細末蜜丸桐子大每服二十丸臨卧溫水下地黃須用生者

四神散 治婦人血氣心腹痛不可忍者

當歸 芍藥 川芎各一兩 乾薑炮半兩

右細末熱酒調服三錢

二補丹 治婦人男子[illegible]

蒼朮　熟地黃等分

右細末蜜丸桐子大空心酒下

地黃膏子煎

十月採地黃二十五斤取自然汁以木炭火一十八斤熬成膏點服與蒼朮煎合點服尤佳

眞降心丹方見潮熱

湯前增損四物湯

治婦人血氣不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱並宜治之

當歸　川芎　芍藥　人參　乾薑

甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當服五積散醋煎及大聖散之類若所下過多猶有刺痛亦宜服上二藥　一方治經血凝滯腹中血氣作疼用四物湯加白朮官桂等分名六合湯　一方治下血不止及姙婦胎動加熟艾乾薑甘草阿膠黃芪等分名膠艾湯　一方治血痢加膠艾　治產後血燥口乾煩渴加括蔞麥門冬　煩熱小便澁大便秘加大黃桃仁兩倍　腹脹加厚朴枳實　虛煩不得眠加竹葉人參　大渴煩燥加知母石膏　一方治婦人血虛心腹疞痛不可忍者去地黃加乾薑名曰四神湯　大率產後不問下血多少須日進黑神散三服下血少者以大聖散間之至二臘以後服內補佳　敗血爲後患不淺黑神大聖非逐血藥但能推陳致新多服不妨今人往往純其逐血性寒則

不有其用藥可見矣若惡血去多徐徐補之亦不爲晚不可姑息以貽後患且如古方用四順理中丸爲產後進食之劑旣用蜜丸又倍甘草甘甜特甚豈能快脾不若只用理中湯少損甘草素有痰飲者二陳湯之類服之爲佳且如姙婦惡阻古方有茯苓丸內有地黃竹茹川芎藿能定嘔服之則愈見增嘔大抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯改名小茯苓湯用之極效不可不知也

易簡芎歸湯

治一切去血過多眩運悶絕不省人事傷胎去血產後去血崩中去血拔牙去血金瘡去血不止者心煩眩暈頭重目暗耳聾舉頭欲倒悉能治之

川芎　當歸各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去查熱服無時　若產後眩暈宜加芍藥服之　不因去血過多則是痰飲眩暈各用二陳湯四七湯之類各見本方　芎歸湯其名甚多一名桂香散治產後腹痛不可忍者加官桂等分酒與小便合煎服之立効　一名當歸湯治姙婦或子死或不死胎動每服用水酒合煎連進數服胎若已死服之即下若未死者其胎即安此藥累用之萬無一失　一方佛手散治產後胎前腹痛體熱兼治產後諸疾逐敗血生新血　一方羊肉湯治虛損羸之腹中疼痛往來寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服加精羊肉一兩生薑十片水二盞煎至六分　一名琥珀散臨用服之則縮胎易產

萬口君臣散治室女婦人心腹疼痛經脉不調用水煎服　姙婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服難產倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水與小便同煎連進數服即效　產後多用百草霜香白芷等分為末每服二錢童子小便好醋各一合沸湯淺服一服見效甚者兩服以分娩矣　一法五積散加醋煎服亦能催生產後惡血注心迷亂喘急心腹作痛亦用黑豆加生薑自然汁半合煎服此兼治腸風臟毒每服加槐花末半錢服之三日取下血塊即愈吐血亦宜服產後頭痛加荊芥煎　若崩中漏下失血過多不能止服煎藥不效者用香附子炒去皮毛每服一兩入甘草一錢沸湯點服仍用震靈丹間之　有白帶者加芍藥半兩則以白丹間之　一法治赤白帶下用芍藥乾薑等分為末米飲調下久久服之皆能作效或謂香附子耗氣則不然此藥資血養氣婦人之仙藥雖羸劣之人尤宜服之

易簡熟地黃丸　與後所載[illegible]同主治條　[illegible]見本方

小芎辨散 治婦人赤白帶下

白芍藥 二兩 乾薑 半兩

右爲細末每服三錢空心温米湯調下晚又進一服十日作效

温六湯

四物湯加羌活等分 一木加白木茯苓 海藏

叹正上五味只爲蒼朮相拌治諸痛有神

又方與白朮相拌和

天麻 茯苓 穿山甲

右別爲細末酒煮或調服亦可

羌活龍膽湯 治目赤暴發雲翳疼痛不可忍

右四物各半兩加 羌活 防風 各三錢 草龍膽 防巳 各一錢

不犯鐵器杵爲細末水煎服

地黄膏子丸

治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控睪相似或微腫陰上腫心腹不可忍者宜煎此藥

血竭 沉香 木香 廣茂 玄胡 蛤蚧

人參 當歸 川楝 芍藥 川芎 續斷 白朮 全蝎 柴胡 茴香 没藥 上分

隨入加減用之

多氣者加青皮陳皮多血者加肉桂吴茱萸

右同爲細末地黄膏子丸桐子大空心温酒下二十丸每日加一丸加至三十丸

神方驗胎散

婦人三二箇月經血不行疑似雙身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之内也外以身弱急邪脉滑脉指之十得八九矣

真雀腦芎 一兩 當歸 全用重七錢

右二味爲細末分作一服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服亦得可待三兩箇時辰間覺臍腹微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩而無虞如不是胎即血滯惡物行過母亦安也如服藥後不覺效再煎紅花湯下必有神效

雲苑丹 治婦人血脉經住三月驗胎法

真川芎 不以多少

右爲細末濃煎艾湯下一七　腹内微動是有胎
也
治崩不定或淋漓年久者
白茯苓(各一兩 去皮)　没藥(一錢)　硇砂(半錢)　黄丹(半錢)
右件將白茯苓搗成汁下餘藥細末一處研勻就
成丸子如彈子大每服一丸新綿裹定内陰中立
效
婦人月事不至是爲胎閉爲血不足宜服四物湯婦
人崩漏是爲血有餘也亦服四物湯[illegible]
婦人月事不至者因損其源不能生故胞[illegible]不通
是血不足宜服四物湯是益源和血之[illegible]人
崩[illegible]是血多也[illegible]其源是火[illegible]
[illegible]四物湯是[illegible]之藥也
[illegible]水病者故不得臥臥則[illegible]也腹
中[illegible]病不於胃也[illegible]不傾則能飲食不下者
胃脘隔也身重難入行者胃募在足也月事不來
者胞脈閉也胞脈雖屬心而絡於胞中令氣上逼
肺心氣不得下通故月事不來也

易簡惺惺散([illegible])
即四君子湯加　木香　藿香　乾葛
治小兒泄瀉胃熱煩渴不問陰陽此一法與錢氏意
同實則泄其子上逆行而南故白朮茯苓之類
保安湯([illegible]胎動不安)
黄芩　縮砂　酒水煎服
海藏當歸丸(治三陰受邪心腹小腹疼痛[illegible]等)
右四物湯各半兩加防風半兩　獨活(半兩)
續斷(一兩)　全蝎(半兩)　苦楝(七錢)　玄胡([illegible])
木香(半一錢)　丁香(半二錢)　茴香(炒一兩)
同爲細末酒糊丸空心温酒下三五十丸大效
易簡酒煮當歸丸([illegible])
千金白堊丸
治經水適來適斷多少不一淋漓不斷臍腹腰痛
虚弱不食經水或青黄黑色水木收體沉重
白堊　白石脂　牡蠣　禹餘粮　烏魚骨
龍骨　細辛(各二錢)　當歸　茯苓　乾薑
黄連　桂心　人參　瞿麥　石葦

白芷 白斂 附子 甘草炙各一錢 半藥錢

細末蜜丸桐子大空心酒二十丸日進三服至候

來時日四五服

加減白芷丸前藥內加

藁本 甘草 大黃各二兩

若十二癥倍

牡蠣 禹餘粮 烏魚骨 白石脂 龍骨

若九痛倍

白斂 甘草 當歸 黃連

若七害倍

細辛 藁木 甘草 花椒 茱萸

若五傷邪者倍

大黃 石葦 瞿麥

若三痼倍

人參 白礬 巴戟 赤石脂各二分

右各隨證加減主治並見金匱

十全博救方治橫生難產

蛇皮一條瓶子內塩泥固濟燒黑存性每服一錢

榆白皮湯調服立效

產書云治產不順手足先見者蛇皮燒灰研面東酒

服一錢 更以藥末傅手足即順生也

王紹顏信効方云頃年得腰膝痛不可忍醫以腎風

攻刺諸藥不效見傳信方有此驗立製一劑神效

故錄之

海桐皮二兩 牛膝 川芎二兩 羌活二兩

地骨皮一兩 甘草 五加皮各二兩 薏苡仁二兩

生地黃十兩

右九物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿

一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏七日

候熟空心飲一杯或控乾焙末蜜丸亦得

苦練丸治膀胱小腹痛神效

川練子 茴香各二兩 附子一兩炮去皮

右三味酒二升煮盡爲度焙乾細末之每秤藥味

一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十

八箇別爲末一味勻酒糊丸桐子大溫酒下五十

丸空心服痛甚加當歸煎酒下

茴香湯

茴香 一錢二分　苦楝 三錢一分　甘草 一兩一錢　鹽 一兩七錢

一分已上同鍊炒熟　陳皮 去白秤二錢二分

右細末空心點服

四聖散

茴香 炒　苦楝 炒焦　全蝎 炒　胡椒 [illegible]

右細末鹽湯點服一法加玄胡木香寒者加桂附

又方破聖散

破故紙 二兩　蘿蔔子 一兩

右細末皂角子丸梧子大鹽湯下三五十丸

茴香散

茴香 一兩　巴豆 七箇去皮油

右二味同炒茴香黃色去豆不用好紙上鋪藥以盆合之一宿去火毒爲末每服三錢酒調下酒糊丸亦得

錢氏捻頭散

又茴香丸茴香良薑肉桂蒼朮酒糊丸

仲景療狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之方

蜘蛛 十四枚焦炒　桂 半兩要入厥陰取其肉厚者

右爲散每服一錢七[illegible]丸亦可、雷公云凡使蜘蛛勿用五色者兼身上有刺毛生者并薄小者、已上並不堪用、凡須屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也、凡用去頭足了、研如膏投藥中用、此陰方之法、若仲景炒焦用、全無功、陶居士云取其網着衣領中辟忘、詩蠨蛸戶庭、正謂此也、千金治人心孔昏塞多忘喜誤、七月七日取蜘蛛着衣領中、勿使人知則永不忘也、狐之爲名夜伏而晝見、以其疝氣處厥陰中分郛人之陰暴隱與之所、故以狐疝名之、[illegible]即癩之名、卵即其名也、經亦以控卵稱之、又作兆腫呼之、太陽受寒血凝爲瘕、太陰受寒氣聚爲疝、小兒狐氣偏大如石、厥陰之分亦太陰主之、故帶之爲病太陰主之、以灸章門三穴麥粒大各三壯效

集驗方 療男子陰腫如斗大并核腫痛人所不能者

右從足大指[illegible]爲傳之腫處

八風五痺

黃帝問曰風之傷人也或爲寒熱或爲寒中或爲熱中或爲癘風或爲偏枯或爲風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其故岐伯對曰風氣藏於皮膚之閒內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怢慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥其人肥則風氣不得外泄爲熱而目黃人瘦則外泄而寒則爲寒中而泣出　風隨四時各入五臟爲各各入其門戶所中則爲偏風　風氣循風府而上爲腦風風入系頭爲目風眼寒　入房汗出中風爲內風　飲酒中風爲漏風　新沐中風爲首風　在外腠理爲泄風　久風入中爲腸風飧泄　肺風多汗惡風時欬短氣晝甚暮差診在眉色白　心風焦絕善怒言不可快診在口色赤　肝風善悲色蒼嗌乾憎女子診在目下色青　脾風怠惰四肢不欲動不嗜飲食診在鼻色黃　腎風面厖然浮腫脊痛不可正立隱曲不利診在肌色黑　胃風頸汗多惡風飲食不下膈塞不通腹滿失衣食寒則泄診在形瘦而腹大　首風頭面多汗惡風先一日病甚頭痛至其風日却少許　漏風多汗不可單衣食則汗出身體自汗惡風衣濡渴不能勞也　泄風多汗惡風汗出泄衣口乾上漬風不能勞事身盡疼痛則寒　古寄風之病至微治之以湯泄十日以去八風五痺之病八風謂八方之風五痺謂皮肉筋骨血之痺也

靈樞經曰風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋　風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外在於肌　風從南方來名曰大弱風其傷人也內舍於心外在於脈　風從西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肉　風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮　風從西北方來名曰折風其傷人也外在於手太陽之脈內舍於小腸　風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨　風從東北方來

各有所屬其傷人也內舍於大腸外在於腋脅又
所論曰以春甲乙日傷於風者爲筋痹以夏丙丁
日傷於風者爲脉痹以秋庚辛日傷於風者爲皮
痹以冬壬癸日傷於風者爲骨痹以至陰遇此者
爲肉痹此所謂八風五痹之病也
新校正云按此註引痹論今經中痹論不如此
當云風論曰以春甲乙日傷於風者爲肝風以夏
丙丁日傷於風者爲心風以季夏戊巳日傷於風
者爲脾風以秋庚辛日傷於風者爲肺風以冬壬
癸日傷於風者爲腎風　痹論曰風寒濕三氣雜
至合而爲痹以冬遇此者爲骨痹以春遇此者爲
筋痹以夏遇此者爲脉痹以至陰遇此者爲肉痹
以秋遇此者爲皮痹　氣血之帝曰餘巳知氣穴
之處遊針之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎岐伯
曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪
以通榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外爲發熱內
爲少氣疾瀉無怠以通榮衛見而瀉之無問所會
帝曰願聞谿谷之會岐伯曰肉之大會爲谷小

熱痹
寒痹

會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣
邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲膿內消骨
髓外破大膕流於節腠必將爲敗積寒留舍榮衛
不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁
命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴
會亦應一歲其小痹淫溢循脉往來微針所及與
法同源痹在皮寒在脉血凝在筋屈不伸在骨重
在肉不仁在皮膚易已在筋骨疾入腸則死陽多
陰少爲熱痹陰多陽少爲寒痹陽少陰盛汗出爲
濡胞痹至陰遇此也五痹不已重感於邪內舍於
臟各有所歸淫溢之氣妄行隨臟所主而入爲痹
也行痹風勝周痹其著痹濕勝痛痹寒勝諸痹不
已邪舍內也下有胞痹等當在此下

八風五痹

筋痹春遇　脉痹夏遇　皮痹秋遇　骨痹冬遇
頭風　腸風　迎風發大寒腦痛漏風酒消
癘風成癩　伏梁爲風根　寢汗惜風　胞痹
腸痹　熱痹當在五痹下

四時之正氣八節之風來朝天乙風氣安靜乃祈利經脈調血氣故曆忌云八節前後各五日不可灸刺風朝太乙具見天元玉册八正者所以候八風之虛邪以時至者也　四時者所以分春夏秋冬之氣所以在時調之八正之虛邪而避之勿犯也以身之虛逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五臟故曰天忌君子不可不知也　海藏云豈特八風而已凡過七十二候中諸節候之氣寒暑溫凉應時其變異常者可避忌之　酒濕之為病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂渾似中風舌語不正當瀉濕毒不可作風病治之而苦汗之衍義所論甚當易簡所言與此相同見參蘇飲條下

八風散

治八風十二痺猥腿半身不遂節痛皮脈筋緩急痛不在一處口眩失神恍惚妄言身上瘖瘰面上疱起黃汗染如濕不等顏色乍赤乍白乍青乍黑乍寒乍熱身反張一切等證

麻黃　白术各一斤　栝蔞根　甘草　蔓荊
天雄　白芷　防風　芍藥　石膏
天門冬各十兩　羌活二斤　黃芩一斤五兩
山茱萸　食茱萸二斤　躑躅花二斤
茵陳十四兩　大黃斗　細辛　乾薑　桂心各三斤
丹參　雄黃　朱砂各二兩半

右二十五味為散酒服方寸匕日一服一月後再五十日覺一日再至一歲可常服先食

患熱風者先治熱毒治四肢不收不能用力失神不知人合三汁法

竹瀝汁　生葛汁各一升　生薑汁三合

右三味相合溫煖分三服平旦日晡各一服覺四肢有異風疾人多慾者加遠志仁人參不能屈伸者加牛膝文潞公藥準所載外臺荊瀝竹瀝法并大續命後竹瀝法並見前

四季之風其傷人也各舍本藏先外後內難經云妄不受邪者乃是也

金匱要略中風歷節病脈證治 [illegible]

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脉微
數中風使然寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛
寒則搏邪在皮膚浮者血虛脉絡空虛邪賊不瀉
或左右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂
邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於
腑則不識人邪入於臟則舌強難言口吐涎沫

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者外臺治風癲

菊花四十分 白朮十分 細辛三分 牡蠣三分燒
桔梗八分 防風十分 人參三分 礬石三分燒
黃芩五分 當歸三分 乾薑三分 川芎三分
桂枝三分去皮 茯苓三分去皮

右十四味為散酒服方寸匕日一服初服二十日
溫酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止
即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助
藥 外臺有中乳分無桔梗

主癱癇方 此金匱風引湯也

大黃 乾薑 龍骨各四兩 桂枝三兩去皮
甘草炙二兩 牡蠣燒二兩 滑石 石膏

寒水石 赤石脂 紫石英 白石脂各六兩
右十二味杵麤篩以葦囊盛之取三指撮井花水
三升煮三沸去滓溫服一升深所云大人風強少
水驚癇瘛瘲日數十發醫所不治除熱方效宜風
引也

防己地黃湯

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮者

防己一分 桂枝三分去皮 防風三分 甘草二分炙

右四味㕮咀以酒一杯漬之一宿絞取汁取生地
黃二斤㕮咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更
絞地黃等汁和分再服

頭風摩散方

大附子一枚炮去皮臍 鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕摩疢上令藥行

寸口脉浮而弱沉即主筋浮即主腎弱即主脉出入
水中如水濕心歷節黃汗出故曰歷節
趺陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出少陰脉浮
而弱則血不足浮則為風血風相搏即疼如掣盛

人脈濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲
酒汗出當風所致節節疼痛身體尫羸脚腫如脫頭
眩短氣温温欲吐者以
桂枝芍藥知母湯主之
桂枝四兩去皮 芍藥三兩 甘草二兩炙 麻黄二兩去節
白朮五兩 防風四兩 生薑五兩切 附子二兩炮去皮臍
知母四兩
右㕮咀以水七升煮取二升去滓温服七合日三
服

烏頭湯治歷節疼痛不可屈伸
烏頭五枚㕮咀以蜜二升煎取一升即出烏頭 甘草炙一兩 麻黄去節
芍藥 黄芪各三兩
右四味㕮咀以水三升煮取一升去滓内蜜煎熟
温服七合不知再服之
治脚氣衝心方
右以礬石二兩將水一升五合煎數沸浸脚良
附方續命湯
治中風排身不能自收口不能言冒昧不知痛處
或拘急不得轉側
麻黄三兩去節 桂枝去皮 當歸 人參 乾薑
石膏碎綿裹 甘草二兩炙各 川芎一兩 杏仁十四枚去皮尖
右九味㕮咀水一斗煮取四升去滓温服一升當
小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁
忌勿當風 姚云與大續命湯同兼治婦人產後去
血者及老人小兒尤宜服 并治但伏不得臥欬
逆上氣面目浮腫古今錄驗方 范汪云是仲景
方欠兩味
三黄湯
治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒不下
食
麻黄五分去節 獨活四分 細辛二分 黄芪二分
黄芩三分
右五味㕮咀以水七升煮取二升去滓分温三服
一服小汗兩服大汗心熱加大黄二分腹滿加枳
實一枚氣逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加栝
蔞根三分先有寒加附子一枚

八味丸

治風虛頭眩苦極口不知味腹餒溫中益精氣附子湯方見風濕中見近效治脚氣上入小腹不仁

熟地黃八兩 薯蕷四兩 澤瀉二兩 山茱萸四兩

牡丹皮二兩 桂枝三兩去皮 茯苓三兩 附子二兩去皮臍

細末鍊蜜丸桐子大酒下十五丸日再服加至二十五丸崔氏

越婢加朮湯

治肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲風下焦脚氣從治之

麻黃六兩去節 石膏半斤 生薑三兩切 甘草二兩炙

大棗十五枚擘 白朮四兩

右六味以水六升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服惡風加附子一枚炮見千金方

風癇例

經云因母腹中感驚風氣而得後成人至欲壯纔發是其源也

五癇五獸

犬癇反折上竄犬叫肝也、雞癇驚跳反折雞叫、肺也、羊癇目瞪吐舌羊叫、心也、蛇癇弄舌搖頭心也、牛癇目直視腹滿牛叫、脾也、猪癇如尸吐沫猪叫、腎也、已上五癇重者死病後甚者亦死、錢氏云大喜後食乳食多成驚癇、大哭後食乳食多成吐瀉、服冷乳則青、食熱乳則瀉黃、男發搐目左視無聲右視有聲、女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也別有發搐證、

妙香丸見疳方

後有蝎稍丸 一名靈砂歸命丹

治小兒癇一粒分作一十五丸每服二丸蜜水下

此治脉有方內熱無力外寒五生丸治之

鶴頂丹 硃砂丸 錢氏抱龍丸 錢氏安神丸治

方見本方 山藥 牙硝 龍腦 麥門冬

凝水石

東垣先生驪珠丹治老人虛熱皮燥不食安神

人參 沉香

局方甘露丸主消渴見本條

至寶丹　活命金丹　不換金丹　蝎稍丸　軟金丸並見王腐大通痹本條後

易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾者並難治療

南星一兩　川烏半兩　生附半兩　木香一分

右㕮咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去查溫服或口禁不省人事者用細辛皂角各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之　一法氣盛人止用南星半兩木香一錢加生薑七片煎名星香散　一法氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅效　因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審其的然是風方用醒風湯小續命湯之類　中寒只用附子理中湯姜附之類　中濕則白术酒术附湯之類皆可用　中暑不錄於此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本方

五生丸李仲南傳治癇有神

南星　半夏　川烏　白附子各一兩

大豆去皮一錢半

右細末滴水為丸桐子大每服三丸至五丸不得

過七丸姜湯下

局方生白丸治風大痛筋脉攣急

白附子三兩　南星二兩　半夏七兩　川芎半兩已上皮明

銀器盛器內將水煮五沸取出焙乾用

右細末糯米麪糊為丸如桐子大生姜湯下二十丸不拘時

局方青州白丸子

治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞一切風病他藥所不能療者小兒驚風大人

頭風先頭風婦人血氣並宜治之

南星三兩生用　半夏水泡七兩生用　白附子二兩生用

川烏生去皮臍半兩

右搗羅極細末以生絹袋盛用井花水未去者更以手揉令出如有查更研挼入絹袋擺盡爲度於磁盆中日曬夜露至曉棄水別用井花水攪又擺至來日早再換新水攪如此春五日夏三秋七冬十日去水曬乾後如玉片碎碾以糯米粉煎粥清爲丸如菉豆大初服五丸加三服至三日後浴當有汗便能舒展服經三五日呵欠是應常服十粒以來亦無痰膈案之患小兒驚風薄荷湯下三兩丸

易簡青州白丸子古今錄驗

南星　白附子並見本方　半夏　川烏

右每服五十丸生姜湯下此藥本方所服丸數極少恐難愈病今加數服之咳嗽痰實咽喉作聲老人小兒宜加服之　一切痰涎爲患及中風偏癱之疾常服悉有神效　若小兒驚後發熱多作慢驚常雜以金液丹用之甚驗　男子婦人小兒小便白濁及思念過多致陰陽不分清濁相干此藥極能分利　若心多驚悸夜卧不寧或復健忘甚者狀如癲癇皆由心氣鬱結或思慮傷脾致痰飲患節迷亂心經之所致也不宜劇用涼心之劑常服此用溫膽湯佐之　若心中怔忡嘈雜常眩頭目昏沉肌肉瞤動頸項強痛四肢痠痛手足戰曳甚者半身不遂多因痰飲使然若例作心病風病發寒濕治之恐非其宜疹當用之仍以利痰飲之劑服無不應手而愈　一方用南星白附子等分半夏倍之滴水爲丸服之亦效

白茯苓丸此出指迷痰症

南星　半夏　白朮　白附子　茯苓　白礬

右細末生姜汁滴丸菉豆大生姜湯下二三十丸無時

二白丸此二味五分匾氣不可不察

白礬一兩許嘅約

右用生蒸餅裹蒸熟去皮臨丸入輕粉一字或半

鐵甕虛齋加減丸桐子大每服二三十丸姜湯下
小兒丸小

小靈寶丹

附子炮二兩 天麻 全蝎 白姜蚕炒
藿香葉 南星炮 白附子炮各半兩

右細末酒糊丸桐子大溫酒下十五丸
靈寶丹又有草烏黑豆製謂之瑞靈寶丹

抱龍丸

枸杞 黃芪 半夏 天麻

右為細末好酒和作團以竹蒸餅剤裹藥蒸熟去
上薄皮搗和勻如硬酒酒些小可丸

治癇方治太陽陽明二經為病

荊芥穗四兩 白礬一兩細末為

右棗肉丸桐子大每服二十丸荊芥湯下次服三
十丸次服四十丸次五十丸食前

食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二十種
驚癇寒熱腸痔蠱毒惡瘡安胎熬用治蛇癇弄舌

去積消痞傷食感寒治脾胃之妙藥

搖頭者宜用全脫也

狂邪顛癇時欲臥眠自賢自智驕居安行一體方能此
一安臟下氣

右用白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁和
諸藥煮服之文字彌古者尤佳

南星半夏例

加黃芩為小黃丸 加人參苦葶藶為定喘丸

又一法加硃砂煮半夏白附子糊丸桐子大每服十
五丸生薑湯下薄荷湯亦可

易簡紅丸子 蒲合局本之法並見易簡方

蓬朮 三稜 橘皮 青皮 胡椒 乾姜
阿魏 礬紅

右每服六十丸姜湯嚥下大治大人小兒脾胃之
證極有神效但三稜蓬朮本能破癥消癖其性猛
烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之
處隔絕二藥不得其眞乃以紅蒲根之類代之性
雖相近不功力不同應老弱虛人小兒姙婦以其

治病不能傷耗真氣故服之無疑此藥須是合令
藥致用好米醋煮陳米粉爲丸若修合之時常去
阿魏礬紅小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿
服之應手而愈　大病之後穀食難化及治中脘
停醋並生姜湯下　脾寒瘧疾生姜橘皮湯下
心腹脹痛紫蘇橘皮湯下　脾寒作楚甘草湯下
酒疸穀疸遍身昏黃大麥湯下　兩脅引乳痛沉
香湯下　酒積食積面黃腹脹時或乾嘔煨姜湯下
婦人脾血作楚及血癥氣塊經血不調或過時不
來並用醋湯嚥下　寒熱往來者尤宜服之　產後
狀如癲狂者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以
此藥熱醋湯下其效尤速　男子婦人有癲疾
者未必皆因心經蓄熱亦有因胆氣不舒遂致痰
飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則愈見昏
亂常以此藥衣以辰砂用橘葉煎湯嚥下名小鎮
心丸　妊婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治惟此
最妙乃佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服
每易名用之時有神效但恐妊婦服之此後偶爾

損動必歸咎此藥故不敢極口其效

局方紅丸子

治丈夫脾積滯氣胞膈滿悶面黃腹大四肢無力
酒積不食乾嘔不止背胛連心胞及兩乳痛婦人
脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃
腹脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老幼並宜服
之

廣茂五斤　青皮五斤　胡椒一斤　乾姜五斤
陳皮五斤去白揀淨　京三稜五斤[illegible]水浸[illegible]作片子

右件六味並爲細末醋糊丸梧子大礬紅爲衣每
服三十丸食後姜湯下小兒臨時加減與之

局方蘇合香丸

療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐
利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫
驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

蘇合香油一兩入安息香內　白朮二兩　青木香二兩
朱砂二兩研水飛　白檀香二兩剉　薰陸香一兩另研
沉香二兩　烏犀屑二兩　安息香二兩另研

無灰酒 香附子 訶黎勒【去皮】
龍腦【研一錢】 麝香【研一錢】 蓽撥【一兩】
右細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服施丸桐子大早取井花水溫冷任意化服四丸老人小兒可服一丸溫酒化服空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡蘇合香丸
每服一二丸沸湯少許化服治卒中昏不知人事及霍亂不止及心腹撮痛鬼注客忤癲癇驚怖或損撲傷損氣暈欲倒凡是倉卒之患悉能治療治隨身不可暫闕辟諸惡氣并禦山嵐障氣無以踰此若吊喪問疾之處尤不可無但市肆所賣多用腦子當以火上焙去能者以酒調服若用心過度夜卧不安尤宜服功效不可具述

返魂丹
治小兒諸風癲癇潮發瘈瘲口眼相引項背強直身體緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡皆因荏苒不解宜服之
烏犀【一兩鎊屑】 水銀 天麻 檳榔
姜蠶【去絲嘴微炒】 硫黃
獨活【去蘆】 川烏 乾蝎
蓽撥【各一兩】 肉桂【去粗皮】 防風【去蘆】 沉香
槐膠 當歸【去蘆】 細辛 天南星
阿膠 藿香葉
烏蛇 白花蛇
羌活【去蘆】 白附子 麻黃【去根節】 半夏【湯泡】
羚羊角【鎊】 陳皮【各一兩】 天竺黃【研】
木香 人參【去蘆】 乾姜【炮】 茯苓【去皮】 蔓荊子【去白皮】
晚蠶紙 藁本 敗龜板
桑螵蛸 白芷 何首烏 虎骨
縮砂仁 丁香 白朮 枳殼
厚朴【去粗皮】 蟬殼 川芎
附子【去皮】 石斛【去根】 肉豆蔻 龍腦【研】
牛黃【研】 硃砂 雄黃 麝香
烏鴉【一隻】 狐肝【三具】

研 金箔二十片為衣

右藥五十八味並須如法製造杵令細煉蜜和合入酥卸搗二五千十丸如桐子大金箔為衣每一歲兒溫薄荷自然汁化下無時

入風倒

海藏云撓萬物者莫疾乎風風者百病之長善行而數變衝蕩吹擊而無窮從前來者為虛邪從後來者為實邪自病者為正邪假令春得金風是為賊邪非隐𧓋之風為賊風也故古人云虛邪賊風避之有則

筍方入風丹

半夏 白薑蚕 炒 白附子 炮各五錢

天麻 白 龍 麝香 研各一錢半 寒水石 燒赤水飛半斤

右細末入碾藥再碾勻煉蜜丸櫻桃大細嚼一丸荊芥湯茶湯任下食後服

辰砂天麻丸

天麻 二兩 南星 二兩薑汁浸切片 川芎 二錢半

白附子 炮五錢 白芷 一錢八分 麝香 一錢二分半

石砂 五錢一分半 為衣

右細末水糊丸桐子大荊芥湯下二十丸無時

辰砂丸 治心熱驚風痰涎壅塞

辰砂 一兩 半夏 湯洗一兩 蝎稍 一錢 白附子 炮一錢半

白薑蚕 炒二錢 牛黃 一錢 硼砂 一錢

右細末糊丸桐子大生薑荊芥湯下二十丸無時

麝香全蝎散 治小兒驚癇

麝香 硃砂 各半錢七 全蝎 一箇大者

右三味碾爛熱酒調下空心

立應散 治急驚風

麝香 少許 蝎稍 二錢 全頭蜈蚣 一條

右為細末鼻內嗃隨左右用之

徐老丸 諸藥皆生用常服皆製

南星 半夏 蛤粉 白礬 乾薑 大黃

黃連 黃蘗 牽牛

解語丸 治中風言語蹇澁不正

白附子 石菖蒲 遠志 全蝎 羌活

天麻 南星 白薑蚕

右為細末蜜丸豆大服之

玉液丸 玉人集並見本方

半夏洗 白礬 寒水石燒

玉芝丸 見上治並見本方

人參 白礬 茯苓 南星 半夏

薄荷

人參半夏丸 玉芝加蛤粉

藿香 黃連 黃蘗 乾姜 寒水石

右末之上去藥並用糊為丸

與殺用丸相和為拽風丸與金花丸相合為軟金花

丸

局方通聖白花蛇散 上治並見本條

天麻 赤箭 防風 厚朴 藁本 海桐皮

萆薢 木香不見火 肉桂 杜仲 山藥

當歸 甘草 菊花 羌活 虎骨酥炙 白芷

乾蝎 牛膝酒浸 白花蛇 威靈仙去土 蔓荊子去皮

郁李仁 白附子 以上各等分

右細末每服一錢或二錢溫酒調下荊芥湯亦得

空心服久病之人尤宜服之

木香保命丹

通聖白花蛇細散 是螵蛸獨麝均攤

蜜丸如彈朱衣色 便是木香保命丹

仲景皂角丸例

皂莢丸 治救逆上氣喘息不眠

皂角一物杵末蜜丸桐子大大棗膏汁下

又一法加半夏一法加大黃一法加牽牛利膈一

法加槐莢子青皮半夏黑牽牛 右用生姜糊丸

桐子大生姜湯下一十五丸 孫眞人治大小便

不通關膈不利燒皂莢粥飲下三錢立通

崔元亮治咳嗽腹脹

炙皂角去弦

右細末蜜丸桐子大肉汁下十丸利後忌肉一月

皂角為君 一法加神麴 麥蘖 半夏

白礬 南星 青皮 陳皮 白芷

右細末姜糊丸桐子大每服三十丸姜湯下硃砂

為衣

皂莢半夏湯 [illegible]

皂莢五大錠打碎半下五兩二味同煮一日去

皂莢取半夏晒乾爲散每服一錢水一鍾生姜

十片葱白三莖煎六分去查溫服無

衍義云 [illegible]

皂莢 [illegible] 白礬 [illegible] 輕粉 [illegible]

右末之水調一二錢灌之須臾吐涎用丸者分膈

下涎也

皂莢治喉閉逡延不救方

皂莢 [illegible]

皂莢丸 [illegible]

皂莢 [illegible]

右爲細末蜜丸桐子大每服十丸臨卧桑白皮煎

湯下

治溼中久病濕熱

皂莢與蒼朮燒之以辟濕熱疫氣濕邪

治遠年近日休息痢皂莢不蛀者不以多少土磚燒

右燒盆子合定以土圍之存性搗爲末每服二

錢茶末一錢相和白湯點服病雖大不過三五

愈日可二服

枳殼丸

皂角 二兩酥炙 枳殼 二兩炙炒 木香 檳榔

半夏 各半兩

右爲細末姜糊丸桐子大姜湯下三十丸食後臨

卧服

袪風丸

皂莢 君 車前子 赤茯苓 木香 檳榔

枳實 大黃 牽牛 青皮 陳皮

半夏

右爲細末米飲丸桐子大三十丸姜湯下

備急五嗽丸

皂莢 乾薑 桂 各等分

右爲細末蜜丸桐子大酒米飲下五丸

小枳殼丸

枳殼 茯苓 白朮 乾薑 半夏 各等分

導飲丸

枳殼　木香　檳榔　青皮　白朮　陳皮

半夏　茯苓　三稜　廣茂各等分

一法加牽牛用生姜自然汁糊爲丸

三倍丸

木香一兩　青皮二兩　半夏三兩

右細末姜糊丸姜湯下

小檳榔丸

木香一兩二錢半　檳榔　枳實三兩五錢半　大黃五兩

牽牛頭末二兩

右細末木丸加青皮爲氣針丸一法去大黃加乾姜以其所傷有寒熱之異也去枳殼大黃加陳皮乾姜爲檳榔丸

大檳榔丸

木香三錢　檳榔三錢　枳殼半兩　大黃一兩

青皮半兩　陳皮半兩　黃連　黃栢

廣茂各二錢　當歸　香附子　牽牛末一兩以上各

右二味生姜和丸菉豆大姜湯下二十丸並實熱人可以服　一法枳實木香檳榔青皮陳皮三稜廣茂枳殼大黃牽牛爲細末糊丸桐子大　一法去大黃牽牛加神麴麥蘗

三稜丸

治男子婦人癥瘕痃癖積聚成塊不散堅滿脃膈痞悶飲食不下兩脅時痛一切腹脹積聚等證並皆治之

人參三錢　木香　檳榔三錢半　白朮一兩

三稜一兩半　廣茂六錢半

右細末生姜汁糊丸桐子大臨卧生姜湯下三四十丸　一法爲散每日空心沸湯調服三錢早晚各一服

木香三稜丸

木香半兩　三稜一兩半　廣茂一兩　香附子四兩

右加甘遂爲泄水丸　加甘遂牽牛茴香爲泄水散姜汁調下　子和泄水丸藏用丸一料加甘遂一兩

泄水散

牽牛頭末一兩 木香二兩 茴香一兩炒 甘遂三錢半

右調細末姜汁調一二錢

錢氏宣風散

牽牛末一兩 檳榔二個 陳皮 甘草各半兩

右細末食前蜜水調半錢或一錢

錢氏利驚丸

輕粉一錢 天竺黃一錢 青黛一錢 牽牛末半兩

右細末蜜丸豌豆大薄荷湯下 加半夏爲軟金丸

守真藏用丸 遍身疼痛者加白芥子爲應痛元 大熱瘡痒者加芒硝爲解毒丸 腸胃燥澁者加郁李仁爲潤腸丸 日久成積者加蜜陀僧爲消積丸 加兎仁爲兎仁丸 加桂陳橘皮茴香爲和中丸 加木香檳榔爲瀰香丸 加薄荷川黃連川芎爲神芎丸

通聖散加 地骨皮 甘菊花 生地黃

蜜丸通聖菊花丸 加天麻甘菊熟地黃蜜丸爲通聖天麻丸 右藥丸如彈子大每服一丸

大抵通聖散解利治實人外傷傳染有形大便結者效非仲景本藥也與易老羗活散加大黃同意若內傷冷物寸口小者變證必矣戒之戒之

泄水丸散治脚搭中痛法在十棗湯後蓋厥陰分也

木香定痛丸

治遠年近日患腰痛疼痛不能起坐氣血凝滯走疰疼痛一切腰痛

木香半兩 青皮二錢 陳皮半錢 大黃一兩

黑牽牛頭末一兩 甘遂一錢 茴香一錢

川芎一錢 白芥子一錢炒 當歸半兩一錢

沒藥一錢

右細末酒糊丸桐子大每服一十五丸一十丸食前臨卧温湯下

仲景附子湯在少陰篇丁五方當用

附子 人參 白朮 茯苓 芍藥

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩痛四肢拘急不可屈伸近日

則自汗出而氣短小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫。

附子一錢炮　桂心八錢　白朮六錢　甘草四錢炙

生姜六錢

右㕮咀水一升半煮取八合分三服微汗愈對病加減　大汗煩者三服三合　體重者加防已八錢　悸氣小便不利者加茯苓六錢

仲景甘草附子湯　此四物附子湯無乾姜

附子湯此湯在四逆湯條下

治寒邪緩風身體疼痛如折肉如割雖刺

四君子湯加桂附芍藥　白朮附子為君而多

右七味水一升煮六合分三服對證增損

易簡附子湯　與附子同在少陰姜附湯下

萬病無憂散

木香　胡椒各半錢　黃芪　木通　陳皮

桑白皮　白朮各一錢　黑牽牛末六錢

右七味細末二錢七牽牛末二錢七空心姜湯調服

枳實丸

枳實三錢　大黃半兩　牽牛半兩

右三味為末與子和細水丸為小兒通膈丸加皂角為祛風丸

搜風利膈丸

大黃二兩炒　牽牛二兩炒　芒硝半兩

右細末糊丸菉豆大量虛實加減

玄胡丸

古方玄胡丸此藥當在無價散內分兩未見也

玄胡一兩　青皮半兩　陳皮半兩去白　乾姜三錢　木香

三稜　廣茂各半兩　當歸　雄黃三錢另研各

右細末酒糊丸桐子大

詵詵麴糵丸

青皮去白　陳皮去白　三稜　廣茂　木香　檳榔

半夏泡　白朮　麥糵　姜屑　神麴各等分

右為細末糊丸溫水下二三十丸無時已上尼泄後服白粥一二日忌油膩肉食恐成痢也

醫壘元戎卷第十

趙州教授進之王好古纂次
明監察御史東萊桂亭恭才仝梓　兩淮運同四明胥本峻重刊
兩淮運副姚江嚴昌世校正

厥陰證

調胃散（治一切吐逆[illegible]藥食不下）

硫黃　水銀（各等分）

右先將硫黃研細次下水銀同研至黑色為度每服一錢重者二錢溫米飲調服無時

許學士破陰丹　論伏陽一脈　並見陰證論

還陽丹　活人丹砂丸　火焰散　回陽丹

返陰丹（[illegible]）

半硫丸　治老弱虛人臟腑秘（[illegible]）

硫黃　半夏

局方金液丹（[illegible]）

上二藥並在五苓化水丹後

三寶丹

雄黃　半夏　牡蠣　硃砂

楊氏五神丸（一名[illegible]）

硫黃（另研）　硝石（另研）

右同與磁器內用文武火炒得所勿令太過須一氣透方可若未透則氣不相感

五靈脂　青皮　陳皮（去白）（等分）

右件陳皮等末與硫黃硝石和勻麵糊丸桐子大此藥二氣相配陰陽均平天地平和之氣可熱可冷可緩可急是以治陰陽不調冷熱交攻榮衛相勝心腎不升降水火不交夫婦人因病嬰兒危急但胃氣在無不獲邪氣炎上煩燥冷氣攻急痛膈氣痛塞不可忍腎氣奔下攻之氣滿不可轉動諸霍亂吐瀉渴藥不止一服定大抵吐逆唇口青手足厥冷腳轉筋者兩服傷寒煩燥昏塞倒臥不省人事不得飲新久患崩漏泄利不問赤白冷熱並患深淺服數服止若非時嘔吐飲食不下服之立愈每服五十丸空心米飲下甚者七十丸重稚十丸嬰兒五七丸新生兒二三丸化破與服如小兒急慢驚風些胃氣在雖困無不救者但是歲

臓一切急病不問證疾並可治之非與尋常方一
同乃博効救濟人常也
易簡來復丹主治脩製之法並見局方
硫黃　五靈脂　橘紅　青皮　玄精石
每服二十丸米飲下食前此藥可冷可熱與養正
丹黑錫丹相類但體輕不能鎮墜耳然硝石性寒
佐以陳皮其性疎快硫黃且能利人若作熱藥用
以此瀉誤矣但霍亂一證吐利交作蓋因淡食生
冷暑濕熱之氣中脘結閉揮霍變亂此藥通利三

焦分理陰陽服之其効最驗兼治翻胃嘔逆其効
尤速中暑霍亂此藥最切小兒驚風用亦有驗蓋
上證候皆由涎飲中節致之此藥溫利涎飲既出
則諸恙去若男子婦人心腹作痛疎利之劑　得
効者未應速補當以藥徐徐飲之令大便常通利
則痛不復作矣嘔吐用之其意亦然不可不知腎
厥頭痛老人頭痛並宜常服一法治老人並虛損
之人寒氣入腹大小便不通者用生薑半兩連根
葱和泥葱一根鹽一撮豆豉五十粒爛研署炒盒

臓心脾劑更易用之以利爲度亦良法也
局方來復丹
此藥配類二氣均調陰陽奪天地中和之氣乃水
火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交
養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟
腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不
獲安助真補虛救陰助陽爲効殊勝
舶上硫黃透明不夾石者　太陰玄精石水飛一兩研
硝石半兩同硫黃並爲細末入定磁內以慢火炒不住手攪令陰陽氣相入不可火太過

候冷再研極細名曰二氣末　五靈脂二兩須用五臺山者用水澄去砂石曬乾淨秤
陳皮去白三兩　青皮去白三兩
右用五靈脂二皮爲細末次入玄精石末及前二
藥末拌勻以酒醋打糊爲丸如豌豆大每服三十
丸空心粥飲吞下甚者五十粒小兒慢驚風或吐
痢不止變成風搐非風也胃氣欲絕故也用五
粒碾細末飲送下　老人伏暑迷亂紫蘇湯下婦
人產後血逆上搶心悶絕并惡露不止及赤白帶
下並用醋湯下常服和陰陽益神散膈腎間陰濕

此劑痛疼立見神效應諸疾不辨陰陽證者並宜服之神異不可具述

四神丹

治百病補五臟遠疫病驅卻嵐瘴除尸疰蠱毒鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣弱中滿下虛水火不交養陰陽失升降精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脈拘急及治一切沉寒痼冷痃癖疝瘕絞痛又久久病傷寒陰證脉候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎臟久冷絕孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不差並皆主之此丹假陰陽造化之功得天地中和之氣却與尋常一般一煉僭燥丹藥功效不同此丹活血實髓安魂定魄悅澤顏色輕身保壽不恃藥力縱情恣欲久久服之可通仙道

雄黃　硫黃　雌黃　朱砂

右件四味各五兩碾細入瓷合內將馬鞭草為末鹽泥固濟慢火四斷燒煅一日一夜取出再碾細以糯米粽和為丸如菉豆大每服一丸空心新汲水吞下姙婦勿服忌羊肉葷菜

龍腦太白丹

治風痺偏正頭疼痰膈不利四肢拘急疼痛辟風邪清神志

硫黃細研　硝石各二兩細研　白附子一分炮為末

右件入龍腦少許同碾細滴水丸雞頭大每服一丸細嚼荊芥湯無時

易簡養正丹

硫黃　黑錫　水銀　硃砂

右每服五十丸食前米飲送下此藥用硫黃黑錫本無利性合和在丹藥用以補虛冷治泄瀉之類大不得其宜雖卒中之患痰涎壅盛此鎮墜使大便溏利病亦隨去則於三生飲選藥為之湯液若氣虛喘急之患或發咳嗽沉酣煎湯調鍾乳粉咽下於降氣湯中選用之　若翻胃之患皆因中脘停寒涎痰凝滯食入即吐當用此藥以丁香附子之類煎湯下但丁附性熱恐為痰飲隔節蓄在上

焦反爲借燥則於二陳湯中選藥用之凡治吐者先以加減越鞠丸微利之次用此藥無不見效半硫丸亦有性利用之尤當因仍以水煮半夏丸服之見二陳湯後　若脚氣之患入腹衝心或見嘔吐之證無法可療千金以大黃利之大黃性寒病既深入必難導達見其嘔吐也不若用此藥或黑錫丹來復丹之類鎭降氣湯下便須多服以大便流利爲度脚氣無補法此有利性卽非補藥服之無疑　痃癖疝氣膀胱奔豚之氣入腹者亦宜用此　若尊年之人大腑寒秘者尤宜服之黑錫丹與此同類亦效

局方震靈丹

紫府元君南岳魏夫人方出道藏一名紫金丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化中和之氣又治男子婦人眞元衰憊五勞七傷臍腹冷痛肢體疼痛上盛下虛頭目眩暈心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口舌乾苦飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小便淋瀝夜多盜汗久泄久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎臟無子服之無不愈者

禹餘糧石（火煅醋淬不計遍數以手捻得碎爲度）　丁頭代赭石（如[illegible]）

（[illegible]）赤石脂　紫石英（各四兩）

右四味並用乾鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煅通紅火盡爲度入地坑埋出火毒二宿

滴乳香（別研二兩）　沒藥（去砂石研二兩）　五靈脂（去砂石研二兩）

硃砂（水飛過一兩）

右通前藥共八味並爲細末以糯米粉煮糊爲丸如雞頭大爆乾出光每服一丸空心溫酒冷水亦得常服鎭心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪厲久服輕身漸入仙道忌豬羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效

朝眞丹

治腸胃虛弱內受風冷或食生冷內傷泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷

硫黃一兩生研　焰硝七錢上分　朱砂二錢另研

右合勻水浸蒸餅為丸桐子大米飲下三十丸無時夏月宜用以備急諸沉寒痼冷之疾諸熱藥不能效者灸關元五七壯即效

至寶丹[illegible]

歙金丹

天竺黃各三錢　龍腦一字　麝香　牛黃各一錢

金銀箔各十片

已上七兩九錢一字通碾細研拌白蜜十兩溫溶微煖取蠟滓次入丹拌利藥末每兩作十五丸茶酒任下

海藏云初病疾不宜服至寶丹小兒微疾亦不宜服

人參　天麻　白姜蠶　菖蒲　乾蝎各十兩

防風　半夏牛膽製　白茯苓各九錢　遠志八錢

薄荷一兩　黃連半兩　雄黃二錢　烏犀　玳瑁

琥珀　朱砂

至寶丹大抵風病始自皮毛入腸孫絡孫絡不已流入大絡小絡不已流入大經小經不已流入骨髓先從淺次丸散次丹[illegible]用劑為風入骨髓不能得出故用入骨髓透肌膚之劑為開竅膈之藥龍腦牛黃珀金珠皆入骨髓透肌膚之劑而使風邪得以出於外也初病風疾未及於骨髓使服入透骨肌之藥是引賊入家如油入麵不可出也其反招害如此大抵疾有深淺治有次第初為至淺不可以重劑治雜之小兒腸胃細小肌肉輭脆速以入骨透肌之藥治之若有他證草木之劑不可近也富貴之家深宜戒此若遇潮涎不省瘈瘲急甚不拘此例事至不得已而用之是所得其當矣猶之旬也高則過下則不及要之適下中而已無病人服風藥開發過極反使風入亦猶引賊入家與無病在經而服至寶丹無異

聖功丸[illegible]

膩粉五七錢　定粉二錢七　一法加蛤粉三錢

右同研勻水浸蒸餅為丸綠豆大煎艾湯下五七丸或十丸

蝎稍丸[illegible]

治急風牙禁驚癇搐搦目不定恍惚潮涎昏悶不

省人事利胸膈清頭目化痰實寧心神安臟腑

蝎梢（微炒半兩） 白附子（炮二兩） 天麻（一兩）

龍腦（一錢） 朱砂（研一兩） 半夏（湯洗一兩）

右細末白麪糊丸菉豆大每服三十丸細嚼薄荷湯下臨卧

不換金丹

荆芥穗（一兩半） 薄荷（二兩） 天麻（一兩） 甘草（一兩）

白姜蚕（一兩） 防風（一兩） 藿香葉（一兩） 細辛（一兩）

川芎 白附子 羌活 全蝎（炒各半兩） 朱砂（二錢為衣）

右末蜜爲丸彈子大每服一二丸茶下

治破傷風

蝎稍七條爲細末熱酒調下

上青白附丸（同錢氏溫白丸例）

白附子（炮） 白姜蚕 天南星 半夏

天麻子 川芎 甘菊花 旋覆花

陳皮（一） 全蝎（半兩）

右細末姜糊丸桐子大每服三十丸姜湯下

錢氏溫白丸

小兒脾風虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後慢驚身冷瘈瘲

天麻（半錢） 姜蚕（炮） 白附子（生） 乾蝎 南星

右細末湯浸寒食麪丸菉豆大丸子仍以寒食麪養內七日取出每服七丸加至二三十丸空心生姜米飲湯下漸加丸數

易簡如聖餅子（修合治療之法並見後局方）

川烏 南星 乾姜 甘草

川芎 天麻 防風 半夏

右每服二十餅嚼破生姜湯下本方只服五餅安能作效初感傷寒因汗而解尚餘頭疼濃煎生姜葱白湯皆可此藥行是自合成蕎麪糊丸且料藥精製麪易爲效也一切頭疼不問內外所因並宜服之　兼治中脘痰飲停積及療脾胃飲食所傷溫中快膈尤得其宜　偏正頭疼茶湯下久久服之不復再發

局方如聖餅子

治男子婦人氣血上盛下虛痰飲停積風寒伏留

陽經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目眩耳聾常服

清頭目消風化痰煖胃

川烏去皮 南星先 乾姜各二兩 甘草

川芎各二兩 天麻 防風 半夏各半兩泡

右細末湯浸蒸餅丸如鷄頭大捻作餅子曬乾每服五餅同荆芥三五穗細嚼茶酒任下熟水亦得無時服之

化風丹

治中風涎盛胞膈不快頭重目不開或目睛上視一切諸病

烏蛇一兩生去骨 白附子一兩炮 南星一兩 箇重

朱砂一兩 姜蚕一兩 麝香半錢 雄黄二錢 腦子一字

右蛇附星蚕為細末另入麝香朱砂等肆物細末再擬匀煉蜜丸鷄頭大酒化下如牙關緊急不開以蒜一大瓣搗為泥塗在兩牙關外豆淋酒化下謝藥擦牙自開更服二錢效如神

治患後轉瀉腹脹如鼓蝎氣散

全蝎焙炙研 麝香少許

右細末每服二錢七米飲調下甚者再服必愈

治傷寒將欲者

川烏生 南星 半夏 天麻生去蘆各等分

右為細末每服一錢煎豆淋酒下稍温服次用一二盞投之若若牙関噤斡嚾之但灌得下無不活者

烏荆丸

川烏一兩炮去尖 荆芥穗二兩

右為細末醋丸桐子大每服二十丸温酒送下熱水亦得有病日食三無病日一服此藥腸風尤妙

化水丹

川烏 附子炮 乾姜炮 赤石脂

蜀椒 桂各等分

右蜜丸桐子大每早服三丸夜三丸温酒下

老君神明散 溫疫

白朮二兩 桔梗二兩 細辛一兩 附子炮去皮臍二兩

川烏炮去皮臍四兩

右五味為麄末縫絹囊貯盛帶之居閭里皆無

若有疫疾溫酒服方寸匕覆取汗得吐即差若欲
三四日抄方寸匕以水二碗煮令大沸去滓二服

換骨丹

佳人稱換骨
槐蔓蒼桑香　威人防何苦　十味麝牛麻
右製度並見廣濟宣明方
拯濟換骨丹（每藏[illegible]不宜服前子家已重發汗也）
槐皮苦木並　仙人防首蔓　十味各停勻
苦味香減半　龍麝即少許　朱砂作衣纏

麻黃骨煎丸　大小如指彈
治半身不遂口眼喎邪手足不仁言語蹇澀或骨痛連髓或痺襲皮膚或中急風涎潮不言精神昏迷行步艱難筋脈拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之
槐莢子　人參　桑白皮　蒼朮　白芷
何首烏　蔓荊子　威靈仙　防風（各二兩）
五味子　苦參　香附子（各一兩）　麝香（二錢另研）
龍腦（二錢）　川芎（[illegible]）

右十四味為細末入臂香令勻又用麻黃十斤去根節用天河水三石熬至六升去查再煎至二升半入銀石器內熬成膏入前藥和勻杵五千下每兩作十丸朱砂為衣每服一丸搗碎酒一盞自晨浸至晚食後飽得卧微攪之神清無睏是藥之驗再服須臾五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重亡津液也若風盛之人當於密室中溫卧取汗稍避若風實者至寶丹之類風虛者靈寶之類

局方大已寒丸　易簡大已寒丸同
治久寒積冷腑臟虛弱心腹㽲痛脅肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨盛手足厥冷傷寒陰盛神昏脈短四肢怠惰並宜服之
乾姜（四兩）　高良姜（四兩）　桂（四兩）　蓽撥（四兩）
每服五十丸米飲下此藥熱燥能治臟腑虛寒滑而下利反泄寫腸鳴水穀不化若心腹㽲痛中脘停寒大溏泄者尤宜服之

大已寒丸

吳茱萸 官桂 乾姜 良姜 烏頭 附子

一法加芎藭 一法加茴香引陽氣下行不傷

眼目

右爲細末醋糊丸亦得桐子大每服三五十丸米

飲下空心食前日二服無所忌

吳茱萸丸

治下痢臟腑不調脹滿腹痛水穀不化怠惰嗜臥

時時下痢

吳茱萸一兩半湯洗炒 神麯五兩炒 白朮四兩

桂去皮 乾姜二兩半炮 川椒去目炒

右細末糊丸桐子大米飲湯下十五丸至二十丸

食前上證乃陰濕勝也

小吳茱萸丸

吳茱萸湯洗焙乾 良姜二兩 乾姜三兩炮

右醋糊丸桐子大每服三五十丸米飲下

快活丸

治痰痞嘔吐不愈腹脹大便不通秘者陰燥勝也

吳茱萸洗 木香各一兩 良姜 乾姜炮

[illegible] 陳皮一兩

右酒煮神麯末作糊丸桐子大姜湯下十五丸至

二十丸無時陳皮湯亦得

艾煎丸 治男子婦人寒帶下

艾葉四兩醋炒 大椒 赤石脂 乾姜

川烏炮去皮 生硫黃已上各一兩

右糊丸桐子大每服二三十丸艾湯鹽湯任下

艾煎丸 治婦人久病氣虛血弱

蒼朮四兩製 當歸二兩酒浸焙 小椒半兩炒

右細末好醋一十斤艾葉一斤浸一宿砂鍋慢火

熬至五升去滓再入鍋內熬出膏子同和前藥丸

桐子大每服三四十丸溫醋湯下食前炒陳艾上

餘藥共爲末糊丸亦可

宣氣湯

吳茱萸半兩焙 桂二錢 半夏湯洗

右㕮咀每服伍錢生姜五片水一盞半煎六分去

查溫服

奔氣湯

吳茱萸 人參 生薑 棗

右於吳茱萸湯中去棗加半夏桂心甘草亦名奔氣湯

小七氣湯見見大全

戊己丸

吳茱萸 白芍藥 黃連各等分

右三味同炒微黃放冷為末糊丸米飲下三十丸食前

小巳寒丸一名巳寒丸

治脾胃積冷中寒洞泄倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃見附後甚驗

艾葉一兩 蒼朮一兩 陳皮二兩 吳茱萸二兩炒

右件用米醋二升浸一宿漉出暴乾再於原浸藥醋內拌和勻炒令紫色焙乾為末稀糊丸桐子大每服三十丸溫酒鹽湯醋湯下空心食前

烏頭例

張鐵礶煎烏頭蒼朮法

右白川烏去黑皮用白心微炒蒼朮泔浸炒黃為細

本方缺

移刺相公神仙保命金丹

治男子丹田衰弱五臟虛損血少氣微肌瘦面塵手足顫掉目視茫茫迎風出淚耳鳴旋運筋骨無力春秋發嗽痰涎喘滿悶腰膝疼痛脚上瘾疹難坐立夜多盜汗四肢怠惰陽事不強精消無子悉宜服此丹

草烏頭四兩秋收黑色者去皮臍

金鈴子一兩去皮 破故紙二兩一宿 茴香一兩炒香

右細末酒糊丸桐子大每服三二十丸空心溫酒下婦人醋湯下服數日所病即效痼寒久利尤宜服婦人血冷月事不調赤白絕孕面黑焦乾髮退不生瘦悴白汗每服三十丸熱醋湯下久服補益男子無風中卒病此藥性溫無毒保全天壽

佐經丸

草烏去皮 當歸 乳香 沒藥 自然銅醋淬

斑猫去翅足 大鼈子 地龍去土各等分

前少陰為風條下有治白癜龍蛇散內有二佐經

前少陰屬風條下有治白癜龍蛇散內有二佐經
丸味後方少膠五靈脂
右各碾爲末糊丸雞頭大打碎溫酒磨化隨病上下
服藥後飲好三二盞
佐經丸
草烏頭　白膠　木鼈　五靈脂各一兩半
當歸一兩　斑猫去頭足翅糯米炒
玉桂枝
天麻七兩　骨碎補十兩　草烏四兩　甘松
川烏　白附子　半夏各半兩　地龍去土一兩
黃芩　松香　五靈脂　錫蔺脂各半兩
自然銅二兩半醋淬七次　南星　茯苓　川芎
破故紙各半兩　糯米半升炒
右細末酒糊丸桐子大每服五丸溫酒下
張守道傳化張狄罹方治男子陽精不足女子赤白滯久
牡蠣煅一斤　赤伏子一斗　草烏頭半斤焙
右爲末酒糊丸桐子大每服二三十丸溫酒下塩
湯亦得一法張守道加蒼朮一斤不去皮炒黃與

上同爲末丸
安宜之傳到筋骨藥
川烏頭　澤瀉　五靈脂　地龍去土
蘿蔔子上各一兩　蒼朮二兩　川當歸
赤芍藥各一兩　木鼈子去皮一兩　沒藥
乳香各三錢
右細末醋糊丸桐子大自然銅爲衣每服十丸食
前溫酒服
朱砂劑
玉倪丹補心益腎上下通主升降以至丹田爲救之飲也
丹砂二十八兩　甘草　遠志去心　檳榔一兩
訶梨勒皮一兩　桂去皮八兩
右每食前服一丸日三食計服三丸溫人參湯下
海藏老人云此砂煉成亦可與大補丸五臟隨藥合
和用之或全用五臟藥和丸亦可大補丸在火陽條前方五
補丸　後
遣丹砂法
右甘草等十四味剉水二大斗釜中以細布袋盛丹

研成投釜中着水和藥煮之　第一日兼夜用湯火致動　第二日兼夜湯火魚眼沸　第三日兼夜木火花沫沸　第四日兼夜炎火洄洄沸　第五日兼夜土火微微沸　第六日兼夜金火沸愈緩作急　第七日兼夜水火沸緩緩調調　先期泥二釜一釜常煖水用添煮藥釜中水減即添煖水常令不減二斗七日滿即出丹砂於銀器合中盛其合內先布桂一兩勻即與桂布朱砂又以金桂一兩覆足即下合置甑中先布糯米厚二寸乃置合又以糯米覆培之亦令厚三寸許桑柴火蒸之每五日換米桂其甑蔽一日以行竹子爲之不兩側開一小孔常煖水同竹筒注添釜中勿令水減第一五日兼夜用如春火如常炊飯第二五日兼夜用夏火猛如炊飯第三五日兼夜用秋火如炊飯乍緩乍急第四五日兼夜用冬火煖如炊飯依五行相生文武助之藥即成出丹砂以五椎鉢碾之如賦粉即可用服之煎楮實搜和桐子大每日食前服一丸人參湯下每日三服食煎計之棟

成丹砂稱四兩爲一劑二年服盡復服每十年即煉三兩仍取正月一日取服一月使盡既盡酒服十年一二兩不令旋合宜須煉一劑

造楮實煎法

六月六日收取楮實熟者搗絞取汁於銀器內慢火熬成膏搜和前藥末爲劑丸

小硃砂丸

硃砂五錢　牙硝二兩枯　寒水石五錢煅　麝香一字

鵬砂一字　梅腦半錢　甘草半錢汁熬膏

右碾勻用甘草膏和每兩作一十九每噙化一丸

小兒夜驚啼薄荷水化下

朱砂寒熱溫涼各有加減例

寒大黃　巴豆　牛黃　黃連　黃柏

熱附子　巴豆　烏頭　南星　半夏

朱砂散

治小兒神亂驚悸睡臥不安大便不利譫語齒瘡痰嗽

辰砂七錢　桔梗五兩　人參　蛤粉　牙硝各二兩

甘草二兩半　腦子二錢　金箔二十片

右細末一歲兒半錢薄荷湯調下未滿百日兒發熱多睡不安大便不利蜜湯調下一字大人小兒口瘡咽喉少許摻咽膈熱新水調臨卧

鶴頂丹

治大人小兒風痰不利煩渴不安中暑頭痛不解

麝香二錢半　朱砂半兩　牙硝十二兩半枯

寒水石一十兩燒　甘草二兩半炒

右細末煉蜜丸龍眼大大人一丸安湯化下中暑腦子新水下小兒心經熱薄荷汁化下

鎮心丸　金箔鎮心丸　安神丸

驪珠丹

麥門冬　牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石　甘草各一兩　朱砂一兩　龍腦一字

已上數藥泄于太陰大人絳宮下至丹田

前八味加　人參　生地黃　沉香

各為細末入藥為東垣先生驪珠丹法例詳說見兒難知一名石龍散

石龍散

寒水石　腦子　朱砂

抱龍丸　化毒丹　大青丸　並見錢氏

牛黃膏治驚化痰涼膈鎮心祛邪熱止涎嗽

人參二錢　甘草半錢　牙硝一錢　雄黃一錢七

朱砂一錢　蛤粉一兩　生龍腦半錢　金銀箔十片

右為細末煉蜜為丸搜和每兩秤作二十丸以金銀箔為衣一錢兒一丸服茶豆大薄荷湯化下量歲數臨時加減服之食後

虎睛丸治小兒驚風壯熱風痰邪熱

天麻　防風　人參　乾蝎各一兩　白殭蠶半兩

朱砂　雄黃各半　牛黃　麝香各一字

甘草一錢

右末蜜丸如桐子大每服一二丸薄荷湯下

御方活命金丹見本條主治在

烏犀　牛黃　真珠　薄荷各半兩　金箔一兩

牙硝　貫眾　甘草　板藍根　乾葛

官桂各一　片腦　麝香　青黛各三錢

人黄牛一兩　蒸餅末三錢
煉蜜丸每兩作十丸金箔爲衣

五福化毒丹 主治並見錢氏

苦參　桔梗　茯苓　人參　牙硝　青黛
甘草　麝香

右爲細末蜜丸雞頭大薄荷湯下斑疹毒氣生地
黄汁化下有日夜不見物陳米泔化下

金箔鎮心丸

紫河車　人參　茯苓　山藥　甘草
朱砂　龍腦　麝香　牙硝　金箔 等分

右爲細末蜜丸桐子大薄荷湯下

定風丹

治大風癩疾鼻崩眉髮脫落遍身疙瘩或瘡疥
等

升麻　細辛根　川芎　穿山甲 炙　天麻
防風　定風草　白附子　丹參　人參
苦參　玄參　紫參　蔓荆子　威靈仙 各等兩
蜈蚣 一對酥炙　何首烏 米泔中浸末二兩

右細末每二兩用胡麻一升淘淨炒香爲末和勻
蜜丸彈子大每用一丸細嚼溫漿水下日三初服
時或嘔吐勿怪甚亦不吐

紫菀丸 治五種風癩之疾

紫團參　人參　沙參　玄參　檳榔　黄連
川芎　山梔子　海桐皮　紫菀　防風
赤芍藥　羌活　赤茯苓　生地黄　天仙子
地骨皮　白蒺藜　天麻　乳香 各等分

右二十味細末蜜丸桐子大每服三十丸清米湯
下日三忌動風發氣物

脫蛻丸

治癩風遍身臟血及諸惡瘡疥癬等經云厲風成
癩

苦丁香　白丁香 等分　皂莢 去皮弦子熬成膏

右與上藥末爲丸桐子大先十丸至十五漸至二
十丸溫水下疾退爲止不可使多恐致惡心從少
至多乃其法

治風疾癩病遍身生瘡者

天麻半七錢 荊芥半二錢 薄荷半三錢

白花蛇四兩酒浸

右四物爲細末好酒二升蜜四兩石器中熬成膏子每服一盞溫服日三兩餅壓下急於暖處令汗出見效

神仙經進透骨膏

治大風疾遍身生瘡變成頑麻不痛不痒眉髮脫落鼻梁崩塌目斷白仁

海金沙 草烏頭 綠礬 旋花 九松

盆硝 膽礬 鵝管石 朱砂 雄黃

磁石 杏仁 黃蠟 雌黃 蓖麻

砒霜 硇砂 木賊 木鱉子二十個

寒水石 僧祇黃 斑貓 巴豆二十

川烏頭 石燕子 蛤粉 天仙子

黃松脂 粉霜 乳香 麝香

硫黃 小油 膩粉

右將剉細末油勻和新埕瓶子一箇埋于地下正用新瓦瓶子一隻于地上鑽數十孔鹽泥固濟盛藥在內用碗一隻合定亦固濟勿令透烟坐在白瓶子口上穩放木炭火八秤看緊慢燒灰盡爲度其藥滴在白瓶子內孩兒胎髮一塊細剪粲內攪勻入後藥信霜雄黃僧祇黃粉霜輕粉乳麝等細不燒數

淋洗藥

何首烏 荊芥 防風 馬鞭草 蔓荊子

右麄末二兩水二斗煎十數沸得藥力無風處淋洗後塗前藥

神效膏

當歸半兩 杏仁半兩 木鱉子半兩 好油一斤

黃丹二兩 油髮二兩 乳香 苦參二錢

沒藥一錢 人參二錢

右除丹外剉細油煮褐色與丹一處熬成膏塗病處

生眉散

桑寄生 天南星 半夏 沒藥

右各一錢爲細末生薑自然汁調成膏子先用自

然銅搽過次以膏塗之
又治鼻梁崩塌喘息不快者
雄黃 黃連 没藥 川芎 盆硝各一兩
腦子半錢 麝香一字
右細末搐之日三次
如聖散 渫洗藥
頑荆一兩 蔓荆子四兩 威靈仙四兩 白芷四兩
苦參二兩 厚朴二兩 荆芥二兩 紫參二兩
陳皮 沙參 防風四兩 麻黃二兩
右麁末每用藥末一兩水一桶葱柳枝同一處煎
五七沸避風淋洗
還魂丹 治中風不語涎潮不省人事癱瘓左癱右瘓
天麻 川芎 防風 乾山藥 羌活各二兩
姜蚕炒 犀角 細辛各半兩 當歸 白附子
甘草 藿香葉 人參各一兩 全蝎四十九個
右爲細末蜜丸櫻桃大每用一丸細嚼酒下
化風丹
治中風涎多胞膈不利日瞑不開睛上視一切諸

風
烏蛇半去骨 白附炮各一兩 南星一兩炮 龍
姜蚕二兩 麝香半錢 硃砂三錢 雄黃一錢
龍腦一字
右前四味爲細末入麝香等再碾令勻煉蜜丸鷄
頭大用水酒化下如牙關緊急不開以大蒜一大
瓣杵爲泥塗兩牙關外亙淋酒化下一丸藥搽
牙自開更服藥二丸神效
局方樺皮散 並見本方
文潞公療癖癥外臺方
生地黃 淡竹瀝 荆瀝各一兩 防風四分
獨活八分 附子一枚炮
右㕮咀三升煮取二升去查空心分四服或五服
隔日一劑若虚者三日一劑可絕根本
聖餅子
草烏 川芎 細辛 白芷 荆芥 蒼术
防風 甘草各等分
右生用細末糊丸桐子大捻作餅細嚼茶清下加

羌活獨活爲十生餅子

斗門方

治中風口面喎斜用　灰向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候方正如舊即須以水洗下大效

聖惠方治中風口喎

以巴豆七箇去皮爛研如左喎塗右手心如右喎塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾便正洗去藥頻抽掣中指

活人脚氣木瓜散例

木瓜散

大腹子一箇　紫蘇去一錢　乾木瓜　甘草炙

木香各一　羌活半錢

右剉散分作三服每服用水一盞煎至半盞通口服

脚氣木瓜丸

木瓜大者二箇切作片去心　菊花一兩　青鹽二兩

右內藥木瓜中合定線繫甑蒸爛研成膏子丸桐子大每服五十丸空心酒下日三病甚者百丸病處有香汗出爲效

四斤丸

治風寒濕合而成痺脚腫痛或不仁及諸證脚氣

牛膝去蘆　天麻去蘆

右㕮咀好酒五升浸三日取出焙乾爲細末以浸藥酒煮糊丸桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

香附子散　已下總血病例

治血崩不止面色黃血刺疼痛不可忍小產血不止一名倍金

香附子不以多少炒去毛擣碎再炒黃

右極細末每服三五錢好酒調下能破血積米飲調下能止血冷氣薑湯下帶下艾湯下醋少許婦人一切心腹諸疾並治之粥飲下許學士治婦人血氣不調有積血者能破之若血崩者能止之

立應散治心腹急痛

香附子一兩半　良姜

右細末每用二錢七沸湯點服立効

治血崩臍腹痛

當歸 木賊去節 香附子 熟地黄 赤芍藥

牡丹皮各二兩 没藥 丁香 桂各三錢

右細末酒調三錢溫服

立効散 治婦人臍腹痛

香附子二兩炒 當歸一兩 赤芍藥半兩 良姜半兩

五靈脂半兩

右細末三錢酒一盞童子小便少許同煎服

香附子例 寒則加乾姜 熱則加黄芩

立應散

香附 棕皮

右爲細末每五錢酒半盞童子小便半盞煎至七

分溫服無時如腸風不用童便用酒一盞煎至八

分服

霹靂散 治經脈

香附子二兩 川芎一兩 石灰一兩

右細末燒秤錘淬酒調服二錢七甜酒亦得

定血散

治婦人血海崩漏小産血不止

烏梅燒存性 棕布 甘草

右爲細末每服二三錢淡醋湯調服立止

靈苑内補丸

溫中調血治婦人久病血崩不止累醫不効宜此

立驗

黄連 山茱萸 乾姜 當歸 鱉甲

芫花 白芷 乾漆 川烏頭去皮

味子

巴豆 桃仁去皮 亂髮 各

已上十二味同入一瓶子内用泥固濟頂上留一

眼子火煅候白烟出急取放冷取細碾

官桂一分 陳橘皮一分 芸臺子一分

右四味爲細末同前碾藥都作一處拌合再研令

勻煉蜜爲丸桐子大每服一丸臨卧溫酒下久患

甚者不過四服

又方

巴豆 莪茂 硇砂 白芷

檳榔(燒熟與黃蘗厚) 乾漆(炒煙微盡) 當歸頭
大黃(蒸) 乾姜(炒製各等分)
又方
木香 檳榔 縮砂仁 神麯(炒) 麥蘗(炒)
訶子(麺裹煨) 當歸 乾漆(炒煙盡) 金絲水蛭(少入中火去黑蟲盡炒微焦赤)
交感丸
茯苓(四兩) 香附子(一斤炒黃)
右細末煉蜜丸彈子大每服一丸

降氣湯
茯神(二兩) 香附子(半斤炒) 甘草(一兩半)
右細末點服
又方
香附子(五兩生姜三兩十斤淹二兩炒存性細末) 青鹽(一錢)
右同為細末擦牙
孫思邈九竅血出方
荊葉擣取汁酒和服之
小烏沉湯(當在崩漏宜湯後)

香附子(一兩) 烏藥(一兩) 甘草(一兩半生)
右細末鹽少許湯點服
千金白堊丸(在崩漏湯後存物)
螵蛸散(治血崩漏下久不止臍腹疼痛)
烏魚骨燒存性細末二兩煎木賊湯調下
又方
蚕退紙(燒灰一兩) 木賊(燒灰一兩) 寒水石(燒一分)
黑附子(炮半斤) 白礬(枯半兩) 烏魚骨(炙兩)
右為細末水一盞煎四五沸食前和滓服効

又方
龍骨 蒲黃(各半兩) 艾葉 附子(炮二錢半)
當歸(七錢)
右為細末水煎二錢
又方
當歸 川芎 黃芩 芍藥(等分)
右麄末水煎
桂燒灰酒調下立愈
五靈脂末炒出烟盡當歸酒煎如血室乾醋煎和

濟陰究一心
血崩如流防風炙焦為末每二錢白麪半錢酒調
下晝夜不止者丁香二兩酒煮服之
又黃芩粗末水煎
右並治血崩如流藥異不一隨經可擇是為知本
地榆條唐本注云出孔氏音義五帶十二病
一曰多赤　二曰多白　三曰水不通
四曰陰蝕　五曰子藏堅　六曰子門闢
七曰合陰陽患痛　八曰小腹寒
九曰子門閉　十曰子宮冷
十一曰夢與鬼交　十二曰五臟不定
作葉飲代茶甚解
不成為無積不成痢大腸泄者小便少濕在
小腸有敗血久有積滯崩漏不已隨帶而下
大便燥結濕在前也濕在後當利小便濕在前當
利大便此其法也
或因胎產而得或因酒色而得山崩海獄前後脫失
血漏不已元由子藏侵入赤腸澤液惡穢前行大

穢淫糞燥結後滯不通此胎腸俱病治宜推去敗
血臟積蓄血而致新也心所不生脾所不果肝所
不藏此三焦經絕也崩雖為病亦有淺深新久治
從而輕重之
張仲景云三焦絕經是為血崩又經云血得熱而妄
行又云血結前後血得之年少時有所大得脫血
醉後入房氣竭肝傷久久成血閉署界於此皆有
熱也脈或洪大而有力或能食不能食漏下不止
或陰中如有瘡蝕或大便難因而暴下或漏之而
不定內外俱治慎勿遺一
五微脈主敗血面無色欲曰微欲下尋之有
微澁之敗血小腸虛漏中日久為白帶漏下多
脈骨脈枯此脈有滿之類若之脈皆血病也此皆
陰脈而為冷談寒熱即分藥不可執一所以有逆
藥生地黃四物裝丹芍藥續斷縮砂香附烏賊魚
並乾姜之分也明者其擇之
產寶方 療崩中不止不問年深月遠
槐木耳燒灰為末酒服方寸七

簡要方治婦人漏下血不絕

槐花蕚不以多少燒灰細研食前溫服一錢七

正經云治婦人乳癰子藏急痛

槐實以七月七日取入搗取汁銅盃内盛之日煎令可丸大如鼠矢内竅中三易愈又上隂脆

千金方治婦人無故尿血

龍骨二兩以酒調服方寸七空心日三

又方治崩中晝夜不止

芎藭八兩以酒五斤煎取二升半分三服徐徐飲

又方治妊婦忽然倒地舉重促搶腹中不安及子死

用芎生末酒服方寸七須臾一二服出

治崩中

防風去蘆頭炙赤色爲末毎服二錢以麫糊酒調下更以麫糊酒投之

治婦人經血不止

五靈脂末炒令過熟出盡烟毎服五六錢當歸二片酒一盞與藥同煎至六分去滓溫服連三五服效

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五靈脂二兩五錢一半生用一半熟炒

右爲細末毎服一錢溫熟水調下如口噤者以物斡開灌之入喉即愈謂之獨勝散

又治血崩不止

五靈脂十兩

右爲細末水五盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麹末二兩和丸桐子大毎服二十丸空心溫酒下便止

貞元廣利方治婦人血崩年深久不差

白芍藥二兩　乾姜半兩

右細剉炒令黃搗羅細空腹利飲汁服之二錢七

治婦人本臟虛損元氣衰敗崩中漏下經歲不止服諸藥不效極甚者宜服此藥

龍骨煅一兩　蒲黃一兩　艾葉二兩　當歸半兩

五靈脂去砂半兩炒　黑附子炮去皮半兩　香附子炒紫色半兩

右件同爲末水一盞半藥秤三錢同煎至六分去
滓食前空心日三病輕者二服重者一料

雷氏方治婦人遠年近日脅不足血崩或血氣不止

木賊一兩　香附子一兩　朴硝半兩

右三味爲細末色黑者好酒一盞煎三五沸和滓
溫服色紅赤者水一盞煎至七分和滓溫服忌生
冷硬猪魚肉雜物每服三錢空心每日二如臍下
作痛乳香沒藥當歸各一錢剉細入上藥一處同
煎不痛勿用

論傷寒雜病分二科

海藏云世之治傷寒有法療雜病有方是則是矣然
猶未也吾謂治雜病亦有法療傷寒亦有方方即
法也法即方也豈有異乎要當全識部分經絡表
裏臟腑並有二哉以其後世才智之不及古也所
以分傷寒雜證爲二門故有長於此而於彼者亦
有長於彼而短於此者逮朱開明康取士分科爲此
宜乎愈學而愈陋愈專而愈粗也試以傷寒雜病
二科論之傷寒從外而之內者法當先治外而後
治內雜病從內而之外者法當先治內而後治外
至于中外不相及則治主病其方法一也亦何必
分之爲二哉大抵雜病之外不離乎表傷寒之內
不離乎裏表則汗裏則下中則和不易之法也劑
之寒熱溫涼在其中矣餘風痓二條目疾瘡瘍小
兒等科各自專門無怪其工之陋且粗也是以知
証不知脉知藥不知性是皆豈知而全識者哉耳
熱目欲習壞多狩淡久誤合則病愈非則不疾甚
所常見所常聞者粗有曉會其所未常見未常聞
則有所不知也此繼述而不及於物者遠矣嗚呼
天之所錫其智識有限量故邪哉庸夫以衣食
道以口舌爭視學業如讐隙始忌爲能斡誤人性
命恬不知愧甘爲忍夫不顧道理甚哉之有庶失
邪時世之所有俾邪抑疾者之不幸而有所自致
邪處者後嘆而書

是書已成於辛卯至丁酉春爲人陰取之元藁
巳絕更無餘本寻職州庠杜門養拙蘿塩之暇
無可用心想像始終十得七八試書首尾僅得

復元猶遺一二尚未之備故今日得而今日錄明日得而明日書待以歲月久則方成無欲速無忌心也好古再題

醫壘元戎卷第十二

重刻醫壘元戎後跋

予方垂髫時即病脾復病肺肌消骨立兀不抜卒賴醫藥起故苦心醫家肯蓋歷多年于茲矣噫醫豈易言哉醫家者言代有人人有發明其言何啻千百種若古本草素難脉經諸書皆出先聖賢手流世久遠不無舛逸人猶病之至張仲景氏劉守真氏李東垣朱丹谿氏益有著述傑然一家名言碩人指之曰某主外感某主内傷某專傷寒某專雜症嗟夫醫之道如是乎彼諸名子者俱擅其術以鳴于世

詎肯偏持一說以悞人而亦安能以一偏之說攻人諸疾取效若桴鼓第中不無所特異而詳言之者謂發前人所未發耳然或偶有所遺人遂病之夫亦諸君子未及為大道之說之過歟人安得而不病之也姑就仲景傷寒書用之以治雜症亦輒應此何以故歟理可概見已而迨今猶號之曰傷寒書大都傷寒雜症原無異理總屬之十二經絡中而外感內傷則十二經絡中所受病根源也歧而二之者非也王好古氏所著醫壘元戎

實祖仲景旨而兼收雜症治法分隸陰陽六經如提綱張目一見瞭然真醫家獨步矣予向慕其書而未及覩一旦予同官四明屠君出其藏本示之乃書刻于嘉靖癸卯年吾姚秋山顧先生序其端更今幾數十載板遂脫落不完而舊梓中訛錯亂次大失其真予見之既喜且懼喜其書在足藉以拯諸君子之偏因念此書不傳將夭折罔類而傳非其故即生殺以之予用是惴惴懼耳輒自忘其淺陋於公餘之暇細加考訂缺者補訛者

正失次者序之即一字一畫靡
不釐而歸于初乃因屠君請之
督鹺直指綦公獲命允後請言
冠諸篇首用昭嘉惠廼付之梓
其剞劂之費則三原王君爾義
捐居半而江都武令君助之若
首事及後事諸費則屠君與予
任之矣刻告成復加磨
經國堂之别藏以垂
萬曆歲癸巳冬兩淮都
使司副使浙姚嚴昌世拜
于簡末

湯液本草六卷

（元）王好古撰

明刻東垣十書本

湯液本草三卷、江蘇巡撫採進本

元王好古撰。曰湯液者、取漢志湯液經方義也。上卷載東垣藥類法象用藥心法附以五宜五傷七方十劑。中下二卷以本草諸藥配合三陽三陰十二經絡、仍以主病者爲首臣佐使應次之。每藥之下、先氣次味次入某經。所謂象云者、藥類法象也。心云者、用藥心法也。珍云者、潔古珍珠囊也。其餘各家雖有採輯、然好古受業於潔古、而講肄於東垣、故於二家用藥尤多徵引焉。考本草藥味不過三品、三百六十五名。陶宏景別錄以下、遞有增加、往往有名未用。即本經所云主治、亦或古今性異、不盡可從。如黃連今惟用以清火解毒、而經云厚腸胃、醫家有敢遵之者哉。好古此書所列、皆從名醫試驗而來。雖爲數無多、而條例分明、簡而有要。亦可云適乎實用之書矣。

湯液本草序

世皆知素問爲醫之祖。而不知軒岐之書實出於神農本草也。殷伊尹用本草爲湯液。漢仲景廣湯液爲大法。此醫家之正學。雖後世之明哲有作。皆不越此。予集是書。復以本草正條各從三陰三陽十二經爲例。仍以主病者爲元首臣

佐使。應次之。不必如編類者先玉石。次草木。次蟲魚。以上中下三品爲門也。如太陽經當用桂枝湯麻黄湯。必以麻黄桂枝爲主。本方中餘藥後附之。如陽明經當用白虎湯。必以石膏爲主。本方中餘藥後附之。如少陽經當用三禁湯。必以柴胡爲主。本方中餘藥

後附之如太陰少陰厥陰之経所用藥皆做諸此至于金匱祖方湯液外定為常制凡可用者皆襍附之或以傷寒之劑改治雜病或以權宜之料更療常疾以湯為散以散為圓變易百端増一二味別作他名減一二味另為殊法醫壘元戎陰證略例癍論萃英錢氏補遺等書安樂之法湯液本草統之其源出於潔古老人珍珠囊也其間議論出新意於法度之中註奇辟于理趣之外見聞一得久弊全更不特藥品之咸精抑亦疾病之不悞夭横不至壽域可期其湯液本草歟時戊戌夏六月海藏王好古書

好古

湯液本草序

神農嘗百草立九候以正陰陽之變化以救性命之昏札以爲萬世法既簡且要殷之伊尹宗之倍于神農得立法之要則不害爲湯液漢張仲景廣之又倍于伊尹得立法之要則不害爲確論金域潔古老人派之又倍于仲景而亦得立法之要則不害爲奇

注潔古倍于仲景無以異仲景之倍于伊尹仲景之倍于伊尹無以異伊尹之倍于神農也噫宗之廣之派之雖多寡之不同其所以得立法之要則一也觀潔古之說則知仲景之言觀仲景之言則知伊尹之意皆不出于神農矣所以爲萬世學汲湯液諸儒之註註釋而已閱一而多矣噫蓋已

明理爲術，而自大復古，歷算涵
蓋雜而不考。漢仲景爲最爲
能守之祖，是仲景亦傳其之
法，傳其本神，以發之于醫，帙之
中，特爲精細，參以古法，而微

亂來，實失其旨，以此而文滋弊
業準之者，惟仲景爲宗，可存其方之
祖，而胥唐宋以來為醫之名
者，如王叔和、葛洪、孫思邈、范
汪、胡洽、朱半深、王翰年、米仲

陽、成無己、陳無擇、劉筆。至潔古
方定增減，業易手狀，第能無
之，竟不出乎仲景範圍，識者
有能識，有獨出心人，張元素
遇至人傳之，理方為傳之妙法，朗

是其子，雲岐子、張璧、東垣先生、
李杲明之，出祖長沙張仲景
湯液，悟其奧，就有志安學宗
業于東垣，學人不能以色，而今
在今日，古錯互好各出

湯液本草目錄

卷一
五臟苦欲補瀉藥味
臟腑瀉火藥
○東垣先生藥類法象
用藥法象
藥性要旨
氣味厚薄寒熱陰陽升降圖
升降者天地之氣交
用藥升降浮沈補瀉法

五味所用
藥類法象
標本陰陽論
五方之正氣味 制方用藥附
卷二
○東垣先生用藥心法
隨證治病藥品
用藥凡例

東垣報使
諸經嚮導
製方之法
用藥各定分兩
用藥酒洗曝乾
用藥根梢身例
用圓散藥例
升合分兩
君臣佐使法
治法綱要

藥味專精
湯液煎造
古人服藥活法
古人服藥有法
察病輕重
○海藏老人湯液本草
五宜
五傷

五走
服藥可愼
論藥所主
天地生物有厚薄堪用不堪用
氣味生成流布
七方
十劑

卷三 草部
防風 升麻 羌活

獨活 柴胡 葛根
威靈仙 細辛 白芷
川芎 麻黄 藁本
桔梗 鼠黏子 秦艽
天麻 黑附子 烏頭
縮砂 蓽澄茄 蓽撥
香附子 草豆蔻 白豆蔻
延胡索 茴香 紅藍花
良薑 黄芪 蒼朮

白朮 當歸 芍藥
熟地黄 生地黄 山藥
麻仁 薏苡仁 甘草
白前 白薇 前胡

卷四 草部
木香 知母 貝母
黄芩 黄連 大黄
連翹 連軺 人參
沙參 半夏 五味子

甘遂 大戟 蕘花
海藻 商陸根 旋覆花
澤瀉 紅豆 肉豆蔻
甘松 蜀漆 蒲黄
天門冬 麥門冬 萎蕤
茵蔯蒿 艾葉 白頭翁
百合 蓯蓉 玄參
款冬花 紫參 苦參
蘆根 射干 又名烏翣 敗醬

敗蒲　萆薢　防己
牽牛　三稜　蓬莪茂
草龍膽　瓜蔞根　地榆
紫草　茜根　薊花
葶藶　王不留行　通草
木通　瞿麥　車前子
石韋　白附子　胡盧巴
馬兜鈴　白芨　天南星
鬱金　佛耳草　蛇床

卷五 木部 果部

桂 桂心 肉桂 桂枝附　栢子仁　側栢葉
檗皮　槐實　槐花
蔓荊子　大腹子　酸棗
胡椒　川椒　吳茱萸
山茱萸　益智　厚朴
丁香　沉香　乳香
藿香　檀香　蘇合香
檳榔　梔子　黃蘗
枳實　枳殼　牡丹皮
地骨皮　猪苓　茯苓
茯神　烏藥　乾漆
皂莢　竹葉　竹茹
淡竹葉　茗苦茶　秦皮
桑白皮　梓白皮　紫葳 即凌霄花
訶黎勒　杜仲　琥珀
郁李仁　巴豆　芫花
蘇木　川楝子　金鈴子
沒藥　梧桐淚　桑東南根

已上木部

大棗　生棗　陳皮
青皮　桃仁　杏仁
烏梅　木瓜　甘李根白皮

已上果部

卷六 菜部 米穀部 玉石部 禽部 獸部 蟲部

荊芥穗　生薑　乾薑
薄荷　葱白　韭白

薤白　瓜蒂　冬葵子
蜀葵花　香薷　炊單布
已上菜部
粳米　赤小豆　黑大豆
大麥蘖　小麥　神麴
酒　苦酒一名醋一名醯　飴即膠飴
香豉
已上米穀部
石膏　滑石　朴硝

盆硝即芒硝　硝石　玄明粉
硫黃　雄黃　赤石脂
禹餘糧　代赭石　鉛丹
白粉　紫石英　伏龍肝
白礬　硃砂　硇砂
東流水　甘瀾水
已上玉石部
雞子黃
已上禽部

龍骨　麝香　牛黃
犀角　阿膠　猪膚
猪膽汁　獺肝　豭鼠糞
人尿
已上獸部
牡蠣　文蛤　蝱蟲
水蛭一名馬蜞子　䗪蟲　鼠婦
蜘蛛　蠐螬　蜜
蜣蜋　鱉甲　蛇蛻

蟬蛻　白殭蠶　斑猫
烏蛇　五靈脂　緋帛
已上蟲部

湯液本草目錄

湯液本草卷之一

元　古趙　海藏王好古進之甫集

明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫挍

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急。急食甘以緩之。甘草。欲散。急食辛以散之。川芎。以辛補之。細辛。以酸瀉之。芍藥。虛以生薑陳皮之類補之。經曰。虛則補其母。水能生木。腎乃肝之母。腎水也。苦以補腎。熟地黃黃蘗是也。如無他證。錢氏地黃丸主之。實則白芍藥瀉之。如無他證。錢氏瀉青丸主之。實則瀉其子。心乃肝之子。以肝草

瀉心。

心苦緩。急食酸以收之。五味子。欲軟。急食鹹以軟之。芒硝。以鹹補之。澤瀉。以甘瀉之。人參黃耆甘草。虛以炒鹽補之。虛則補其母。木能生火。肝乃心之母。肝木也。以生薑補肝。如無他證。錢氏安神丸主之。實則甘草瀉之。如無他證。錢氏方中。重則瀉心湯。輕則導赤散。

脾苦溼。急食苦以燥之。白朮。欲緩。急食甘以緩之。甘草。以甘補之。人參。以苦瀉之。黃連。虛則以甘草大棗之類補之。如無他證。錢氏益黃散主之。心乃脾之母。以炒鹽補心。實則以枳實瀉之。如無他證。以瀉黃散瀉之。肺乃脾之子。以桑白皮瀉肺。

肺苦氣上逆。急食苦以瀉之。訶子皮。一作黃芩。欲收。急食酸以收之。白芍藥。以辛瀉之。桑白皮。以酸補之。五味子。虛則五味子補之。如無他證。錢氏阿膠散補之。脾乃肺之母。以甘草補脾。實則桑白皮瀉之。如無他證。以瀉白散瀉之。腎乃肺之子。以澤瀉

瀉腎。

腎苦燥。急食辛以潤之。知母黃蘗。欲堅。急食苦以堅之。知母。以苦補之。黃蘗。以鹹瀉之。澤瀉。虛則熟地黃黃蘗補之。腎本無實。不可瀉。錢氏止有補腎地黃丸。無瀉腎之藥。肺乃腎之母。以五味子補肺。

以上五臟補瀉。內經臟氣法時論中備言之。欲究其精詳。看本論。

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火　木通瀉小腸火

黄芩瀉肺火 梔子佐之　黄芩瀉大腸火
柴胡瀉肝火 黄連佐之　柴胡瀉膽火 亦以黄連佐之
白芍藥瀉脾火　石膏瀉胃火
知母瀉腎火　黄蘗瀉膀胱火
柴胡瀉三焦火 黄芩佐之
以上諸藥各瀉其火不惟止能如此更有治病合為君合為臣處詳其所宜而用之勿執一也

○東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽
風寒暑溼燥火　三陰三陽上奉之
温涼寒熱四氣是也皆象於天温熱者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽
金木水火土　生長化收藏下應之
辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

味之薄者為陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也
味之厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也
氣之厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘温熱是也
氣之薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

○輕清成象 味薄茶之類　本乎天者親上
○重濁成形 味厚大黄之類　本乎地者親下
氣味辛甘發散為陽　酸苦湧泄為陰
○清陽發腠理　清之清者也
○清陽實四肢　清之濁者也

○濁陰歸六腑　濁之濁者也
○濁陰走五臟　濁之清者也

藥性要旨

○苦藥平升　○微寒平亦升
○甘辛藥平降　○甘寒瀉火
○苦寒瀉溼熱　○苦甘寒瀉血熱

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

茯苓淡。爲在天之陽也。陽當上行。何謂利水而泄下。經云。氣之薄者。乃陽中之陰。所以茯苓利水而泄下。然而泄下亦不利乎陽之體。故入手太陽。麻黄苦。爲在地之陰也。陰當下行。何謂發汗而升上。經云。味之薄者。乃陰中之陽。所以麻黄發汗而升上。然而升上亦不利乎陰之體。故入手太陰。附子氣之厚者。乃陽中之陽。故經云發熱。大黄味之厚者。乃陰中之陰。故經云泄下。粥淡爲陽中之陰。所以利小便。茶苦爲陰中之陽。所以清頭目。

用藥升降浮沈補瀉法

肝膽　味辛補酸瀉　氣溫補涼瀉　肝膽之經前後寒熱不同

逆順互換　入求責法

心小腸　味鹹補甘瀉　氣熱補寒瀉　三焦命門補瀉同

脾胃　味甘補苦瀉　氣溫涼寒熱補瀉各從其宜

逆從互換　入求責法

肺大腸　味酸補辛瀉　氣涼補溫瀉

腎膀胱　味苦補鹹瀉　氣寒補熱瀉

五臟更相平也。一臟不平。所勝平之。此之謂也。故云。安穀則昌。絶穀則亡。水去則榮散。穀消則衛亡。榮散衛亡。神無所居。又仲景云。水入于經。其血乃成。穀入于胃。脈道乃行。故血不可不養。衛不可不溫。血溫衛和。榮衛將行。常有天命矣。

五味所用

苦泄　甘緩　酸收　鹹軟　淡滲泄

辛散

藥類法象

風升生 味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

防風 純陽性溫味甘辛　升麻 氣平味微苦　柴胡 氣平味苦平

羌活 氣微溫味苦甘平　威靈仙 氣溫味苦　葛根 氣平味甘

獨活 氣微溫味苦甘平　細辛 氣溫味大辛　桔梗 氣微溫味甘辛

白芷 氣溫味大辛　藁本 氣溫味大辛　鼠粘子 氣平味辛

蔓荊子 氣清味辛　川芎 氣溫味辛　天麻 氣平味苦

秦艽 氣微溫味苦辛平　荊芥 氣溫味苦辛　麻黃 氣溫味甘苦

前胡 氣微寒味苦　薄荷 氣溫味苦辛

熱浮長 氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也

黑附子 氣熱味大辛　烏頭 氣熱味大辛　乾薑 氣熱味大辛

乾生薑 氣溫味辛　良薑 氣熱味辛本味甘辛　肉桂 氣熱味大辛

桂枝 氣熱味甘辛　草豆蔻 氣熱味大辛　丁香 氣溫味辛

厚朴 氣溫味辛　木香 氣熱味苦辛　益智 氣熱味大辛

白豆蔻 氣熱味大辛　川椒 氣熱溫味大辛　吳茱萸 氣熱味苦辛

茴香 氣平味辛　延胡索 氣溫味辛　縮砂 氣溫味辛

紅藍花 氣溫味辛　神麴 氣大煖味甘

濕化成 戊濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之○己土其本味鹹其兼味辛甘鹹苦在人以脾應之

黃耆 氣溫平味甘　人參 氣溫味甘　甘草 氣平味甘

當歸 氣溫味辛一作味甘　熟地黃 氣寒味苦　半夏 氣微寒味辛平

白朮 氣溫味甘　蒼朮 氣溫味甘　陳皮 氣溫味微苦

青皮 氣溫味辛　藿香 氣微溫味甘辛　檳榔 氣溫味辛

蓬莪朮 氣溫味苦辛　京三稜 氣平味苦　阿膠 氣微溫味甘辛

訶子 氣溫味苦　杏仁 氣溫味甘苦　大麥蘖 氣溫味鹹

桃仁 氣溫味甘苦　紫草 氣寒味苦　蘇木 氣平味甘鹹一作味酸

燥降收 氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒涼是也

茯苓 氣平味甘　澤瀉 氣平味甘　猪苓 氣寒味甘

滑石 氣寒味甘　瞿麥 氣寒味苦平　車前子 氣寒味甘

燈心草 氣平味甘　五味子 氣溫味酸　桑白皮 氣寒味苦酸

天門冬 氣寒味微苦　白芍藥 氣微寒味平　麥門冬 氣寒味微苦

犀角 氣寒味苦酸　烏梅 氣平味酸　牡丹皮 氣寒味苦

地骨皮 氣寒味苦　枳殼 氣寒味苦　琥珀 氣平味甘

連翹 氣平味苦　枳實 氣寒味苦酸　木通 氣平味甘

寒沉藏 味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹氣寒是也

大黃 氣寒味苦　黃蘗 氣寒味苦　黃芩 氣寒味苦

黃連 氣寒味苦　石膏 氣寒味辛　草龍膽 氣寒味大苦

生地黄 氣寒 味苦　知母 氣寒 味大辛　防巳 氣寒 味大苦
茵蔯 氣微寒 味苦平　朴硝 氣寒 味苦辛　瓜蔞根 氣寒 味苦
牡蠣 氣微寒 味鹹平　玄參 氣微寒 味微苦　山梔子 氣寒 味微苦
川楝子 氣寒 味苦平　香豉 氣寒 味苦　地榆 氣微寒 味甘鹹

標本陰陽論

天陽無圓氣上外升生浮晝動輕躁六腑

地陰有方血下內降殺流夜靜重濇五臟

夫治病者當知標本以身論之則外爲標內爲本陽爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本此臟腑之標本也又臟腑在內爲本各臟腑之經絡在外

爲標此臟腑經絡之標本也更人身之臟腑陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病爲本後傳流病爲標凡治病者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益畜若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先利大小便次治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外皆治其本不可不慎也從前來者爲實邪從後來者爲虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者爲實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪先於肝經五穴中瀉滎心行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉滎火少府穴是也以藥論之入肝經藥爲之引用瀉心火藥爲君是治實邪之病也假令

肝受腎邪是從後來者爲虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補本是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治其本也以藥論之入腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也

五方之正氣味 制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之

南方丙熱丁火其氣熱其味辛。在人以心小腸三焦包絡應之。

中央戊溼其本氣平。其兼氣温涼寒熱在人以胃應之。

中央巳土其本味鹹其兼味辛甘酸苦在人以脾應之。

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之。

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之

人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀

之氣而生化也聖人垂世立教不能渾說必當分析以至理而言則陰陽相附不相離其實一也呼則因陽出吸則隨陰入天以陽生陰長地以陽殺陰藏此上說止明補瀉用藥君之一也故曰主病者為君用藥之機會要明輕清成象重濁成形本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也清中清者清肺以助其天眞清中濁者榮華腠理濁中清者榮養于神濁中濁者堅強骨髓故至眞要大論云五味陰陽之用辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽鹹味湧泄為陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅各以所利而行之調其氣使之平也詳見本論

湯液本草卷之一終

湯液本草卷之二

元　古趙　海藏王好古進之甫集

明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫校

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

○如頭痛須用川芎。如不愈各加引經藥。

太陽川芎　陽明白芷　少陽柴胡　太陰蒼朮　少陰細辛　厥陰吳茱萸

○如頂巔痛須用藁本去川芎。

○如肢節痛須用羌活去風溼亦宜用之

○如腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃蘗。

○如心下痞。須用枳實黃連。

○如肌熱及去痰者須用黃芩。肌熱亦用黃芪

○如腹脹用薑制厚朴一本有芍藥

○如虛熱須用黃芪止虛汗亦用

○如脇下痛往來潮熱日晡潮熱須用柴胡。

○如脾胃受溼沉困無力怠惰好臥去痰用白朮。

○如破滯氣用枳殼高者用之。夫枳殼者。損胸中至高之氣二三服而已

○如破滯血用桃仁蘇木。

○如去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胸中寒痰痞塞用陳皮白朮多用則瀉脾胃。

○如腹中窄狹須用蒼朮

○如調氣須用木香。

○如補氣須用人參

○如和血須用當歸凡血受病者皆當用當歸也

○如去下焦溼腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防己草龍膽黃蘗知母

○如去上焦溼及熱須用黃芩瀉肺火故也

○如去中焦溼與痛熱用黃連能瀉心火故也

○如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真氣。

○如渴者用乾葛茯苓禁半夏

○如嗽者用五味子。

○如喘者用阿膠。

○如宿食不消須用黃連枳實

○如胸中煩熱須用梔子仁

○如水瀉須用白朮茯苓芍藥

○如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可

○如血刺痛用當歸詳上下用根梢

○如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃蘗黃芩詳上下用根梢及引經藥則可

○如眼痛不可忍者用黃連當歸根以酒浸煎

○小便黃者用黃蘗數者澀者或加澤瀉

○如腹中實熱用大黃芒硝

○如小腹痛用青皮

○如莖中痛用生甘草梢

○如驚悸恍惚用茯神

○如飲水多致傷脾用白朮茯苓豬苓

○如胃脘痛用草豆蔻

凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿者禁用經云滿者勿入甘

用藥凡例

凡解利傷風以防風為君甘草白朮為佐經云辛甘發散為陽風宜辛散防風味辛及治風通用故防風為君甘草白朮為佐

凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐是寒宜甘發也或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以君臣論

凡眼暴發赤腫以防風黃芩為君以瀉火以黃連當歸根和血為佐兼以各經藥用之

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸根為君以羌活防風為臣甘草甘菊之類為佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論

凡水瀉以茯苓白朮為君芍藥甘草為佐

凡諸風以防風為君隨治病為佐

凡嗽以五味子為君有痰者以半夏為佐喘者以阿膠為佐有熱無熱以黃芩為佐但分兩多寡不同耳

凡小便不利黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐

凡下焦有溼草龍膽防己爲君甘草黄蘗爲佐。

凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥爲佐詳別證加減。

凡諸瘡以黄連當歸爲君甘草黄芩爲佐。

凡瘧以柴胡爲君隨所發時所屬經分用引經藥佐之。

已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病藥内逐旋加減用之。

東垣報使。

太陽	羌活 下黄蘗	太陰	白芍藥
陽明	白芷 升麻 下石膏	少陰	知母
少陽	柴胡 下青皮	厥陰	青皮 上柴胡

小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本方。三焦膽與肝包絡少陽厥陰柴胡强陽明大腸兼足胃葛根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺經異升麻芍藥白者詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥爲使更有何病到膏肓。

諸經嚮導

寅手肺 太陰經嚮導圖 脾足巳

手太陰肺經：

南星 款冬 升麻 桔梗 檀香
山藥 粳米 白茯 五味 天冬
阿膠 麥冬 桑皮 杏仁 葱白
麻黄 丁香 益智 肉蔻 知母
縮砂（檀香豆蔻爲使） 梔子 黄芩 石膏

升麻 芍藥 木瓜 藿香

足太陰脾經：

防風 當歸 縮砂（人參益智爲使）
草蔻 茱萸 蒼朮 白朮 膠飴
益智 黄芪 麻仁 甘草 半夏
代赭 赤茯

白芍藥（酒浸） 延胡索 縮砂

卯手大腸 陽明經嚮導圖 胃足辰

手陽明大腸經：

升麻 白芷 麻仁 秦艽 薤白
白石脂 縮砂（白石脂爲使） 肉蔻 石膏

麻黄 大黄 連翹 升麻 白芷 葛根

足陽明胃經：

丁香 草蔻 縮砂 防風 石膏
知母 白朮 神麯 葛根 烏藥
半夏 蒼朮 升麻 白芷 葱白

石膏 白朮 藿香（佐以他藥） 白芷 升麻 下石膏

亥　焦　手少陽經嚮導圖

川芎　柴胡　青皮　白朮　熟地
黃芪　骨皮　石膏　細辛　附子

青皮　川芎　柴胡

足膽　子

半夏　膽草　柴胡

連翹　柴胡上青皮

戌　絡　手厥陰經嚮導圖

沙參　白朮　柴胡　熟地　丹皮
敗醬

骨皮上柴胡　牡丹皮

足肝　丑

膽草　蔓荊　阿膠　瞿麥　桃仁
山茱萸　代赭　紫石英　當歸　甘草
青皮　羌活　吳茱萸　白朮

柴胡　川芎　皂角　桃仁　蒼耆茶

未　腸　手太陽經嚮導圖

白朮　生地　赤茯　羌活　赤石脂
縮砂

防風　藁本　茴香　羌活　李(?)　黃蘗

足膀胱　申

蔓荊　滑石　茵陳　白茯　豬苓
澤瀉　桂枝　黃蘗　羌活　麻黃

白朮　防已　藁本　羌活　澤瀉　大黃　羌活　下黃蘗

午　心　手少陰經嚮導圖

麻黃　桂心　當歸　生地　黃連
代赭　紫石英　梔子　獨活　赤茯

細辛　熟地　五味　澤瀉

足腎　酉

知母　黃蘗　骨皮　阿膠　豬膚
丹皮　玄參　敗醬　牡蠣　烏藥
山茱萸　天冬　豬苓　澤瀉　白茯
檳香　甘草　五味　茱萸　益智
丁香　獨活　桔梗　敗　縮砂
附子　沉香　益智　黃蘗

地榆　附子　知母　獨活

製方之法

夫藥有寒熱温涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥溼堅軟鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝苦急急食甘以緩之心苦緩急食酸以收之脾苦溼急食苦以燥之肺苦氣上逆急食苦以泄之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所宜識其病

之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小反正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣應臣者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四耦之制也君二臣三奇之制也君二臣六耦之制也去咽嗌近者奇之遠者耦之汗者不奇下者不耦補上治上制之以緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而頓食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令踈散也土鬱奪之謂下令無壅滯也金鬱泄之謂解表利小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治病之大要也

用藥各定分兩

為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之於證所主同者則等分

用藥酒洗曝乾

黄芩黄連黄蘗知母病在頭面及手梢皮膚者須用

酒炒之借酒力以上騰也咽之下臍之上須酒洗之在下生用大凡生升熟降大黄須煨恐寒則損胃氣至於川烏附子須炮以制毒也黄蘗知母下部藥也久弱之人須合用之者酒浸曝乾恐寒傷胃氣也熟地黄酒洗亦然當歸酒浸曝發散之意也

用藥根梢身例

凡根之在土者中半已上氣脉之上行也以生苗者爲根中半已下氣脉之下行也入土以爲梢病在中焦與上焦者用根在下焦者用梢根升而梢降大凡

藥根有上中下人身半已上天之陽也用頭在中焦用身在身半已下地之陰也用梢述類象形者也

用圓散藥例

仲景言剉如麻豆大與㕮咀同意夫㕮咀古之制也古者無鐵刃以口㕮細令如麻豆爲粗藥煎之使藥水清飲於腹中則易升易散也此所謂㕮咀也今人以刀器剉如麻豆大此㕮咀之易成也若一槩爲細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑㕮咀之藥取汁易行經絡也若治至高之病加酒煎去溼以生薑補元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和柤服去下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠麪糊取其遲化直至下焦或酒或醋取其收且散之意也犯半夏南星欲去溼者以生薑汁稀糊爲丸取其易化也水浸宿炊餅又易化滴水圓又易化煉蜜圓者取其遲化而氣循經絡也蠟圓者取其難化而旋旋取效

也大抵湯者盪也去大病用之散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩而治之意也

升合分兩

古之方劑錙銖分兩與今不同謂如㕮咀者即今剉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞也云銖者六銖爲一分即二錢半也二十四銖爲一兩也云三兩者即今之一兩云二兩即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊貫也

凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉在味隨時換氣主病者爲君假令治風者防風爲君治上焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲君治溼防已爲君治寒附子之類爲君兼見何證以佐使藥分治之此製方之要也本草說上品藥爲君各從其宜也

治法綱要

氣交變論云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有假令下者舉之非下者固當舉之也以其本高而失之太下故舉而使之高若本下何舉之有如仲景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝爲君芍藥甘草爲佐陽脈澁陰脈弦法當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥爲君桂甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其主用也後之用古方者觸類而長之不致差誤矣

藥味專精

至元庚辰六月許伯威年五十四中氣本弱病傷寒八九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚痛傷脾胃四肢冷時發昏憒予診其脈動而中止有

時自還乃結脈也心亦悸動吃噫不絕色變青黃精神減少目不欲開倦臥惡人語笑以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣五臟痿弱榮衛涸流溼劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣剉一兩劑服之不效予再候之脈證相對莫非藥有陳腐者致不效乎再市藥之氣味厚者煎

服其證減半再服而安凡藥之昆蟲草木產之有地根葉花實採之有時失其地則性味少異矣失其時則氣味不全矣又況新陳之不同精麤之不等倘不擇而用之其不效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也修合之際宜加謹焉

湯液煎造

病人服藥必擇人煎藥能識煎熬制度須令親信恭誠至意者煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水為上三水大小斟酌以慢火煎熬分數用紗濾去柤取

清汁服之無不效也

古人服藥活法

在上不厭頻而少在下不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者　先食而後藥

病在心下者　先藥而後食

病在四肢者　宜飢食而在旦

病在骨髓者　宜飽食而在夜

察病輕重

凡欲療病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脉孰能知未病之病乎

海藏老人湯液本草

五宜

肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘

心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸

肺色白宜食苦小麥羊肉杏薤皆苦

脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹

腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

毒藥攻邪　五穀為養　五果為助

五畜為益　五菜為充

氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或軟

四時五臟病隨五味所宜也

大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病

十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也蓋陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脉沮弛精神乃央是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則氣骨以精謹道如法長有天命

五傷

多食鹹　則脉凝泣而變色

多食苦　則皮槁而毛拔

多食辛　則筋急而爪枯

多食酸　則肉胝䐢而唇揭

多食甘　則骨痛而髮落

五走

鹹走血　血病毋多食鹹

苦走骨　骨病毋多食苦

辛走氣　氣病毋多食辛

酸走筋　筋病毋多食酸

甘走肉　肉病毋多食甘

夫五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也

服藥可慎

熱中消中不可服膏粱芳草石藥夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此夫熱氣慓悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

論藥所主

海藏云湯液要藥最爲的當其餘方論所著雜例比之湯液稍異何哉蓋伊尹仲景取其治之長也其所長者神農之所註也何以知之本草云一物主十病取其偏長爲本又當取潔古珍珠囊斷例爲准則其中藥之所主不必多言只一兩句多則不過三四句非務飾也亦取其所主之偏長故不爲多也

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥陰	少陰	太陰	少陽	陽明	太陽
	司			天	
風化	熱化	溼化	火化	燥化	寒化
	在			泉	
酸化木	苦化火	甘化土	苦化火	辛化金	鹹化水

司地氣故物化從

酸	苦	甘	苦	辛	鹹

故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜迺可以言盈虛病生之緒也謹候氣宜無失病機其主病何如言採藥之歲也司歲備物則無遺主矣先歲物何也天地之專精也專精之氣藥物肥濃又於使用當其正氣味也五運主歲不足則物薄有餘則物精非專精則散氣散氣則物不純是以質同而異等形質雖同力用則異也氣味有厚薄性用有躁靜治化有多少力化有淺深此之謂也

氣味生成流布

陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者爲陰薄爲陰中之陽厚則泄薄則通氣厚者爲陽薄爲陽中之陰薄則發泄厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生




澤 燥 寒
司地
澤 燥 寒
化天
熱反勝之
治以
鹹冷 辛寒 苦冷
佐以
甘辛 苦甘 鹹甘
苦平之 酸平之 鹹平之
以和為利
佐以


火位之主
甘瀉 鹹補
少陽之客
鹹補 甘瀉
少陽之勝
之復
在泉
司天
火
淫于內
治以
淫所勝
平以
佐以


木位之主
酸瀉 辛補
厥陰之客
辛補 酸瀉 甘緩
厥陰之勝
之復
在泉
司天
風
淫于內
治以
淫所勝
平以
佐以


金位之主
辛瀉 酸補
陽明之客
酸補 辛瀉
陽明之勝
之復
在泉
司天
燥
淫于內
治以
淫所勝
平以
佐以
風
化天
司地
清反勝之
治以
酸溫
佐以
苦甘
辛平







七方

大　君一臣三佐九制之大也

遠而奇耦制大其服也大則數少少則二之

腎肝位遠服湯散不厭頻而多

小　君一臣二制之小也

近而奇耦制小其服也小則數多多則九之

心肺位近服湯散不厭頻而少

緩　補上治上制以緩緩則氣味薄

治主以緩緩則治其本

急　補下治下制以急急則氣味厚。
治客以急急則治其標。

奇　君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也。
陽數奇

耦　君二臣四耦之制也君二臣六耦之制也。
陰數耦

複　奇之不去則耦之是謂重方也。

十劑

宣　可以去壅薑橘之屬是也。

通　可以去滯木通防已之屬是也。

補　可以去弱人參羊肉之屬是也。

瀉　可以去閉葶藶大黃之屬是也。

輕　可以去實麻黃葛根之屬是也。

重　可以去怯磁石鐵漿之屬是也。

滑　可以去著冬葵子榆白皮之屬是也。

澀　可以去脫牡蠣龍骨之屬是也。

燥　可以去溼桑白皮赤小豆之屬是也。

溼　可以去枯白石英紫石英之屬是也。

只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所失矣陶隱居云藥有宣通補瀉輕重滑澀燥溼此十劑今詳之惟寒熱二種何獨見遺今補二種以盡厥旨

寒　可以去熱大黃朴硝之屬是也

熱　可以去寒附子官桂之屬是也

湯液本草卷之二

湯液本草卷之三

元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫校

草部

防風

純陽 性溫 味甘辛 無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

○象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并釵股用。

○珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪

○心云又去溼之仙藥也風能勝溼爾。

○本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙

○東垣云防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥末潤劑也雖與黃芪相制乃相畏而相使者也

○本草又云得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂芫花。

升麻

氣平 味苦甘 微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

○象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能補若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰。

○心云發散本經風邪。元氣不足者用此於陰中升陽氣上行。

○珍云。脾痺非此不能除。

○本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡。

○東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

○朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

○仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中

乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

○訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活

氣微溫 味苦甘平 苦辛氣味俱輕陽也無毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

○象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

○心云去溫溼風

○珍云骨節痛非此不能除

○液云君藥也非無為之主乃却亂反正之主太陽經頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云羌活足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也

又錢氏瀉青丸用此王乙同歸一治也或問治頭痛者何答曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脈會于巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛

足少陰腎經行經之藥

○本草云主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓女子疝療諸賊風百節痛風無久新者

○液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故
兩足寒濕痺不能動止非此不能治
○象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草
得風不搖無風自搖去皮淨用
○心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕
○珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純
陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥
○象云除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前
後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下
痞胸脇痛去蘆用
○心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱
○珍云去往來寒熱膽痺非此不能除
○本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪
氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中
邪氣五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦

可作浴湯久服輕身明目益精半夏為之使惡皂
莢畏女菀藜蘆入足少陽主東方分也在經主氣
在臟主血證前行則惡熱卻退則惡寒雖氣之微
寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之
類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷
寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類
并秦艽牡丹皮輩同為調經之劑
○衍義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中
鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真

臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須
當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡
正合宜耳服之無不效
○日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥
性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者
取而用之不亡何待注釋本草一字亦不可忽蓋
後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下
之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如
張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

○圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此爲最要之藥

○東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

○海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮爲嫩陽故以少陽當之

葛根

氣平　味甘　無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

○象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用

○心云止渴升陽

○珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除

○本草云主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛生根汁寒治消渴傷寒壯熱花主消酒粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸擣汁飲之良

○東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也

○朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不已者葛根葱白湯

○易老云用此以斷太陽入陽明之路即非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也又有葛根黃芩黃連解肌湯是知葛根非太陽藥即陽明藥

○食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鴆毒

○衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良

○易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服

葛根發之。若服之。是引賊破家也。若頭顱痛者。可服之。葛根湯陽明自中風之仙藥也。

○本草又云。殺野葛巴豆百藥毒。

葳靈仙

氣溫　味苦甘　純陽

○象云。主諸風溼冷。通五臟。去腹內瘕滯。腰膝冷痛。及治傷損。鐵脚者佳。去蘆用。

○心云。去大腸之風。

○本草云。忌茗。

細辛

氣溫　味大辛　純陽　性溫　氣厚於味　陽也

無毒

少陰經藥

手少陰引經之藥

○象云。治少陰頭痛如神。當少用之。獨活為使。為主用。去蘆頭并葉。華州者佳。

○珍云。主少陰經頭痛。

○心云。主諸項頭痛。諸風通用之。味辛熱。溫陰經。散水寒。以去內寒。

○本草云。主欬逆。頭痛腦動。百節拘攣。風溼痹痛。死肌。溫中下氣。破痰。利水道。開胸中。除喉痹。齆鼻。風癇癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。久服明目。利九竅。

○東垣云。治邪在裏之表。故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯也。

○易老云。治少陰頭痛。太陽則羌活。少陰則細辛。陽明則白芷。厥陰則川芎吳茱萸。少陽則柴胡。用者

隨經不可差。細辛香味俱緩。故入少陰。與獨活頗相類。

○本草又云。曾青棗根為之使。得當歸芍藥白芷川芎牡丹藁本甘草。共療婦人。得決明鯉魚膽青羊肝。共療目痛。惡狼毒山茱萸黃芪。畏硝石滑石。反藜蘆。

○衍義云。治頭面風痹。不可缺也。

白芷

氣溫　味大辛　純陽無毒　氣味俱輕陽也

陽明經引經藥

手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味內加之

○象云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯主之

○珍云長肌肉散陽明之風

○心云治風通用去肺經風熱

○本草云主女子漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目癢

○日華子云補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背一切瘡痍排膿止痛生肌去面皯疵瘢明目其氣芳香治正陽陽明頭痛與辛夷細辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸爲之使惡旋覆花

川芎

氣溫　味辛　純陽　無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

○象云補血治血虛頭痛之聖藥妊婦胎不動數月加當歸二味各二錢水二盞煎至一半服神效

○珍云散肝經之風貫芎治少陽經苦頭痛

○心云治少陽頭痛及治風通用

○本草云主中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷痛面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中除內寒

○日華子云能除鼻洪吐血及溺血破癥結宿血養新血

○易老云上行頭目下行血海故清神四物湯所皆用也入手足厥陰經

○衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服久服則走散真氣既使他藥佐之亦不可久服中病即便已

○東垣云頭痛甚者加蔓荊子頂與腦痛加川芎苦頭痛者加藁本諸經苦頭痛加細辛若有熱者不

能治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味。
○本草又云白芷為之使畏黄連。

麻黄

氣溫 味苦甘而苦 氣味俱薄陽也升也甘
熱純陽無毒

手太陰之劑

入足太陽經

走手少陰經陽明經藥

○象云發太陽少陰經汗去節煮三二沸去上沫不

則令人心煩悶。
○心云陽明經藥去表上之寒邪。甘熱去節。解少陰
寒散表寒發浮熱也 珍云去榮中寒
○本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱
氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚。
○液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無
汗欬嗽根節能止汗夫麻黄治衛實之藥桂枝治
衛虛之藥桂枝麻黄雖為太陽經藥其實榮衛藥
也以其在太陽地分故曰太陽也本病者即榮衛

肺主衛心主榮為血乃肺心所主故麻黄為手太
陰之劑桂枝為手少陰之劑故傷風傷寒而嗽者
用麻黄桂枝即湯液之源也
○藥性論云君味甘平。治溫疫。
○本草又云厚朴為之使惡辛夷石韋

藁本

氣溫 味大辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也

純陽無毒

太陽經本經藥

○象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦
痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛
○心云專治太陽頭痛其氣雄壯
○珍云治巔頂痛
○本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭
痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡
可作沐藥面脂實主流風四肢惡閭茹此與木香
同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療
○仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為

傷寒又云清邪中于上焦皆霧露之氣神术白术湯內加木香藁本擇其可而用之此既治風又治溼亦各從其類也

桔梗

氣微溫　味辛苦　陽中之陽味厚氣輕陽中之陰也有小毒

入足少陰經

入手太陰肺經藥

○象云治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

○珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沈治鼻塞

○心云利咽嗌胸膈之氣以其色白故屬肺辛甘微溫治寒嘔若咽中痛桔梗能散之也

○本草云主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒

○易老云與國老並行同為舟楫之劑如將軍苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功非此辛甘不居膺如鐵石入江非舟楫不載故用辛甘之劑以升之也

○衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿

○本草又云節皮為之使得牡蠣遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽

鼠黏子

氣平　味辛　辛溫

○象云　風毒利咽膈吞一枚可出癰疽瘡頭

○珍云潤肺散氣

秦艽

氣微溫　味苦辛　陰中微陽

手陽明經藥

○象云主寒熱邪氣風溼痺下水利小便治黃病骨蒸治口禁及腸風瀉血去蘆用

○珍云去手陽明經下牙痛口瘡毒去本經風溼

○本草云菖蒲為之使

天麻

氣平　味苦　無毒

○象云治頭風。
○本草云主諸風溼痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力其苗名定風草。

黑附子

氣熱　味大辛　純陽　辛甘溫大熱有大毒
通行諸經引用藥
入手少陽經三焦命門之劑

○象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮爲佐名朮附湯除寒溼之聖藥也溼藥中少加之通行諸經引用藥也治經閉慢火炮。

○珍云治脾溼腎寒。
○本草云主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒溼踒躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨强陰墮胎爲百藥之長。
○液云入手少陽三焦命門之劑浮中沈無所不至附子味辛大熱爲陽中之陽故行而不止非若乾薑止而不行也非身表涼而四肢厥者不可僭用如用之者以其治四逆也。
○本草又云地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘艸黃芪人參冬月採爲附子春月採爲烏頭。

烏頭

氣熱　味大辛　辛甘大熱　有大毒行諸經

○象云治風痺血痺半身不遂行經藥也慢火炮拆去皮用。
○本草云主中風惡風洗洗出汗除寒溼痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其

汁煎之名射罔殺禽獸
○液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黃裏白劣性尚在莫若乘熱切作片子再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去却爲良也世人罕如此製之。

縮砂

氣溫　味辛　無毒
入手足太陰經陽明經太陽經

足少陰經
○象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷弱心腹痛下氣消食。
○本草云治虛勞冷弱宿食不消赤白泄利腹中虛痛下氣
○液云與白檀豆蔻爲使則入肺與人參益智爲使則入脾與黃蘗茯苓爲使則入腎與赤白石脂爲使則入大小腸

蓽澄茄

氣溫 味辛 無毒
○本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食。

蓽撥

氣溫 味辛 無毒
○本草云主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖。
○衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄眞氣令人腸虛下重

附子

氣微寒 味甘 陽中之陰 無毒
○本草云除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉後世人用治崩漏本草不言治崩漏
○圖經云膀胱兩腸氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮膚瘙痒癮疹日漸痩損心忪少氣以是知益氣血中之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能逐去凝血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大便不通同意

○珍云快氣

草豆蔻

氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒
入足太陰經陽明經
○象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麪包煨熟去麪用。
○珍云益脾胃去寒
○本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健

脾亦能消食。
○衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木瓜烏梅縮砂益智麯糵鹽炒皆也

白豆蔻
氣熱 味大辛 味薄氣厚陽也 辛大溫 無毒
入手太陰經
○珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用。

○心云專入肺經去白睛翳膜紅者不宜多用。
○本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣。
○液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以此補之。

延胡索
氣溫 味辛 苦辛溫無毒
入手足太陰經
○象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破癥瘕碎用。

○液云治心氣痛小腹痛有神主破血産後諸疾因血爲病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血上行因損下血。

茴香
氣平 味辛 無毒
入手足少陰經太陽經藥
○象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用。
○本草云主諸瘻霍亂及蛇傷又能治腎勞㿗疝氣開胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹痛不可忍。

○液云茴香本治膀胱藥以其先丙故云小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也。

紅藍花
氣溫 味辛 辛而甘溫苦 陰中之陽 無毒
○象云治産後口噤血暈腹內惡血不盡絞痛破留血神效搗碎用。
○心云和血與當歸同用。

珍云入心養血謂苦爲陰中之陽故入心
○本草云主產後血暈胎死腹中以酒煮服亦主蠱
毒下血其苗生搗傅遊腫其子吞數粒主天行瘡
子不出其胭脂主小兒聤耳滴耳中仲景治六十
二種風兼腹中血氣刺痛用紅花一大兩分爲四
分酒一大升煎強半頓服之

良薑

氣熱　味辛　純陽
○本草云治胃中冷逆霍亂腹痛反胃嘔食轉筋瀉
痢下氣消宿食
○心云建脾胃

黃芪

氣溫　味甘　純陽　甘微溫　性平無毒
入手少陽經
足太陰經
足少陰命門之劑
象云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脈
弦自汗脾胃虛弱瘡瘍血脈不行內托陰證瘡瘍
必用之去蘆用
○珍云益胃氣去肌熱諸痛必用之
○心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱無汗則
發之有汗則止之
○本草云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔
鼠瘻補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐五臟間
惡血補丈夫虛損五勞羸瘦腹痛泄痢益氣利陰
氣有白水芪赤水芪木芪功用皆同惟木芪莖短
而理橫折之如綿皮黃褐色肉中白色謂之綿黃
芪其堅脆而味苦者乃苜蓿根也又云破癥瘕瘰癧腸

風血崩帶下赤白痢及產前後一切病月候不調
消渴痰嗽又治頭風熱毒目赤骨蒸生蜀郡山谷
白水漢中今河東陝西州郡多有之芪與桂同功
特味稍異比桂但甘平不辛熱耳世人以苜蓿根
代之呼爲土黃芪但味苦能令人瘦特味甘者能
令人肥也頗能亂眞用者宜審治氣虛盜汗并自
汗即皮表之藥又治膚痛則表藥可知又治咯血
柔脾胃是爲中州藥也又治傷寒尺脈不至又補

腎臟元氣爲裏藥是上中下內外三焦之藥今本草圖經只言河東者沁州綿上是也故謂之綿芪味甘如蜜兼體骨柔軟如綿世以爲如綿非也別說云黃芪本出綿上爲良故圖經所繪者憲水者也與綿上相鄰蓋以地産爲綿若以柔韌爲綿則偽者亦柔但以乾脆甘苦爲別耳。

○東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也靈樞曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃芪旣補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳亦

在佐使桂則通血也能破血而實衛氣通內而實外者歟桂以血言一作色求則芪爲實氣也惡鱉甲。

蒼朮

氣溫 味甘

入足陽明太陰經

○象云主治同白朮若除上溼發汗功最大若補中焦除溼力小如白朮也

○衍義云弋 如大拇指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮。

○東垣云入足陽明太陰能建胃安脾

○本草但言朮不分蒼白其蒼朮別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼。

○海藏云蒼白有止發之異其餘主治並見圖經。

白朮

氣溫 味甘 苦而甘溫 味厚氣薄陰中陽也 無毒

入手太陽少陰經

足陽明太陰少陰厥陰四經

○象云除溼益燥和中益氣利腰臍間血除胃中熱去諸經之溼理胃。

○潔古云溫中去溼除熱降胃氣蒼朮亦同但味頗厚耳下行則用之甘溫補陽建脾逐水寒溼所勝緩脾生津去溼渴者用之。

○本草在朮條下無蒼白之名近多用白朮治皮間風止汗消痞補胃和中利腰臍間血通水道上而

皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血
○潔古又云非白朮不能去溼非枳實不能消痞除
溼利水道如何是益津液

當歸

氣溫　味辛甘而大溫　氣味俱輕陽也　甘
辛陽中微陰　無毒
入手少陰經
足太陰經厥陰經
○象云和血補血尾破血身和血先水洗去土酒製

過或火乾日乾入藥血病須用去蘆用
○心云治血通用能除血刺痛以甘故能和血辛溫
以潤內寒當歸之苦以助心散寒
○珍云頭止血身和血梢破血治上酒浸治外酒洗
糖色嚼之大辛可能潰堅與菖蒲海藻相反
○本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚中婦人
漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煑汁飲之溫中止痛及
腰痛除客血內塞中風痓汗不出溼痺中惡客氣
虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸
氣血之功故名當歸
○雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處
若要止痛止血即用尾若一時用不如不使
○易老云用頭則破血用尾則止血若全用則一破
一止則和血也入手少陰以其心主血也入足太
陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能
破血身能養血尾能行血用者不分不如不使若
全用在參芪皆能補血在牽牛大黃皆能破血佐
使定分用者當知從桂附茱萸則熱從大黃芒硝

則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治
頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥主之
○藥性論云臣畏生薑惡溼麪
○經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣
○藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用矣

芍藥

氣微寒　味酸而苦　氣薄味厚陰也降也
陰中之陽有小毒
入手足太陰經

○象云補中焦之藥得炙甘草爲佐治腹中痛夏月腹痛少加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半。此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

○心云脾經之藥收陰氣能除腹痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘緩下利必用之藥。

○珍云白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛

○本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱。

○衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉者山中者佳花葉多則根虛然其根多赤色其味澀有色白粗肥者亦妙餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言減芍藥以避中寒誠不可忽。今見花赤者爲赤芍藥花白者爲白芍藥俗云白補而赤瀉

○東垣云但澀者爲上或問古今方論中多以澀爲收今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停諸濕而益津液使小便自行本非通行之藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云損其肝者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四物湯以其內有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣血入手足太陰經大抵酸澀者爲上爲收斂停濕之劑故主手足太陰經收降之體故又能至血海而入於九地之下後至厥陰經也後

人用赤瀉白補者以其色在西方故補色在南方故泄也。

○本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便既用此以益陰滋溼故小便得通也

○難經云損其肝者緩其中即調血也沒藥烏藥雷丸爲之使

○本草又云惡石斛芒硝畏硝石鱉甲小薊反藜蘆

○液云腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液停溼

之劑。

熟地黃

氣寒　味苦　陰中之陽　甘微苦　味厚氣
薄　陰中陽也　無毒

入手足少陰經厥陰經

○象云酒洒蒸如烏金假酒力則微溫大補血衰者須用之善黑鬚髮忌蘿蔔

○珍云若治外治上酒製。

○心云生則性大寒而涼血熟則性寒而消腎

○本草云主折跌絕筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目生者尤良得清酒麥門冬尤良惡貝母畏蕪荑

○東垣云生地黃治手足心熱及心熱入手足少陰手足厥陰能益腎水而治血脈洪實者宜此若脈虛則宜熟地黃地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景製八味丸以熟地黃爲諸藥之首天一所生之源也湯液四物以治藏血之臟亦以乾熟地黃爲君者癸乙同歸一治也蒸搗不可犯鐵若犯鐵令人消腎。

○陳藏器云蒸乾即溫補生乾即平宣

○機要云熟地黃臍下發痛者腎經也非地黃不能除補腎益陰之劑二宜丸加當歸爲補髓。

生地黃

氣寒　味苦　陰中之陽　甘苦大寒　無毒

入手太陽經少陰經之劑

○象云涼血補血補腎水眞陰不足此藥大寒宜斟酌用之恐損胃氣。

○珍云生血涼血

○本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衂鼻吐血皆搗飲之。

○液云手少陰又爲手太陽之劑故錢氏瀉丙與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血亦治之入四散例。

○心云苦甘陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱惡貝母畏蕪荑

山藥

氣溫　味甘平　無毒

手太陰經藥

○本草云主補中益氣除熱强陰主頭面遊風風頭眼眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門冬紫芝爲之使惡甘遂

○東垣云仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此物潤之

麻仁

味甘平　無毒

入足太陰經

手陽明經

○本草云主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可爲沐藥久服肥健不老

○液云入足太陰手陽明汗多胃熱便難三者皆燥溼而亡津液故曰脾約約者約束之義內經謂燥者潤之故仲景以麻仁潤足太陰之燥及通腸也

薏苡仁

氣微寒　味甘　無毒

○本草云主筋急拘攣不可屈伸風溼痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根能下三蟲仲景治風溼燥痛日晡所劇者與麻黃杏子薏苡仁湯

甘草

氣平　味甘　陽也　無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

○象云生用大寒熱火炙之則溫能補上焦中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名國老去皮用甘草梢子生用爲君去莖中痛或加苦楝酒煮延胡索爲主尤妙

○心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘以緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用調

和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除熱緩正氣緩陰血潤肺

○珍云養血補胃梢子去腎中之痛胸中積熱非梢子不能除

○本草云主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草故名國老

○藥性論云君忌猪肉

○內經曰脾欲緩急食甘以緩之甘以補脾能緩之也故湯液用此以建中又曰甘者令人中滿又曰中滿者勿食甘即知非中滿藥也甘入脾歸其所喜攻也

○或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和之意答曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用甘草者則有調和之意中不滿而用甘為之補中滿者用甘為之泄此升降浮沈也鳳髓丹之甘緩腎溼而生元氣亦甘補之意也經云以甘補之以甘寫之以甘緩之本草謂安和七十二種石一千二百種草名為國老雖非君而為君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而泄辛橫行而散酸束而收斂鹹止而軟堅甘上行而發如何本草言下氣蓋甘之味有升降浮沈可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥陰太陰少陰能

治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用水三椀慢火熬至半椀去租服之消瘡與黃芪同功黃芪亦能消諸腫毒瘡疽修治之法與甘草同

○本草又云术乾漆苦參為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物

白前

氣微溫　味甘　微寒　無毒

○本草云主胸脇逆氣欬嗽上氣狀似白薇牛膝輩

○衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛

但粗而脆不似細辛之柔若以溫藥相佐使則尤佳仲景用

白薇

氣大寒　味苦鹹平　無毒

○本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精近道處處有之狀似牛膝白前而短小療驚邪風狂痓病

○液云局方中多有用之治婦人以本經療傷中下

淋露故也

○本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

前胡

氣微寒　味苦　無毒

○本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏為使惡皂莢畏藜蘆

湯液本草卷之三終

湯液本草卷之四

元　古趙　海藏王好古進之甫集

明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫校

草部

木香

氣熱　味辛苦　純陽　味厚於氣陰中陽也　無毒

○象云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為使

○珍云治腹中氣不轉運和胃氣

○心云散滯氣調諸氣

○本草云治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒瘟瘧蠱毒行藥之精

○本經云主氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也安胎健脾胃補也除痃癖塊破也與本條補破不同何也易老以為破氣之劑不言補也

知母

氣寒　味大辛　苦寒味厚陰也降也

苦陰中微陽　無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

○象云瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用

○心云瀉腎中火苦寒涼心去熱

○珍云涼腎腎經本藥上頸行經皆須用酒炒

○本草云主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄

○東垣云入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸腎經氣勞瀉心仲景用此爲白虎湯治不得眠者煩躁也煩者肺也躁者腎也以石膏爲君主佐以知母之苦寒以淸腎之源緩以甘草粳米之甘而使不速下也經云胸中有寒者瓜蔕散吐之又云表熱裏寒者白虎湯主之瓜蔕知母味皆苦寒而治胸中寒及裏寒何也答曰成無巳註云即傷寒寒邪之毒爲熱病也讀者要逆識之如論語言亂臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也乃治亂者也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字舉其初而言之熱病在其中矣若以寒爲寒冷之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脉尺寸俱長則熱可知矣

貝母

氣平微寒　味辛苦　無毒

○本草云主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直咳嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

○仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胸中鬱結之氣殊有功

○本草又云厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭

○海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物爲細末猪蹄湯調下

黃芩

氣寒　味微苦苦而甘　微寒味薄氣厚陽中陰也陰中微陽大寒無毒

入手太陰經之劑

○象云治肺中濕熱瘀上熱目中赤腫瘀肉盛必用之藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足乃滋其化源也

○心云瀉肺中之火

○潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠黏腹疼後重身熱久不可者與芍藥甘草同用

○珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

○本草云主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火傷療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中不空者治下部妙

○陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛飄與實高下之分與枳實殼同例黃芩其子主腸澼膿血

○本草又云得厚朴黃連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

○張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散內多用黃芩今醫家常用有效者因著之千金方巴郡太守

奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者久服之得行及奔馬甚驗

○陶隱居云黃芩圓者名子芩仲芩治雜病方多用之

黃連

氣寒　味苦　味厚氣薄陰中陽也升也無毒

入手少陰經

○象云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心

下務五等瀉心湯皆用之去鬚用
○心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒者上陽有餘苦以除之安蚘通寒格療下焦虛堅腎
○珍云酒炒上行酒浸行上頭
○本草云主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘

○液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也為子能令母實實則瀉其子治血防風為上使黃連為中使地榆為下使
○海藏祖方令終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時灌之大應已出聲灌之斑雖發亦輕古方以黃連為治痢之最
○衍義云治痢有微血不可執以黃連為苦燥劑虛者多致危困實者宜用之
○本草又云龍骨理石黃芩為之使惡菊花芫花玄參白蘚皮畏款冬花勝烏頭解巴豆毒

大黃

氣寒　味苦大寒　味極厚陰也降也無毒
入手足陽明經
酒浸入太陽經
酒洗入陽明經
餘經不用酒
○象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滌蕩腸胃間熱專治不大便

○心云滌蕩實熱
○珍云熱淫於內以苦泄之酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒
○本草云主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結
○液云味苦寒陰中之陰藥泄滿推陳致新去陳垢而安五臟謂如戡定禍亂以致太平無異所以有

將軍之名。入手足陽明，以酒引之，上至高巔，以舟楫載之，胸中可浮，以苦泄之性峻至于下，以酒將之可行至高之分。若物在巔，人迹不及，必射以取之也。故太陽陽明、正陽陽明承氣湯中俱用酒浸，惟少陽陽明為下經，故小承氣湯中不用酒浸也。雜方有生用者，有麪裹蒸熟者，其製不等。

○衍義云：損益前書已具，仲景治心氣不足，吐血衄血，瀉心湯用大黃、黃芩、黃連，或曰心氣既不足矣，而不用補心湯，更用瀉心湯，何也？答曰：若心氣獨

不足，則須當不吐衄也。此乃邪熱因心氣不足而客之，故令吐衄，以苦泄其熱，就以苦補其心，蓋一舉而兩得之。有是證者用之無不效，惟在量其虛實而已。

○本草又云：惡乾漆。

連翹

氣平　味苦　苦微寒，氣味俱輕，陰中陽也

無毒

手足少陽經、陽明經藥

○象云：治寒熱瘰癧、諸惡瘡腫，除心中客熱，去胃蟲，通五淋。

○心云：瀉心經客熱，諸家須用，瘡家聖藥也。

○珍云：諸經客熱，非此不能除

○本草云：主寒熱，鼠瘻瘰癧、癰腫、癭瘤、結熱、蠱毒，去寸白蟲。

○液云：手足少陽，治瘡瘍瘤氣癭起結核，有神，與柴胡同功，但分氣血之異耳。與鼠粘子同用治瘡瘍，別有神功。

連軺

氣寒　味苦

○本經不見所註，但仲景古方所註云：即連翹之根也。方言熱者，即今之炒也。

人參

氣溫　味甘　甘而微苦，微寒，氣味俱輕，陽也

陽中微陰無毒

○象云：治脾肺陽氣不足，及能補肺，氣促短氣少氣，補而緩中，瀉脾肺胃中火邪，善治短氣，非升麻為

引用不能補上升之氣升麻一分人參三分爲相
得也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓爲之使
心云補氣不足而瀉肺火甘溫而補陽利氣脉不
足者是亡血也人參補之益脾與乾薑同用補氣
裏虛則腹痛此藥補之是補不足也
○珍云補胃喘嗽勿用短氣用之
○本草云主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣
明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿
霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘

液云味既甘溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰
也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則誤
矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺
爲天之地即手太陰也爲清肅之臟貴涼而不貴
熱其象可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒
無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心
腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中人參
補五臟之陽也沙參苦微寒補五臟之陰也安得
不異

○易老云用沙參代人參取其味甘可也
○葛洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如
絞自汗出欲死細末酒調服方寸匕立差
○日華子云治惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒
○海藏云今易老取沙參代人參取其甘也若微苦
則補陰甘者則補陽經雖云補五臟亦須各用本
臟藥相佐使隨所引而相輔一臟也不可不知

沙參

味苦甘 微寒 無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒 味辛平 苦而辛 辛厚苦輕陽中
陰也 生微寒 熟溫 有毒
入足陽明經太陰經少陽經
○象云治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除
胃寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除
○心云能勝脾胃之溼所以化痰渴者禁用
○珍云消胸中痞去膈上痰

○本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黄悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗去滑令盡用生薑等分製用能消痰涎開胃建脾射干爲之使惡皂莢畏雄黄生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

○藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡爲之使俗用爲肺藥非也止吐爲足陽明除痰爲足太陰小柴胡中雖爲止嘔亦助柴胡能止惡寒是又爲足少陽也又助黄芩能去熱是又爲足陽明也往來寒熱在表裏之中故用此有各半之意本以治傷寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化爲五溼自入爲唾入肝爲泣入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕有涎曰嗽無涎曰欬痰者因欬而動脾之溼也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流溼潤燥也

五味子

氣溫　味酸　陰中陽　酸而微苦

味厚氣輕陰中微陽　無毒

入手太陰經

入足少陰經

○象云大益五臟

○孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黄芪人參麥門冬少加黄蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力涌出生用

○珍云治欬嗽

○心云收肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則以此藥與乾薑同用治之

○本草云主欬逆上氣勞傷羸瘦補不足益氣強陰益精養五臟除熱

○日華子云明目煖水臟治風下氣消食霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨五味皮甘肉酸核中辛苦都有

鹹味，故名五味子。仲景八味丸用此為腎氣丸，述類象形也。

○孫真人云：六月常服五味子，以益肺金之氣，在上則滋源，在下則補腎，故入手太陰、足少陰也。

甘遂

氣大寒　味苦甘　甘純陽　有毒

○本草云：主大腹疝瘕，腹滿，面目浮腫，留飲宿食，破堅消積，利水穀道，下五水，散膀胱留熱，皮中痞熱氣腎滿。瓜蒂為使，惡遠志，反甘草。

○液云：可以通水，而其氣直透達所結處。

○衍義云：此藥專於行水攻決為用，入藥須斟酌用。

○珍云：若水結胸中，非此不能除。

大戟

氣大寒　味苦甘　陰中微陽　有小毒

○本草云：治蠱毒十二水，腹滿急痛積聚，中風皮膚疼痛，吐逆，頸腋癰腫，頭疼，發汗，利大小腸。此澤漆根也。

○液云：與甘遂同為泄水之藥，溼勝者苦燥除之，反甘草。與芫花、葶藶子等分，水糊為丸，桐子大，每服十丸。傷風傷寒，葱白湯下；傷食，陳皮湯下；或十五丸，微加至止，亦可。芫花別有條，海藏十棗湯同用。

○珍云：瀉肺，損真氣。

芫花

氣微寒　味苦辛　有毒

○本草云：主傷寒溫瘧，下十二水，破積聚大堅癥瘕，蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣，利水道，療痰飲欬嗽。

○衍義云：仲景以芫花治利者，以其行水也。水去則利止。其意如此。用時斟酌，不可太過與不及也。仍察其須有是證，方可用之。仲景小青龍湯若微利去麻黃，加芫花如雞子，熬令赤色，用之。蓋利水也。

海藻

氣寒　味鹹

○本草云：主癭瘤氣，頸下核，破散結氣，癰腫癥瘕堅氣，腹中上下鳴，下十二水腫，療皮間積聚暴㿉留氣熱結，利小便。

○珍云洗去鹹泄水氣

商陸根

氣平　味辛酸　有毒

○本草云主水脹滿瘕疝痹除癰腫殺鬼精物治胸中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣如人形者有神

○珍云辛酸同用導腫氣

旋覆花

氣溫　味鹹甘　冷利有小毒

○本草云主補中下氣消堅軟痞消胸中痰結吐如膠漆脇下膀胱留飲利大腸通血脈發汗吐下後心下痞噫氣不除者宜此

○仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除旋覆代赭湯

○胡洽治痰飲兩脇脹滿旋覆花丸用之尤佳

澤瀉

氣平　味甘　甘鹹寒味厚陰也降也陰中微陽

入足太陽經少陰經

○象云除溼之聖藥治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲

○心云去舊水養新水寒水氣須用

○珍云滲瀉止渴

○本草云治風寒溼痹乳難消水養五臟益氣力肥健補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止泄精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水

○扁鵲云多服病人眼

○衍義云其功尤長於行水

○仲景云水搐煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水故也仲景八味丸用之者亦不過接引桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止泄精多不敢用

○本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去胞中留垢以其味鹹能泄伏水故去留垢即胞

中陳積物也。入足太陽少陰。仲景治太陽中風入
裏濕者五苓散主之

紅豆

氣溫　味辛　無毒

○本草云主腸虛水瀉。心腹絞痛霍亂嘔吐酸水。解
酒毒。不宜多服令人舌麤不能飲食。

○液云是高良薑子。用紅豆復用良薑如用官桂復
用桂花同意

肉豆蔻

氣溫　味辛　無毒

入手陽明經

○本草云主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡
冷疰嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松

氣平　味甘溫　無毒

○本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮䵟䵳風疳齒
䘌。

蜀漆

氣微溫　味辛　純陽　辛平　有毒

○珍云破血

○心云洗去腥與苦酸同用導膽

○本草云主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪
氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣能吐出之

○成無己註云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黃

氣平　味甘　無毒

○本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又

云治一切吐衂唾溺崩瀉撲癥帶下等血並皆治
之并瘡癤通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻洪下乳
止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒
用

天門冬

氣寒　味微苦　苦而辛　氣薄味厚陰也甘
平大寒無毒陽中之陰

入手太陰經
足少陰經

象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪
爲主用之神效。
○心云苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天
門冬之功也。
○本草云主諸暴風溼偏痹強骨髓殺三蟲去伏尸
保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能
補久服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少
陰經榮衛枯涸溼劑所以潤之二門冬人參北五
味子枸杞子同爲生脉之劑此上焦獨取寸口之
意

○日華子云貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色
補五勞七傷治肺氣并欬消痰及風痹熱毒遊風
煩悶吐血去心用

麥門冬

氣寒 味微苦甘 微寒陽中微陰也無毒

入手太陰經

○象云治肺中伏火脉氣欲絶加五味子人參三味
爲生脉之劑補肺中元氣不足

○珍云行經酒浸湯浸去心治經枯
○心云補心氣不足及治血妄行補心不足
○本草云主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸瘦短
氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔
吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五
臟令人肥健美顏色有子地黃車前子爲之使惡
款冬花苦瓠畏苦參青蘘入手太陰
○衍義云治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專
收寒多人禁服治心肺虛熱及虛勞麥門冬地黃
麻仁阿膠潤經益血復脉通心二門冬五味子枸

杞子同爲生脉之劑

萎蕤

氣平 味甘 無毒

○本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足
心腹結氣虛熱溼毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚
出久服去面黑䵟
○心云潤肺除熱

茵蔯蒿

氣微寒 味苦平 陰中微陽 無毒

入足太陽經

○象云除煩熱主風溼熱邪結于內去枝梗用葉

○本草云主風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕入足太陽

○仲景茵蔯梔子大黃湯治溼熱也梔子蘗皮湯治燥熱也如苗澇則溼黃苗旱則燥黃溼則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祗和李思訓治陰黃茵蔯附子湯大抵以茵蔯為君主佐以大黃附子各隨其寒熱也

○珍云治傷寒發黃

艾葉

氣溫 味苦 陰中之陽 無毒

○本草云主下痢吐血下部䘌瘡辟風寒令人有子灸百病重午日日未出時不語採

○心云溫胃

白頭翁

氣寒 味辛苦 無毒有毒

○本草云主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄

○心云下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡王使者

百合

氣平 味甘 無毒

○本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚

○仲景治百合病百合知母湯百合滑石代赭石湯有百合雞子湯百合地黃湯或百合病已經汗者或未經汗下吐者或病形如初或病變寒熱並見

活人書治傷寒腹中疼百合一兩炒黃為末米飲調服

○孫真人云治百合陰毒煮百合濃汁服一升

茯苓

氣溫 味甘鹹酸 無毒

○本草云主五勞七傷補中除甚中寒熱痛養五臟

强陰益精氣多于婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身。

○液云命門相火不足以此補之。

玄參

氣微寒　味苦鹹　無毒

○象云足少陰腎經之君藥也治本經須用。

○本草云主腹中寒熱積聚女子産乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱肢滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩

渴

○易老云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒玄參升麻湯治汗下吐後毒不散則知為肅清樞機之劑以此論之治空中氤氳之氣無根之火以玄參為聖藥。

款冬花

氣温　味甘辛　純陽　無毒

○珍云温肺止嗽。

○本草云主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸杏仁為之使得紫菀良惡皂莢硝石玄參畏貝母辛夷麻黄黄芪黄芩黄連青箱

○藥性論云君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠黏肺痿肺癰吐膿

○日華子云潤心肺益五臟除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸

○衍義云有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其烟滿口則嚥之數日效

○時習云仲景射干湯用之。

紫參

氣微寒　味苦辛　無毒

○本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精。

○仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草三兩水五升煎紫參取二升却內甘草煎取半升分温三服

苦參

氣寒　味苦　氣沉　純陰

○心云除溼。

○本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身。

○衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛臍腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成

膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水下二十丸至三十丸次日便愈。

○時習云苦參揩齒久能病腰。

蘆根

氣寒　味甘

○本草云主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煮一盞去柤服無時

射干 又名烏扇

氣平　味苦微溫　有毒

○本草云主欬逆上氣喉閉咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣。

○衍義云治肺氣喉痺為佳。

○仲景治咽中動氣或閉塞烏扇湯中用。

○時習云仲景射干湯用之。

○心云去胃癰

敗醬

氣微寒平　味苦鹹　無毒

入足少陰經

手厥陰經

○本草云主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足産後疾痛。

○仲景治腹癰有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈。

敗蒲

氣平
○本草云主筋溢惡瘡
○藥性論云亦可單用主破血取蒲黃赤芍藥當歸
大黃朴硝同服治跌撲瘀血
○陳藏器云聖惠方治霍亂
莖葉
○液云同蘆笙大耳

防巳
氣寒 味大苦辛 苦陰也平無毒通行十二

經
○象云治腰以下至足溼熱腫盛脚氣補膀胱去留
熱通行十二經去皮用
○本草云主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療
水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣
急止泄散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九
竅
○藥性論云漢防巳君又云木防巳使畏女菀鹵鹹
去血中溼熱

牽牛
氣寒 味苦 有小毒黑白二種
○本草云主下氣療脚滿水腫除風毒利小便
○海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血
○張文懿云不可耽嗜脫人元氣余初亦疑此藥不
可耽嗜後見人有酒食病痞多服食藥以導其氣
及服藏用神芎丸及犯牽牛等丸如初服即快藥
過再食其病痞依然依前又服其痞隨藥而效藥
過後病復至以致久服則脫人元氣而猶不知悔

戒之惟當益脾建胃使元氣生而自能消腐水穀
其法無以加矣
○心云瀉元氣去氣中溼熱凡飲食勞倦皆血受病
若以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷
雖去瀉元氣損人不知也經所謂毋盛盛毋虛虛
毋絕人長命此之謂也用者戒之白者亦同
○羅謙甫云牽牛乃瀉氣之藥試取嘗之便得辛辣
之味久而嚼之猛烈雄壯漸漸不絕非辛而何續
註味苦寒果安在哉又曰牽牛感南方熱火之化

所生者也血熱瀉氣差誤已甚若病溼勝溼氣不得施化致大小便不通則宜用之耳溼去其氣周流所謂五臟有邪更相乘也經所謂一臟未平以所勝平之火能平金而瀉肺氣者即此也然仲景治七種溼證小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能瀉溼利小便為溼病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用如此世醫一槩而用之可乎又曰牽牛辛烈瀉人元氣比諸辛藥尤甚以辛之雄烈故也

三稜

氣平　味苦　陰中之陽　無毒

○象云治老癖癥瘕結塊婦人血脉不調心腹刺痛須炮用

○珍云破積氣損真氣虛者勿用

○液云又治氣脹血脉不調補五勞通月經消瘀血色白破血中之氣

蓬莪茂

氣溫　味苦辛　無毒

○象云治心膈痛飲食不消破痃癖氣最良炮用

○本草云治婦人血氣丈夫賁豚治心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服

○液云色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫用和治氣短不能接續所以大小七香丸集香丸散及湯內多用此也

草龍膽

氣寒　味大苦　氣味俱厚陰也　無毒

○珍云純陰酒浸上行

○心云除下焦之溼及翳膜之溼

○象云治兩目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛不可忍以柴胡為主治眼中疾必用之藥也去蘆

瓜蔞根

氣寒　味苦　味厚陰也　無毒

○本草云主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒瘀血及熱狂

○心云止渴行津液苦寒與辛酸同用導腫氣

○珍云苦純陰若心中枯濁者非此不能除

地榆

氣微寒　味甘酸　苦而酸氣味俱厚陰也

○本草云主婦人乳產七傷帶下月水不止血崩之疾除惡血止疼痛腸風泄血

○象云治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆

心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之

○珍云陽中微陰治下部血

紫草

氣寒　味苦　無毒

○本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道治腹腫脹滿去土用茸

茜根

味苦　陰中微陽

○珍云去諸死血

○藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

○日華子云止鼻洪月經不止

菊花

苦而甘寒　無毒

○心云去翳膜明目

○珍云養目血

○藥性論云使治身上諸風

○日華子云治四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶

葶藶

氣大寒　味苦辛　無毒

○本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱癢利小便久服令人虛又云療肺壅上氣欬嗽定喘促除胸中痰飲

○液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本草雖云治同甜苦之味安得不異榆白皮為之使惡殭蠶石龍芮仲景葶藶大棗瀉肺湯用之

王不留行

味苦　陽中之陰甘平　無毒

○珍云下乳引導用之。
○藥性論云治風毒通血脉。
○日華子云治遊風風疹婦人月經不勻。

通草

氣平　味甘辛　陽也　無毒燈草同
○象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用
○珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血
○日華子云明目退熱催生下胞下乳。

本通

氣平　味甘　甘而淡性平味薄陽也無毒
○象云主小便不利導小腸熱去皮用
○心云通經利竅
○本草云除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘散癰腫諸結不消墮胎去蟲

瞿麥

氣寒　味苦辛　陽中微陰也
○象云主關格諸癃結小便不通治癰腫排膿明目去翳破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗
○珍云利小便為君主之用。
○本草云出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

車前子

氣寒　味甘鹹　無毒
○象云主氣癃閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝目赤痛
○本草云主氣癃止痛利水道通小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目治目熱赤痛輕身耐老。

○東垣云能利小便而不走氣與茯苓同功。

石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤姑存之名遠罨子血見愁鹿經草也。
○時習云今一種作青莕帶名蟻子槐作血見愁又隰州鼓角樓上一種名血見愁但能破瘀血時習補或人言紫花如旋風草但花不白又有一種花黃葉似槐結角如菉豆俗呼夾竹梅

○局方本草。石韋味苦甘平無毒。主勞熱邪氣五癃閉不通。利小便水道。止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟。去惡風。益精氣。
○藥性論云。使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿
○日華子云。治淋遺溺。杏仁爲之使。得菖蒲良。生華陰。又有生古瓦屋上者。名瓦韋。用治淋亦佳。

白附子
陽微溫

○珍云。主血痺。行藥勢。
○本草云。主心痛血痺。面上百病。行藥勢。

胡蘆巴
苦純陰
珍云。治元氣虛冷及腎虛冷。
○本草云。得桃香子。桃仁。治膀胱甚效。腹脇脹滿。面色青黑。此腎虛證也。

馬兜鈴
苦陰中微陽　味苦寒　無毒
○珍云。去肺熱。安肺氣。補肺
○本草云。主欬嗽痰結。
○藥性論云。平能主肺氣上急。坐息不得。主欬逆連連不可。
○日華子云。治痔瘻瘡。以藥瓶中燒熏病處。入藥炙用。是土青木香獨行根子也
○聖惠方。治五種蠱毒。
○圖經云。亦名土青木香。實主肺病。根治氣下膈止刺痛。

白芨
苦甘　陽中之陰　味辛苦平微寒　無毒
○珍云。止肺血。白歛治證同。
○本草云。主癰腫惡瘡敗疽。傷陰死肌。胃中邪氣賊風鬼擊。痱緩不收。白癬疥蟲。
○藥性論云。使治熱結不消。主陰下痿。治面上皯皰

天南星
味苦辛　有毒
○珍云。治同半夏。

○陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根搗傅傷處

○日華子云味辛烈治撲損瘀血主蛇蟲咬傅疥癬毒瘡

鬱金

味辛苦 純陰

○珍云涼心

○局方本草鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

○藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚溫醋摩服

○經驗方云尿血不定鬱金葱白相和煎服效

○本草云生蜀者佳胡人謂之馬蒁亦啖馬藥用治脹痛破血而補

佛耳草

氣熱 味酸

○象云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用款冬花爲使過食損目

蛇牀

味苦辛甘平無毒

○本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟蛇米五月採陰乾惡牡丹巴豆貝母

湯液本草卷之四

湯液本草卷之五

元　古趙　海藏王好古進之甫集
明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫校

木部

桂 桂心　肉桂　桂枝附

氣熱　味甘辛　有小毒

入手少陰經

桂枝入足太陽經

○本草云。主溫中。利肝肺氣。心腹寒熱冷疾。霍亂轉筋頭痛腰痛。出汗止煩。止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脈理疎不足宣導百藥無所畏久服神僊不老。生桂陽二月八月十月採皮陰乾有菌桂牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所言不知何緣而得官之名予考本草有出觀賓宜韶欽諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也。如寫黃蘗作黃柏薑作姜同意菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷。木桂生桂陽從嶺至海盡有桂樹惟柳州象州最多。本草所

說菌桂牡桂板桂厚薄不同。大抵細薄者為枝為嫩厚脂者為肉為老處其身者為中也不必黃色為桂心。但不用皮與裏。止用其身中者為桂心。不經水而味薄者亦名柳桂。易老用此以治虛人使不生熱也。衍義謂桂大熱。素問謂辛甘發散為陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛。皆須此藥。是專用辛甘之意也。又云療寒以熱。故知三種之桂。不取菌桂牡桂者。蓋此二種性止溫而已。不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂牡桂不及也。然本經止言桂而仲景又言桂枝者。蓋亦取其枝上皮也。其本身麤厚處亦不中用諸家之說。但各執一己見。終無證據今又謂之官桂。不知何緣而立名慮後世以為別物故於此書之。又有桂心。此則諸桂之心不若一字桂也。別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳藏器之說最是。然筒桂厚實氣味厚重者宜入治臟及下焦藥。輕薄者宜入治眼目發散藥本經以菌桂養精神。以牡桂利關節。仲景

傷寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身榦也取其輕薄而能發散。一種柳桂。乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之自然性分之所不可移也。一有差易爲效彌遠歲月既久習以成弊宜後世之不及古也桂心通神不可言之至於諸桂數等皆大小老壯之不同觀作官也本草所言有小毒或云久服神僊不老。雖云小毒亦從類化與黃芩黃連爲使。小毒何施。與烏附爲使。止是全得熱性若與有毒者同用則小毒既去大毒轉甚與人參麥門冬甘草同用能調中益氣則可久服可知此藥能護榮氣而實衛氣則在足太陽經也桂心入心則在手少陰也若指榮字立說止是血藥故經言通血脉也若與巴豆硇砂乾漆川山甲水蛭虻蟲如此有毒之類同用則小毒化爲大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時爲

禁藥。

○珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也。

○心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表。內寒則肉桂。補陽則柳桂。桂辛熱散經寒。引導陽氣若正氣虛者以辛潤之散寒邪治奔豚。

栢子仁

氣平 味甘辛 無毒

○本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生。令人潤澤美顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也。

○藥性論云栢子仁君惡菊花畏羊蹄草能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水。興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅。主小兒驚癇。栢子仁古方十精丸用之。

側栢葉

氣微溫 味苦 無毒

○本草云主吐血衄血及痢血崩中赤白。輕身益氣令人耐寒暑。

○藥性論云側栢葉苦辛性澀治冷風歷節疼痛止尿血與酒相宜

柏皮

○本草云：柏白皮主火灼爛瘡。長毛髮。

槐實

味苦酸鹹寒 無毒

○珍云：與桃仁治證同。

○藥性論云：臣。治大熱難產。皮煮汁。淋陰囊墜腫氣痛。又槐白皮治口齒風疳

○日華子云：槐子治丈夫女人陰瘡濕痒。催生吞七枚。皮治中風皮膚不仁。喉痺。洗五痔產門痒痛及

湯火瘡。煎膏止痛長肉消癰腫。

○別錄云：八月斷槐大枝使生嫩蘗。煮汁釀酒。療大風痿痺甚妙。槐耳主五痔心痛。女人陰中瘡痛。景天可之使。槐花味苦無毒。治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱。治皮膚風腸風瀉血赤白痢。槐膠主一切風。化痰。治肝臟風筋脈抽掣急風口噤四肢不收頑皮或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬。槐葉平無毒煎湯洗小兒驚癇壯熱疥癬丁瘡皮莖同用良

槐花

苦薄陰也

珍云：涼大腸熱。

蔓荊子

氣清 味辛溫苦甘 陽中之陰

太陽經藥

○象云：治太陽經頭痛頭昏悶。除目暗散風邪藥。胃虛人勿服恐生痰疾。揀淨杵碎用。

○珍云：涼諸血止頭痛主目睛內痛

○本草云：惡烏頭石膏。

大腹子

氣微溫 味辛無毒

○本草云：主冷熱氣攻心腹。大腸蠱毒痰膈醋心。並以薑鹽同煎時習謂是氣藥也。

○孫真人云：先酒洗後大豆汁洗。仲景用。

○日華子云：下一切氣。止霍亂。通大小腸健脾開胃調中。

酸漿

氣平 味酸 無毒

○本草云主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五臟輕身延年。

○胡洽治振悸不得眠人參白朮白伏苓甘草生薑酸棗仁六物煮服。

○聖惠方膽虛不眠寒也酸棗仁炒香竹葉湯調服。

○濟衆方膽實多睡熱也酸棗仁生用末茶薑汁調

服。

胡椒

氣溫 味辛 無毒

○本草云主下氣溫中去痰除臟腑中風冷向陽者爲胡椒向陰者爲蓽澄茄胡椒多服損肺味辛辣力大於漢椒。

○衍義云去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之。

川椒

氣熱溫 味大辛 辛溫大熱有毒

○象云主邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目利五臟須炒去汗

○心云去汗辛熱以潤心寒。

○本草云主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢泄精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒耐寒暑開腠理閉口者殺人惡括蔞防葵畏雌黃

吳茱萸

氣熱 味辛苦 氣味俱厚陽中陰也辛溫大熱 有小毒

入足太陰經少陰經厥陰經

○象云食則令人口開目瞪寒邪所隔氣不得上下。此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不可代也洗去苦味日乾杵碎用。

○心云去胸中逆氣不宜多用辛熱恐損元氣。

○珍云溫中下氣溫胃。

○本草云主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五臟入足太陰少陰厥陰震坤合見其色綠

○仲景云吳茱萸湯當歸四逆湯大溫脾湯及脾胃藥皆用此也

○衍義云此物下氣最速腸虛人服之愈甚麥實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英

山茱萸

氣平微溫　味酸　無毒

入足厥陰經少陰經

○本草云主溫中逐寒濕痺強陰益精通九竅止小便入足少陰厥陰

○聖濟經云滑則氣脫澁劑所以收之山茱萸之澁以收其滑仲景八味丸用爲君主如何澁劑以通九竅

○雷公云用之去核一斤取肉四兩緩火熬用能壯元氣秘精核能滑精故去之

○珍云溫肝

○本經云止小便利以其味酸也觀八味丸用爲君主其性味可知矣

○藥性論亦云補腎添精

○日華子亦云暖腰膝助水臟也

益智

氣熱　味大辛　辛溫無毒

主君相二火手足太陰經

足少陰經

本是脾經藥

○象云治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當於補中藥內兼用之勿多服去皮用

○本草云主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同煎服有神效

○液云主君相二火手足太陰足少陰本是脾藥在集香丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入腎脾肺腎互有子母相關

厚朴

氣溫　味辛　陽中之陰　苦而辛　無毒

○象云能治腹脹若虛弱雖腹脹宜斟酌用之寒脹是大熱藥中兼用結者散之神藥誤用脫人元氣切禁之紫色者佳去皮薑汁製微炒

○珍云去腹脹厚腸胃

○心云味厚陰也專去腹脹滿去邪氣

○本草云主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止泄痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃

○本經云治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹脹滿果泄氣乎果益氣乎若與枳實大黃同用則能泄實滿本經謂消痰下氣者是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿本經謂溫中益氣者是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與痢藥同用則厚腸胃大抵苦溫用苦則泄用溫則補

○衍義云平胃散中用之最調中至今盛行既能溫脾胃又能走冷氣

○海藏云加減隨證如五積散治療同

○本草又云乾薑爲使惡澤瀉寒水石硝石

丁香

氣溫　味辛　純陽　無毒

入手太陰經

足陽明經少陰經

○象云溫脾胃止霍亂消痃癖氣脹反胃腹內冷痛壯陽暖腰膝殺酒毒

○珍云去胃中之寒

○本草云主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫牙齒疳䘌能發諸香能療反胃腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖腰膝消痃癖除冷勞

○液云與五味子廣茂同用亦治奔豚之氣能泄肺能補胃大能療腎

沉香

氣微溫　陽也

○本草云治風水腫毒去惡氣能調中壯陽暖腰膝

破癥癖冷風痲痺骨節不任濕風皮膚痒心腹疼
氣痢止轉筋吐瀉。
○東垣云能養諸氣上而至天下而至泉用為使最
相宜
○珍云補右命門

乳香
苦陽
○珍云定諸經之痛。

藿香

氣微溫 味甘辛 陽也甘苦純陽 無毒
入手足太陰經
○象云治風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去枝
梗用葉。
○心云芳馨之氣助脾開胃止嘔。
○珍云補衛氣益胃進食
○本草云主脾胃嘔逆療風水毒腫去惡氣療霍亂
心痛溫中快氣治口臭上焦壅煎湯漱口入手足
太陰入順氣烏藥則補肺入黃芪四君子湯則補
脾

檀香
氣溫 味辛熱 無毒
入手太陰經
足少陰經
通行陽明經藥
○本草云主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲又云治腎
氣諸痛腹痛消熱腫。

○東垣云能調氣而清香引芳香之物上行至極高
之分最宜橙橘之屬佐以薑棗將以葛根豆蔻縮
砂益智通行陽明之經在胸膈之上處咽嗌之中
同為理氣之藥
○珍云主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食。

蘇合香
味甘溫 無毒
○本草云主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲
除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺
川谷。

○禹錫云按梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁
煎之非自然一物也

檳榔

氣溫　味辛苦　味厚氣輕陰中陽也純陽

無毒

○象云治後重如神性如鐵石之沉重能墜諸藥至
於下極杵細用

○心云苦以破滯辛以散邪專破滯氣下行

○珍云破滯氣泄胸中至高之氣

○本草云主消穀逐水除痰癖下三蟲去伏尸療寸
白蟲

梔子

氣寒　味微苦　味苦性大寒味薄陰中陽也

無毒

入手太陰經

○象云治心煩懊憹而不得眠心神顛倒欲絕血滯
小便不利杵細用

○心云去心中客熱除煩躁與豉同用

○珍云止渴去懊憹煩躁

○本草云主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白
癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中
煩悶胃中熱氣

○仲景用梔子治煩胸爲至高之分也故易老云輕
浮而象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草
不言吐仲景用此爲吐藥梔子本非吐藥爲邪氣
在上拒而不納故令上吐邪因得以出經曰其高
者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利

小便淸肺也肺氣淸而化膀胱爲津液之府小便
得此氣化而出也本經謂治大小腸熱辛與庚合
又與丙合又能泄戊其先入中州故也入手太陰
梔子豉湯治煩躁煩者氣也躁者血也氣在肺血
主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁躁者
懊憹不得眠也少氣虛滿者加甘草若嘔噦者加
生薑橘皮下後腹滿而煩梔子厚朴枳實湯下後
身熱微煩梔子甘草乾薑湯梔子大而長者染色
不堪入藥皮薄而圓七稜至九稜者名山梔子所

謂越桃者是也。

○衍義云仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹以梔子豉湯治虛煩故不用大黃以有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑臟無潤養內生虛熱非此不可除又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火煨大黃連翹甘草炙等分末之水煎三錢七服之者無不效。

○仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵

陳香豉甘草四物等分作湯飲之又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並利小便而愈其方極多不可悉載用仁去心胸中熱用皮去肌表熱。

黃蘗

氣寒 味苦 苦厚微辛陰中之陽降也

無毒

入太陽經引經藥

足少陰經之劑

○象云治腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力於黃芪湯中少加用之使兩膝中氣力湧出痿即去矣蜜炒此一味為細末治口瘡如神瘫瘓必用之藥

○珍云瀉膀胱之熱利下竅。

○心云太陽經引經藥瀉膀胱經火補本經及腎不足苦寒安蛔療下焦虛堅腎經曰苦以堅之

○本草云主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

○液云足少陰劑腎苦燥故腎停濕也梔子黃芩入

肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也活人書解毒湯上下內外通治之。惡乾漆

枳實

氣寒 味苦酸鹹 純陰 無毒

○象云除寒熱破結實消痰癖治心下痞逆氣脇痛。麩炒用。

○心云潔古用去脾經積血故能去心下痞脾無積血則心下不痞治心下痞散氣消宿食苦寒炙用破水積以泄裏除氣

○珍云去胃中濕。
○本草云主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏泄明目生河內川澤商州者佳益氣則佐之以人參乾薑白朮破氣則佐之以大黃牽牛芒硝此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞殼主高而實主下高者主氣下者主血主氣者在胸膈主血者在心腹仲

景治心下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯主之。枳實七枚朮二兩水一斗煎取三升分三服腹中軟即消
○衍義云枳實枳殼一物也小則性酷而速大則性詳而緩故仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之意他方但導敗風壅之氣可常用者故用枳殼故胸中痞有桔梗枳殼湯心下痞有枳實白朮湯高低之分易老詳定爲的也。

枳殼

氣寒　味苦　苦而酸微寒　味薄氣厚陽也
陰中微陽　無毒
○象云治脾胃痞塞泄肺氣麩炒用。
○心云利胸中氣勝濕化痰勿多用損胸中至高之氣。
○珍云破氣
○本草云主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止

風痛
○藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡痒殼高主皮毛胸膈之病實低主心胃之病。其主治大同小異

牡丹皮

氣寒　味苦辛　陰中微陽辛苦微寒　無毒
手厥陰經
足少陰經
○象云治腸胃積血及衄血吐血必用之藥。

○珍云涼骨熱。

○本草云。主寒熱中風瘈瘲痙驚癎邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞之氣腰痛風噤癲疾。

○易老云治神志不足。神不足者手少陰志不足者腎少陰故仲景八味丸用之牡丹乃天地之精羣花之首。葉為陽發生。花為陰成實丹為赤卽火故能瀉陰中之火。牡丹皮手厥陰足少陰治無汗骨蒸地骨皮足少陰手少陽治有汗骨蒸也。

地骨皮

氣寒　味苦　陰也大寒　無毒

足少陰經

手少陽經

○象云解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用根皮。

○心云去肌熱及骨中之熱

○珍云涼血涼骨。

○本草云。主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸。

○藥性論云根皮細剉麪拌熟煑吞之主腎家風益精氣。

○衍義云枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其經實實微寒。皮寒根大寒。

猪苓

氣平　味甘苦甘寒　甘苦而淡甘重於苦陽也　無毒

入足太陽經少陰經

○象云除濕比諸淡滲藥大燥亡津液無濕證勿服去皮用。

○心云苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便

○珍云利小便

○本草云主痎瘧解毒蠱疰不祥利水道能療妊娠淋又治從脚上至腹腫。小便不利仲景少陰渴者猪苓湯。入足太陽少陰。

衍義云行水之功多久服必損腎氣昏人目若欲
久服者更宜詳審

茯苓

氣平　味淡　味甘而淡陽也　無毒

白者入手太陰經足太陽經少陽經

赤者入足太陰經手太陽經少陰經

○象云止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血爲主治小便不通溺黃而赤或不利如小便利或數服之則大損人目如汗多人服之損眞氣夭人壽醫云赤瀉白補上古無此說去皮用

○心云淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥也味甘平補陽益脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也治水緩脾生精導氣

○珍云甘純陽滲泄止渴

○本草云主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝消膈中痰水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神守中

○液云入足少陰手足太陽色白者入辛壬癸赤者入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澁能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明硃砂同用能秘眞味甘平如何是利小便

茯神

陽也　味甘　無毒

○珍云治風眩心虛非此不能安

○藥性論云君主驚癇安神定志補虛乏主心下急痛堅滿人虛而小便不利者

烏藥

氣溫　味辛　無毒

入足陽明經少陰經

○本草云主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲又云去猫涎極妙烏藥葉及根嫩時採作茶片炙展煎服能補中益氣偏止小便滑數

乾漆

氣溫平　味辛　無毒有毒

○本草云主經傷補中續筋骨塡髓腦安五臟治五緩六急風寒濕痺瘀欬嗽消瘀血痞結腰痛女子痂瘕利小腸去蚘蟲主漆去長蟲乍夏爲之使畏雞子忌油脂

皂莢

氣溫　味辛鹹　有小毒

引入厥陰經藥

○本草云主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺腹脹滿消穀除欬嗽治囊縮婦人胞不落明目益精

可爲沐藥不入湯

○日華子云通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃破堅癥腹中痛能墮胎栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參

○仲景治欬逆上氣唾濁但坐不得臥皂莢丸主之杵末一物蜜丸桐子大用棗湯服一丸日三夜一

○活人書治陰毒正陽散內用皂莢引入厥陰也用之有蜜炙酥炙燒灰之異等分依方

竹葉

氣平　味辛又苦大寒　辛平無毒

○本草云主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐仲景竹葉湯用淡竹葉

○心云除煩熱緩皮而益氣

○珍云陰中微陽涼心經

竹茹

氣微寒　味苦

○本草云止嘔噦溫氣寒熱吐血崩中溢筋

淡竹葉

氣寒　味辛平

○本草云主胸中痰熱欬逆上氣

○藥性論云淡竹葉主吐血熱毒風壓丹石藥毒止渴

○日華子云淡竹及根消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷孕婦人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癎天弔茎葉同用見局方本草今錄附于此

茗苦茶

氣微　味苦甘　無毒

入手足厥陰經

○液云臘茶是也清頭目利小便消熱渴下氣消食令人少睡中風昏憒多睡不醒宜用此入手足厥陰茗苦茶苦甘微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴治陰證湯藥內用此去格拒之寒及治伏陽大意相似茶苦經云苦以泄之其體下行如何是清頭目

秦皮

氣寒　味苦　無毒

○液云主熱利下重下焦虛經云以苦堅之故用白頭翁黃蘗秦皮苦之劑也治風寒濕痺目中青瞖白膜男子少精婦人帶下小兒驚癇宜作湯洗目俗呼為白樳木取皮漬水浸出青藍色與紫草同用以增光暈尤佳大戟為之使惡吳茱萸

桑白皮

氣寒　味苦酸　甘而辛　甘厚辛薄　無毒

入手太陰經

○象云主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺氣止唾血熱渴消水腫利水道

○心云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘

○本草云治傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可縫金瘡出土者殺人續斷麻子桂心為之使忌鐵鉛

梓白皮

氣寒　味苦　無毒

○本草云主熱去三蟲治目中疾生河內山谷今近道皆有之木似梧桐

紫葳 即凌霄花

氣微寒　味酸　無毒

○本草云主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痿蹷益氣

○日華子云根治熱風身痒遊風風疹治瘀血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒齄熱毒風刺婦人血膈遊風崩中帶下

○衍義云木也紫威花是也畏鹵鹹。

訶黎勒

氣溫　味苦　苦而酸性平　味厚陰也降
也苦重酸輕　無毒

○象云主腹脹滿不下飲食消痰下氣通利津液破胸膈結氣治久痢赤白腸風去核搗細用。

○心云經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用俗名訶子隨風子。

○本草云主冷氣心腹滿下食仲景治氣痢以訶黎勒十枚麪裹塘灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末和粥飲頓服。

○衍義云氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物能澁腸而又泄氣蓋其味苦澁故爾其子未熟時風飄墮者謂之隨風子。

杜仲

味辛甘平溫無毒陽也降也

○本草云主腰脊痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下濕痒小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老惡蛇脫皮玄參。

○日華子云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用。

琥珀

氣平　味甘　陽也

○珍云利小便清肺

○本草云安五臟定魂魄消瘀血通五淋杵細用

○藥性論云君治産後血疹痛

○日華子云療蠱毒壯心明目磨翳止心痛癲邪破癥結

郁李仁

味苦辛　陰中之陽　辛苦陰也

○珍云破血潤燥。

○本草云郁李根二齒斷腫齲齒堅齒去毒蟲。

○藥性論云根治齒痛宜結氣破積聚

○日華子云根涼無毒治小兒發熱作湯浴風蚛牙濃煎含之。

巴豆

氣溫　味辛　生溫熟寒　有大毒

○本草云主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰㿉殺斑猫毒健脾開胃

○易老云斬關奪門之將大宜詳悉不可輕用

○雷公云得火則良若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用可以通腸可以止泄世所不知也仲景治百病客忤備急丸主之巴豆杏仁例及加減寒熱佐使五色并餘例並見元戎

○珍云去胃中寒濕

芫花

氣溫　味辛苦　有小毒

○本草云主欬逆上氣喉鳴喘急咽腫短氣蠱毒鬼瘧癰腫疝瘕殺蟲魚消胸中痰水喜去聲水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛

仲景治太陽中風脇下痛嘔逆者可攻十棗湯主之

○液云胡洽治痰癖飲癖加以大黃甘草五物同煎以相反主之欲其大吐也治之大略水者肺腎胃三經所主有五藏六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰臍外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之異不可輕瀉當知病在何經何藏誤用則害深然大意泄濕內云五物者即甘遂大戟芫花大黃甘草也

蘇木

氣平　味甘鹹　甘而酸辛性平

甘勝於酸辛　陽中之陰無毒

○本草云主破血產後血脹悶欲死者排膿止痛消癰腫瘀血婦人月水不調及血暈口噤

○心云性平甘勝於酸辛去風與防風同用

○珍云破死血

川練子

氣寒　味苦平　有小毒

○本草云治傷寒大熱煩燥殺三蟲疥瘍利小便於
細用
○珍云入心主上下部腹痛
金鈴子
酸苦　陰中之陽
○珍云心暴痛非此不能除即川楝子也
沒藥
味苦平　無毒
○本草云主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒

下血目中瞖暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊
大小不定黑色
胡桐淚
味鹹
○珍云瘰癧非此不能除
○本草云味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水
和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研二三兩灌
之立瘥
○日華子云治風蚛牙齒痛殺火毒并麪毒

○海藥云主風疳䘌齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切
物多服令人吐也又爲金銀銲藥
桑東南根
○時習云根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及
傅鵝口瘡大效
果部
大棗
氣溫　味甘　氣厚陽也　無毒
○珍云味甘補經不足以緩陰血

○液云主養脾氣補津液強志三年陳者核中仁主
腹痛惡氣卒疰忤治心懸經云助十二經脈治心
腹邪氣和百藥通九竅補不足氣生者多食令人
腹脹注泄蒸熟食補腸胃肥中益氣中滿者勿食
甘甘者令人中滿故大建中湯心下痞者減餳棗
與甘草同例
生棗
味甘辛
○多食令人多寒熱羸瘦者不可食并覆麻黃能令

出汗生河東平澤殺烏頭毒

陳皮

氣溫　味微苦　辛而苦　味厚陰也　無毒

象云能益氣加青皮減半去滯氣推陳致新若補脾胃不去白若調理胸中肺氣須去白

心云導胸中滯氣除客氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃然勿多用也

珍云益氣利肺有甘草則補肺無甘草則瀉脾

本草云主胸中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除

膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止瀉去寸白蟲能除痰解酒毒海藏治酒毒葛根陳皮茯苓甘草生薑湯手太陰氣逆上而不下宜以此順之陳皮白檀為之使其芳香之氣清奇之味可以奪橙也

青皮

氣溫　味辛　苦而辛性寒氣厚陰也

足厥陰經引經藥

又入手少陽經

象云主氣滯消食破積結膈氣去穢

心云厥陰經引經藥也有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣

液云主氣滯下食破積結及膈氣或云與陳皮一種青皮小而未成熟成熟而大者橘也色紅故名紅皮日久者佳故名陳皮如枳實枳殼一種實小而青未穰殼大而黃紫色已穰故殼高而治胸膈實低而治心下與陳皮治高青皮治低同意又云陳皮青皮二種枳實枳殼亦有二種

桃仁

氣溫　味苦甘性平　苦重於甘陰中陽也

無毒

入手足厥陰經

象云治大便血結血秘血燥通潤大便七宜丸中專治血結破血以湯浸去皮尖研如泥用

心云苦以泄滯血甘以利新血故疑血須用又去血中之熱

本草云主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲止欬逆上

氣消心下堅除卒暴擊血通月水止痛破血入手足厥陰

○衍義云老人虛秘與栢子仁大麻仁松子仁等分同研鎔白蠟和丸如桐子大以少黃丹湯下仲景治中焦畜血用之

杏仁

氣溫　味甘苦冷利　有小毒

入手太陰經

○象云除肺燥治風燥在胸膈間麩炒去皮尖用

○心云散結潤燥散肺之風及熱是以風熱嗽者用之

○本草云主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒破氣入手太陰王朝奉治傷寒氣上喘衝逆者麻黃湯內加杏仁陳皮若氣不喘衝逆者減杏仁陳皮知其能瀉肺也

○東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也桃杏仁俱治大便秘當以氣血分之晝則難便行陽氣也夜則難便行陰血也大腸雖屬庚爲白腸以晝夜言之氣血不可不分也年虛人大便燥秘不可過泄者脉浮在氣杏仁陳皮脉沉在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以其手陽明病與手太陰俱爲表裏也賁門上主往來䰟門下主收閉故王氏言肺與大腸爲通道也

烏梅

氣平　味酸　酸溫陽也　無毒

○象云主下氣除熱煩滿安心調中治痢止渴以鹽

爲白梅亦入除痰藥去核用

○心云收肺氣

○本草云主肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣惡疾止下痢好唾口乾去骨間熱又方治一切惡瘡肉出以烏梅燒爲灰杵末傅上惡肉立盡仲景治吐蚘下利烏梅丸

木瓜

氣溫　味酸

入手足太陰經

○本草云治脚氣濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止益肺而去濕和胃而滋脾。

○衍義云木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則失酸味受金制也此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可缺也。

○東垣云氣脫則能收氣滯則能和。

○雷公云調榮衛助穀氣是也。

甘李根白皮

○時習云根皮大寒主消渴止心煩氣逆奔豚仲景奔豚湯中用之。

湯液本草卷之五終

湯液本草卷之六

元 古趙 海藏王好古進之甫集
明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫校

菜部

荆芥穗

氣溫 味辛苦

○本草云辟邪毒利血脈通宣五臟不足氣能發汗除勞渴杵和醋封毒腫去枝梗手搓碎用治瘡後血暈如神動渴疾多食薰五臟神破結氣。

生薑

氣溫 味辛 辛而甘微溫 氣味俱輕陽也

無毒。

○象云主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐治痰嗽生與乾同治與半夏等分治心下急痛剉細用

○心云能制半夏厚朴之毒發散風寒益元氣大棗同用辛溫與芍藥同用溫經散寒嘔家之聖藥也辛以散之嘔爲氣不散也此藥能行陽而散氣。

○珍云益脾胃散風寒久服去臭氣通神明。

○孫眞人云爲嘔家之聖藥
或問東垣曰生薑辛溫入肺如何是入胃口曰俗皆以心下爲胃口者非也咽門之下受有形之物係胃之系便爲胃口與肺同處故入肺而開胃口也又問曰人云夜間勿食生薑食則令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反食之開發其氣則違天道是以不宜食此以平人論之可也若有病則不然薑屑比之乾薑不熱比之生薑不潤以乾生薑代乾薑者以其不僭故也

本草云秦椒爲之使殺半夏莨宕毒惡黃芩黃連天鼠糞

乾薑

氣熱 味大辛 辛大熱 味薄氣厚陽中之陽也 辛溫無毒

○象云治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子爲引用水煎二物名薑附湯亦治中焦有寒水洗慢火炮

○心云發散寒邪如多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱散裏寒散陰寒肺寒與五味同用治嗽以勝寒蛔正氣虛者散寒與人參同補藥溫胃腹中寒其平以辛熱

○珍云寒淫所勝以辛散之經炮則味苦

○本草云主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下利寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良主胸滿溫脾燥胃所以理中其實主氣而泄脾

○易老云乾薑能補下焦去寒故四逆湯用之乾薑

本味辛及見火候稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用此者以其四順也

○或云乾薑味辛熱人言補脾今言泄而不言補者何也東垣謂泄之一字非泄脾之正氣也是泄脾中寒濕之邪故以薑辛熱之劑燥之故曰泄脾也

薄荷

氣溫 味辛苦 辛涼 無毒

手太陰經厥陰經藥

○象云能發汗通骨節解勞乏與薤相宜新病瘥人
勿多食令虛汗出不止去枝梗搓碎用
○心云上行之藥
○陳士良云能引諸藥入榮衛又主風氣壅併
葱白
氣溫　味辛　無毒
入手太陰經
足陽明經
○液云以通上下之陽也活人書傷寒頭痛如破連

鬚葱白湯主之
○心云通陽氣辛而甘氣厚味薄陽也發散風邪
○本草云葱實主明目補中不足其莖白平可作湯
主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺
不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臓益目精殺
百藥毒葱根主傷寒頭痛葱汁平溫主溺血解藜
蘆毒
韭白
氣溫　味辛微酸　無毒

○本草云歸心安五臓除胃中熱利病人可久食子
主夢泄精溺白根養髮陰物變為陽
薤白
氣溫　味苦辛　無毒　入手陽明經
○本草云主金瘡瘡敗輕身不饑耐老除寒熱去水
氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以此塗之
下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯
○心云治泄痢下重下焦氣滯泄滯氣
瓜蒂

氣寒　味苦　有毒
○本草云治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆
上氣及食諸果病在胸腹中者皆吐下之去人中
息肉療黃疸鼻中出黃水除偏頭疼有神頭目有
濕宜此瓜蒂苦以治胸中寒與白虎同例俱見知
母條下與麝香細辛同為使治久不聞香臭仲景
紛方瓜蒂一十四箇丁香一箇黍米四十九粒為
末含水搐一字取下
冬葵子

氣寒　味甘　無毒
○本草云主五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅筋骨長肌肉輕身
○衍義云性滑利不益人患癰癤毒熱內攻未出膿者水吞三五粒遂作竅膿出

蜀葵花

冷陰中之陽
○珍云赤者治赤帶白者治白帶赤治血燥白治氣燥

香薷

味辛微溫
本草云主霍亂腹痛吐下散水腫

炊單布

○液云仲景治墜馬及一切筋骨損方中用時習補入

米部

粳米

氣微寒　味甘苦　甘平無毒
入手太陰經少陰經
○液云主益氣止煩止渴止泄與熟雞頭相合作粥食之可以益精强志耳目聰明本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用之入肺以其陽明為胃之經色為西方之白故入肺也然治陽明之經即在胃也色白味甘寒入手太陰又少陰證桃花湯用此甘以補正氣竹葉石膏湯用此甘以益不足之氣
○衍義云平和五臟補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳

赤小豆

氣溫　味辛甘酸　陰中之陽　無毒
○本草云主下水排膿寒熱熱中消渴止泄利小便吐逆卒澼下脹滿又治水腫通健脾胃赤小豆食之行小便久食則虛人令人黑瘦枯燥赤小豆花治宿酒渴病即腐婢也花亦腐氣故以名之與葛花末服方寸匕飲酒不知醉氣味平辛大豆黃卷是以生豆為蘖待其芽出便曝乾用方書名黃卷皮產婦藥中用之性平

黑大豆

氣平　味甘

○本草云塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛解烏頭毒除胃中熱痺傷中淋露逐水脹。下瘀血久服令人身重炒令黑煙未斷熱投酒中治風痺癱瘓口噤產後諸風食罷生服半掬去心胸煩熱明目鎮心不忘惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良

大麥蘗

氣溫　味甘鹹　無毒

○象云補脾胃虛寬腸胃。先杵細炒黃取麪用

○本草云能消化宿食。破癥結冷氣。去心腹脹滿開胃止霍亂除煩去痰治產後秘結。鼓脹不通大麥蘗并神麴二藥氣虛人宜服以代戊巳腐熟水穀與豆蔻縮砂木瓜芍藥五味子烏梅爲之使

小麥

氣微寒　味甘　無毒

○本草云除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血。青蒿散有小麥百粒治大人小兒骨蒸肌熱婦人勞熱

神麴

氣煖　味甘

入足陽明經

○象云消食治脾胃食不化須於脾胃藥中少加之。微炒黃用

○珍云益胃氣。

○本草云療臟腑中風氣調中下氣。開胃消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除

腸胃中塞不下食令人好顏色落胎下鬼胎又能治小兒腹堅大如盤胸中滿胎動不安或腰痛搶心下血不止火炒以助天五之氣入足陽明。

酒

氣大熱　味苦甘辛　有毒

○本草云。主行藥勢殺百邪惡毒氣。能行諸經不止。與附子相同味辛者能散味苦者能下。味甘者居中而緩也爲導引可以通行一身之表至極高之分若味淡者則利小便而速下大海或凝惟酒不

水三人晨行遇大寒。一人食粥者病。一人腹空者死。一人飲酒者安。則知其大熱也

苦酒 一名醯 一名醢

氣溫 味酸 無毒

○液云歛咽瘡主消癰腫散水氣殺邪毒。余初錄本草苦酒條本經一名醯又一名苦酒。如爲一物也及讀金匱治黃疸有麻黃醇酒湯右以美清酒五升煮二升。苦酒也前治黃汗。有黃耆芍藥桂枝苦酒湯。

飴 即膠飴

氣溫 味甘 無毒

入足太陰經藥

○液云補虛乏。止渴去血。以其色紫凝如深琥珀色謂之膠飴色白而枯者非膠飴。即餳糖也不入藥用中滿不宜用。嘔家切忌爲足太陰經藥仲景謂嘔家不可用建中湯以甘故也

香豉

氣寒 味苦 陰也無毒

○象云治傷寒頭痛煩燥滿悶生用

○珍云去心中懊憹

○本草云主傷寒頭痛寒熱傷寒。初覺頭痛內熱脈洪起一二日便作此加減葱豉湯葱白一虎口豉一升綿裹以水三升煎取一升頓服取汗若不汗加葛根三兩水五升煮二升。分二服。又不汗加麻黃三兩去節

玉石部

石膏

氣寒 味甘辛 微寒大寒無毒

入手太陰經少陽經

足陽明經

○象云治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗小便濇赤大渴引飲肌肉壯熱苦頭痛之藥白虎湯是也善治本經頭痛若無餘証勿用

○心云細理白澤者良甘寒胃經大寒藥潤肺除熱發散陰邪緩脾益氣

○珍云辛甘陰中之陽止陽明經頭痛胃弱不可服

下牙痛須用香白芷
本草云主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯
○太上云石膏發汗辛寒入手太陰也
○東垣云微寒足陽明也又治三焦皮膚大熱手少陽也仲景治傷寒陽明證身熱口痛鼻乾不得臥身巳前胃之經也胸胃肺之室邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺所以號為白虎湯也雞子為之使惡莽草馬目毒公
○藥性論云石膏使惡巴豆唐本註療風去熱解肌

滑石
氣寒　味甘大寒　無毒
○象云治前陰不利性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不可與淡滲同用白者佳杵細水飛用
○本草云主身熱泄澼女子乳難癃閉利小便蕩腸胃積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中入足太陽滑能利竅以通水道為至燥之劑豬苓湯用滑石與阿膠同為滑利以利水道葱豉生薑同煎去柤澄清以解利淡味滲泄為陽解表利小便也若小便自利不宜以此解之
○衍義云暴吐逆不下食以生細末二錢七溫水調服後以熟麪壓之
朴硝
氣溫　味苦辛
○象云除寒熱邪氣逐六腑積聚結痼血癖胃中食飲熱結去血閉停痰痞滿消毒揉細生用

盆硝 即芒硝
氣寒　味鹹
○心云去實熱經云熱淫于內治以鹹寒此之謂也
○珍云純陰熱淫于內治以鹹寒
○本草云主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈及月水破五淋消腫毒療天行熱病
○藥性論云使味鹹有小毒通月閉癥瘕下瘰癧黃

瘡主漆瘡散惡血
○聖惠方治伐指用芒硝煎湯淋漬之愈
硝石
氣寒　味甘辛一作苦辛大寒無毒又云鹹又云甘甜微緩于鹹
○液云硝石者硝之總名也但不經火者謂之生硝朴硝經火者謂之盆硝苦硝古人用辛今人用鹹辛能潤燥鹹能軟堅其意皆是老弱虛人可下者宜用若用此者以玄明粉代之尤佳本經謂利小

便而墮胎傷寒妊娠可下者用此兼以大黃引之直入大腸潤燥軟堅瀉熱子母俱安內經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺澁秘結俱為水少經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦故以芒硝大黃相須為使也
玄明粉
氣冷　味辛甘　無毒
○液云治心熱煩躁五臟宿滯癥瘕明目逐膈上虛熱消腫毒註中有治陰毒一句非伏陽不可用若正用此除陰毒殺人甚速牙硝條下太清鍊靈砂補注謂陰極之精能化火石之毒
○仙經云陰中有陽之物
硫黃
氣溫大熱　味酸　有毒
○本草云主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿疥心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣脚冷疼若無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲

○衍云鄭太白丹佐以硝石來復丹用硝石之類至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人溺豬膽汁大意相同所以去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰證更不必以陰藥佐之也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄生魂
雄黃
氣溫寒　味苦甘　有毒
○本草云主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥蟲䘌瘡

目痛鼻中息肉。及絕筋破骨百節中大風積聚癰
氣中惡腹痛鬼疰。

赤石脂

氣大溫　味甘酸辛　無毒

○本草云主養心氣明目益精療腹痛泄澼。下利赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益志不饑輕身延年。五色石脂各入五臟補益。

○東垣云赤石脂白石脂並溫無毒畏黃芩芫花。惡大黃。

○本經云澀可去脫。石脂爲收斂之劑胞衣不出澀劑可以下之赤入丙白入庚

○珍云赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫。

○心云甘溫餘末用去脫澀以固腸胃。

○局方本草云青石脂養肝膽氣明目黑石脂。養腎氣強陰主陰蝕瘡黃石脂養脾氣除黃疸餘與赤白同功。

禹餘糧

氣寒　味甘　無毒

○本草云主欬逆寒熱煩滿下痢赤白血閉癥瘕大熱

○本經云重可去怯禹餘糧之重爲鎮固之劑

本草註云仲景治傷寒下痢不止心下痞硬利在下焦者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤並碎之以水六升煎取二升。去柤分二服。

○雷公云看如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉子雌黃此能益脾安五臟

代赭石

氣寒　味苦甘　無毒一名須丸出姑幕者名須丸出代郡者名代赭

入手少陰經

足厥陰經

○本草云主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血除五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起

聖濟經云怯則氣浮重劑所以鎮之怯者亦驚也

鉛丹

氣微寒　味辛黃丹也

○本草云主吐逆反胃驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱筋攣金瘡溢血又云鎮心安神止吐血

○本經云澀可去脫而固氣

○成無已云鉛丹收斂神氣以鎮驚也

○藥性論云君治消渴煎膏止痛生肌

白粉

○本草云一名胡粉一名定粉一名瓦粉仲景猪膚湯用白粉非此白粉即白米粉也黃延非治胸中寒足治胸中寒誤寫作寒字

○藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢

○陳藏器曰主久痢成疳粉和水及雞子白服以糞黑為度為其殺蟲而止痢也

紫石英

氣溫　味甘辛無毒

入手少陰經

足厥陰經

○本草云主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂長石為之使畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑

○衍義云仲景治風熱瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分右㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷之不用粗立效

伏龍肝

氣溫　味辛

○時習云主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫

○衍義云婦人惡露不止蠶沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同為末溫酒調空心服二三錢以止為

度
○藥性論云單用亦可鹹無毒
○日華子云熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼一云治心痛及中風心煩
○陶隱居云此竈中對釜月下黃土也

白礬
氣寒 味酸 無毒
○本草云主寒熱泄瀉下痢白沃陰蝕惡瘡消痰止渴除痼熱治咽喉閉目痛堅骨齒生含治急喉痺

硃砂
味甘
○珍云心熱者非此不能除
○局方本草云丹砂味甘微寒無毒養精神安魂魄益氣明目通血脈止煩渴
○藥性論云君有大毒鎮心抽風
○日華子云凉微毒潤心肺惡磁石畏鹹水

硇砂
味鹹
○本草云破堅癖獨不用入群隊用之味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲藥
○藥性論云有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能腐壞人腸胃生食之化人心為血能除冷病大益陽事
○日華子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水臟暖子宮消冷癖瘀血宿食氣塊痃癖及婦人血氣心痛血崩帶下凡修製用黃丹石灰作匱煅赤使用無毒柔金銀驢馬藥亦用

東流水
味平 無毒
○時習云千里水及東流水主病後虛弱揚之萬遍煮藥禁神效二者皆堪蕩滌邪穢此水潔淨誠與諸水不同為雲母所畏鍊雲母粉用之

甘爛水
○時習云揚之水上成珠者是也治霍亂及入膀胱治奔豚藥用之殊勝

禽部

鷄子黃

氣溫　味甘

○本草云陰不足補之以血若咽有瘡鷄子一枚去黃苦酒傾殼中以半夏入苦酒中取殼置刀環上熬微沸去柤旋旋呷之又主除熱火瘡癎痓可作琥珀神物黃和恒山末爲丸竹葉湯服治久瘧不差黃合亂髮煎消爲水療小兒驚熱下痢

獸部

龍骨

氣平微寒　味甘陽也　無毒

○本草云主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癎療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五臟

○本經云澁可去脫而固氣

○成無巳云龍骨牡蠣鉛丹皆收斂神氣以鎮驚凡用燒通赤爲粉畏石膏

○珍云固大腸脫

麝香

氣溫　味辛　無毒

○本草云主辟惡氣殺鬼精物療溫瘧蠱毒癎痓去三尸蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人産難墮胎

牛黃

氣平　味苦　有小毒

○本草云主驚癎寒熱熱盛狂痓逐鬼除邪療小兒百病諸癎熱口噤不開大人癲狂又墮胎久服令人不忘又云磨指甲上黃者爲眞又云定魂魄人參爲使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地黃畏牛膝

犀角

氣寒　味苦酸鹹微寒　無毒

○象云治傷寒溫疫頭痛安心神止煩亂明目鎮驚治中風失音小兒麩豆風熱驚癎磨用

○本草云主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣能治一切瘡腫破血

○液云升麻代犀角說並見升麻條下易老療畜血分三部上焦畜血犀角地黃湯中焦畜血桃仁承氣湯下焦畜血抵當湯丸但緩于湯耳二法的當後之用者無以復加

阿膠

氣微溫　味甘辛　無毒　甘辛平

味薄氣厚升也陽也

入手太陰經

足少陰經厥陰經

○象云主心腹痛內崩補虛安胎堅筋骨和血脈益氣止痢炮用

○心云補肺金氣不足除不足甚溫補血出東阿得火良

○本草云主心腹內崩勞極灑灑如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚痛不能久立養肝氣益肺氣肺虛極損欬嗽唾膿血非阿膠不補仲景猪苓湯用阿膠滑以利水道活人書四物湯加減例妊娠下血者加阿膠

猪膚

氣寒　味甘

入足少陰經

○液云猪皮味甘寒猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷痢

猪膽汁

氣寒　味苦鹹苦寒

○液云仲景白通湯加此汁與人尿鹹寒同與熱劑合去格拒之寒又與醋相合內穀道中酸苦益陰以潤燥瀉便

○本經云治傷寒熱渴又白猪蹄可用雜青色者不可食療疾亦不可

○心云與人尿同體補肝而和陰引置陽不被格拒

能入心而通脉

獺肝　味甘　有毒

○本草云主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒灰服之

猳鼠糞

○治傷寒勞復經云牡鼠糞兩頭尖者是或在人家諸物中遺者

人尿

○時習云療寒熱頭疼溫氣童男子者尤良

○衍義云人尿須用童男者產後溫一盃壓下敗血惡物久服令人反虛氣血無熱尤不可多服此亦性寒故治熱勞方中亦用也

○日華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絶及蛇犬等咬以熱尿淋患處難產胞衣不下即取一升用薑葱煎乘熱飲即下

蟲部

牡蠣

氣微寒　味鹹平　無毒

入足少陰經

○象云治傷寒寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗止心痛氣結澀大小腸治心脇痞燒白研細用

○珍云能軟積氣之痞經曰鹹能軟堅

○心云鹹平熱泄水氣

○本草云主傷寒寒熱溫瘧灑灑驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱往來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸上大小便療泄精喉痺欬嗽心脇下痞熱能去

瘰癧一切瘡腫入足少陰鹹能軟堅之劑以柴胡引之故能去脇下之硬以茶引之能消結核以大黄引之能除股間腫地黄爲之使能益精收澀止小便本腎經之藥也久服強骨節殺鬼延年貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇牀子良惡麻黄吳茱萸辛夷

○藥性論云君主之劑治女子崩中止血及盜汗除風熱定痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗爲末蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣又治鬼交精

出病人虚而多熱加用之地黃小草
○陳士良云牡蠣搗粉粉身治大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑爲粉粉身去陰汗衍義意同

文蛤

氣平　味鹹　無毒

○本草云主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰痛脇急鼠瘻大孔出血崩中漏下能利水治急疳蝕口鼻數日盡欲死燒灰臘猪脂和塗之墜痰軟堅止渴收澁固濟蛤粉也鹹能走腎可以勝水文蛤尖而有紫

斑

䖟蟲

氣微寒　味苦平　有毒

○本草云主目中赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸㵐無子炒去翅足

水蛭

氣微寒　味鹹苦平　有毒

○本草云主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道墮胎炒用畏鹽苦走血鹹勝血仲景抵當湯用䖟蟲水蛭鹹苦以泄畜血故經言有故無殞也雖可用之亦不甚安莫若四物湯加酒浸大黃各半下之極妙

䗪蟲

味鹹寒　有毒

○本草云主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良仲景主治久瘕積結有大黃䗪蟲丸
○衍義云乳汁不行研一枚水半合濾清汁服勿令服藥人知之

鼠婦

氣溫微寒　味酸　無毒

○本草云主氣隆不得小便婦人月水閉血瘕癎痓寒熱利水道仲景治久瘧大鼈甲丸中使之以其主寒熱也

蜘蛛

微寒

○本草云主大人小兒㿗疝七月七日取其網療喜忘仲景治㿗病狐疝偏有大小時時上下者蜘蛛

一十四箇熬焦桂半兩研細為散八分匕酒調服
日再蜜丸亦通

蛴螬

微寒微温　味鹹　有毒

○本草云主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛
月閉目中淫膚青翳白膜吐血在胸中不去及破
骨踒折血結金瘡血塞産後中寒下乳汁仲景治
雜病方大黃䗪蟲丸中用之以其主脇下堅滿也
續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也

時習補入

蜜

氣平微温　味甘　無毒

○本草云主心腹邪氣諸驚癇痓安五臟諸不足益
氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩
飲食不下止腸澼饑中疼痛口瘡明耳目
○液云凡煉蜜必須用火熬開以紙覆經宿紙上去
蠟盡再熬色變不可過度令熟入藥

蜣蜋

氣寒　味酸　有毒

○本草云治小兒驚風瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂
易手足端寒支滿奔豚
○日華子云墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭
○圖經云心主丁瘡
○衍義云大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹
翼下有小黃子附母飛行晝不出夜方飛至人家
戶庭中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出
夜不出今當用胡蜣蜋以其小者研三十枚以水

灌牛馬腸結佳

鱉甲

氣平　味鹹　無毒

○本草云主心腹癥瘕堅積寒熱去痞中息肉陰蝕
痔惡肉療温瘧血瘕腰痛小兒脇下堅
○衍義云治勞瘦除骨中熱極佳

蛇蛻

○心云去翳膜用之取其意也
○日華子云止嘔逆小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜

風煎汁傷入藥炙用

蟬蛻

○心云治同蛇蛻

○藥性論云使治小兒渾身壯熱驚癎兼能止渴又云其蛻殼頭上有一角如冠狀謂之蟬花最佳味甘寒無毒主小兒天弔驚癎瘈瘲夜啼心悸

白殭蠶

味鹹辛平　無毒

○本草云主小兒驚癎夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕濕中有毒不可用

斑猫

味辛寒　有毒

○本草云主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎畏巴豆

烏蛇

○本草云主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑皮諸風用之須入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑梢蛇能纏物至死亦是其類生商洛山

五靈脂

味甘溫　無毒

○本草云主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脈女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

緋帛

○液云主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二寸許亂髮燒末作膏主丁瘡腫又主小兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末細研傅之又五色帛主盜汗拭乾訖棄五道頭仲景治墮馬及一切筋骨損方中用

湯液本草卷之六　終

格致餘論一卷

（元）朱震亨撰

明刻東垣十書本

格致餘論一卷（江蘇巡撫採進本）

元朱震亨撰。震亨字彥修，金華人。受業於羅知悌，
得劉守真之傳。其說謂陽易動，陰易虧，獨重滋陰
降火，創為陽常有餘陰常不足之論。張介賓等攻
之不遺餘力。然震亨意主補益，故諄諄以飲食色
欲為箴。所立補陰諸丸，亦多奇效。孫一奎醫旨緒
餘云，丹溪生當承平，見人多酗酒縱欲，精竭火熾，
復用剛劑，以至於斃，因為此救時之說。後人不察，
遂以寒涼殺人。此不善學丹溪者也。其說可謂平
允矣。是編前有自序，云古人以醫為吾儒格物致
知之一事，故特以是名書。蓋震亨本儒者，受業於
許謙之門。學醫特其餘事，乃性之所近，竟不以儒
名而以醫名。然究較方技者流為能明其理，故其
言如是。戴良九靈山房集有丹溪翁傳，敘其始末
甚詳云。

格致餘論序

金之以善醫鳴者凡三家曰劉守眞氏曰張子和氏曰李明之氏雖其人年之有後先術之有攻補至於惟陰陽五行升降生成之理則皆以黃帝內經爲宗

而莫之有異也張一再傳其後無所聞李雖多門弟子又在中州人有罕知之者獨劉之學授之荆山浮屠師師江南始傳大無羅知悌子杭太無宋宗祐中人受幸穆陵得給事禁中性倨甚無有能承其學者又獨至烏傷宋君始能傳之初君之未從太無也手抄陳師文裴宗元所定大觀二百九十有七方晝夜而習焉既而悟曰故方新病安有能相值者泥是且殺人乃盡

弃去渡淛河走吳中尋師而求其說久之不能得復走宛陵走南徐走建業皆無吳中時纍纍道途聞方不知所適忽有以太無爲告者遂還杭拜之凡十往返不得通君乃立其門終日不

動太無憐其志爲歔暢三家之
旨而析一以經起數年悉受其
學以歸鄉之群醫方泥陳裴學
聞君言皆大驚巳而又皆大服
翕然共尊事之君年旣高所見
益粹精其自得者類多前人所

未發乃徇門人張翼等請著爲
書若干篇名之曰格致餘論持
以示金華宋濂濂竊受而讀之
見其立言深察證詳未嘗不歎
君用志之勤也蓋當大觀之方
盛行世之人烏知有所謂內經

之學君獨能崎嶇數十百里必
欲求師而受其說雖險阻艱難
更嬰迭挫曾不爲之少動所以
卒能成其學向使君之志稍變
焉烏有今日哉傳曰用志不分
其道乃成殆君之謂矣君之此

書其有功於生民者甚大宜與
三家所著竝傳於世故濂得備
書傳學用功之所自于篇端其
見君之自叙者因不暇及也君
名震亨字彥脩號丹溪許文懿
公之高弟弟子公諱學入華山

時君即從之遊而聞道最先。剛明正直不可干以私。其安貧守道雖古君子弗過也。而醫又特其一事云。

至正七年冬十有一月日南至

金華宋濂書于浦陽東明山中

致餘論序

素問載道之書也。詞簡而義深。去古漸遠。衍文錯簡。仍或有之。故非吾儒不能讀。學者以易心求之。宜其茫若望洋。淡如嚼蠟。遂直以為古書不宜於今。厭而棄之。相率以為局方之學。間有讀者。又以濟其方技。漫不之省。醫道隱晦。職此

孟子公諱及上曰壽先子之序見也三習子霄子之誤也

之由可嘆也震亨三十歲時因母之患脾疼衆工束手由是有志於醫遂取素問讀之三年似有所得又二年母氏之疾以藥而安

因追念先子之内傷伯考之瞀悶叔考之鼻衄幼弟之腿痛室人之積痰一皆殁於藥之悞也心膽摧裂痛不可追然猶慮學之未

明至四十歲復取而讀之顧以質鈍遂朝夕鑽研缺其所可疑通其所可通又四年而得羅太無諱知悌者爲之師因見河間戴人

東垣海藏諸書始悟濕熱相火爲病甚多又知醫之爲書非素問無以立論非本草無以立方有方無論無以識病有論無方何以

模倣夫假說問答仲景之
書也而詳於外感明著性
味東垣之書也而詳於內
傷醫之為書至是始備醫
之為道至是始明由是不
能不致疑於局方也局方
流行自宋迄今罔間南北
翕然而成俗豈無其故哉
徐而思之濕熱相火自王
太僕注文已成湮沒至張

李諸老始有發明人之一
身陰不足而陽有餘雖諄
諄然見於素問而諸老猶
未表章是宜局方之盛行
也震亨不揣蕪陋陳於編
冊并述金匱之治法以證
局方之未備間以己意附
之於後古人以醫為吾儒
格物致知一事故目其篇
曰格致餘論未知其果是

否耶後之君子幸改而正諸

義烏朱震亨彥修父撰

格致目錄

卷之一

飲食色欲箴序

飲食箴

色欲箴

陽有餘陰不足論

治病必求其本論

涩脉論

養老論

慈幼論

夏月伏陰在内論

豆瘡陳氏方論

痛風論

痎瘧論

病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論

治病先觀形色然後察脉問證論

大病不守禁忌論

虚病痰病有似邪祟論

面鼻得冷則黑論
胎自墮論
難產論
難產胞損淋瀝論
卷之二
胎婦轉胞病論
乳硬論
受胎論
人迎氣口論

春宣論
醇酒宜冷飲論
癰疽當分經絡論
脾約丸論
鼓脹論
疝氣論
秦桂丸論
惡寒非寒病惡熱非熱病論
經水或紫或黑論

石膏論
脈大必病進論
生氣通天論病因章句辨
太僕章句
新定章句
倒倉論
相火論
左大順男右大順女論
茹淡論

呃逆論
房中補益論
天氣屬金說
張子和攻擊注論

格致餘論目錄 終

格致餘論卷之一

元　義烏　丹溪朱震亨彥脩　撰

明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫　校

○○飲食色欲箴序

男女之欲所關甚大飲食之欲於身尤切世之淪胥陷溺於其中者蓋不少矣苟志於道必先於此究心焉因作飲食色欲二箴以告同志云

○○飲食箴

人身之貴父母遺體為口傷身滔滔皆是人有此身飢渴洊興乃作飲食以遂其生睠彼昧者因縱口味五味之過疾病蜂起病之生也其機甚微饞涎所牽忽而不思病之成也飲食俱廢憂貽父母醫禱百計山野貧賤淡薄是諳動作不衰此身亦安均氣同體我獨多病悔悟一萌塵開鏡淨曰節飲食易之象辭養小失大孟子所譏口能致病亦敗爾德守口如瓶服之無斁

○○色欲箴

惟人之生與天地參坤道成女乾道成男配為夫婦生育攸寄血氣方剛惟其時矣成之以禮接之以時父子之親其要在茲睠彼昧者徇情縱欲惟恐不及濟以燥毒氣陽血陰人身之神陰平陽秘我體長春血氣幾何而不自惜我之所生翻為我賊女之耽兮其欲實多閨房之肅門庭之和士之耽兮其家自廢既喪厥德此身亦瘁遠彼帷薄放心乃收飲食甘美身安病瘳

○○陽有餘陰不足論

人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為血故氣常有餘血常不足何以言之天地為萬物父母天大也為陽而運於地之外地居天之中為陰天之大氣舉之日實也亦屬陽而運於月之外月缺也屬陰稟日之光以為明者也人身之陰氣其消長視月之盈缺故人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀以養陰氣始成而可與陽氣為配以能成人而為人之父母古人必近三十二十而後嫁娶可見陰氣之難於成而古人之善於攝養也禮記注曰惟五十然後養陰

生育攸寄血氣方剛惟其時矣成之以禮接之以時父子之親其要在茲睠彼昧者狥情縱欲惟恐不及濟以燥毒氣陽血陰人身之神陰平陽秘我體長春血氣幾何而不自惜我之所生翻為我賊女之耽兮其欲實多閨房之肅門庭之和士之耽兮其家自廢既喪厥德此身亦瘁遠彼帷薄放心乃收飲食甘美身安病瘳

陽有餘陰不足論

人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為血

故氣常有餘血常不足何以言之天地為萬物父母天大也為陽而運於地之外地居天之中為陰天之大氣舉之日實也亦屬陽而運於月之外月缺也屬

[illegible]

陰氣其消長視月

而精通女子十四

乳哺水穀以養陰

能成人而為人之父母

古人必近三十二十而後嫁娶可見陰氣之難於成而古人之善於攝養也禮記注曰惟五十然後養陰者有以加內經曰年至四十陰氣自半而起居衰矣又曰男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止供給得三十年之視聽言動已先虧矣人之情欲無涯此難成易虧之陰氣若之何而可以供給也經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛又曰至陰虛天地絕至陽盛地氣不足觀虛與盛之所在非吾之過論主閉藏者腎也司疏泄者肝也二臟皆有相火而其系上屬于心心君火也為物所感則易動心動則相火亦動動則

精自走相火翕然而起雖不交會亦暗流而疏泄矣所以聖賢只是教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午為火大旺火為肺金之夫火旺則金衰六月屬未為土大旺土為水之夫土旺則水衰況腎水常藉肺金為母以補助其不足故內經諄諄于資其化源也古人于夏必獨宿而淡味兢兢業業于愛護也保養金水二臟正嫌火土之旺爾內經曰冬不藏精者春必病溫十月屬亥十一月屬子

正火氣潛伏閉藏以養其本然之眞而為來春發生
升動之本若于此時恣嗜欲以戕賊至春深之際下
無根本陽氣輕浮必有溫熱之病夫夏月火土之旺
冬月火氣之伏此論一年之虛耳若上弦前下弦後
月廓月空亦為一月之虛大風大霧虹霓飛電暴寒
暴熱日月薄蝕憂愁忿怒驚恐悲哀醉飽勞倦謀慮
勤動又皆為一日之虛若病患初退瘡痍正作尤不
止于一日之虛今乃多有春末夏初患頭痛腳軟食
少體熱仲景謂春夏劇秋冬差而脈弦大者正世俗

所謂注夏病若犯此四者之虛似難免此夫當壯年
便有老態仰事俯育一切隳壞興言至此深可驚懼
古人謂不見所欲使心不亂夫以溫柔之盛於體聲
音之盛於耳顏色之盛於目馨香之盛於鼻誰是鐵
漢心不為之動也善攝生者於此五箇月出居于外
苟值一月之虛亦宜暫遠帷幕各自珍重保全天和
期無負敬身之教幸甚

治病必求其本論

病之有本猶草之有根也去葉不去根草猶在也治
病猶去草病在臟而治腑病在表而攻裏非惟戕賊
胃氣抑且資助病邪醫云乎哉族叔祖年七十稟甚
壯形甚瘦夏末患泄利至深秋百方不應予視之曰
病雖久而神不悴小便澀少而不赤兩手脈俱澀而
頗弦自言膈微悶食亦減因悟曰此必多年沉積僻
在胃腸詢其平生喜食何物曰我喜食鯉魚三年無
一日缺予曰積痰在肺肺為大腸之臟宜大腸之本
不固也當與澄其源而流自清以茱萸陳皮青葱蔍
苜根生薑煎濃湯和以沙糖飲一椀許自以指探喉

中至半時辰吐痰半升許如膠是夜減半次早又飲
又吐半升而利止又與平胃散加白朮黃連旬日而
安東陽王仲延遇諸途來告曰我每日食物必屈曲
自膈而下且硬澀作微痛他無所苦此何病脈之左
甚澀而關尤沉左邦和予曰汙血在胃脘之口氣因
鬱而為痰此必食物所致明以告我彼亦不自覺予
又曰汝去臘食何物為多曰我每日必早飲點剌酒
兩三盞逼寒氣為製一方用韭汁半銀盞冷飲細呷
之盡韭葉半斤而病安已而果然又一婦人年二十

爲性狡而躁素患下痢瘧或作或止夏初患自利膈
上微悶醫與治中湯兩貼悶若死片時而起予脉
之兩手皆濇重取略弦似數予曰此下痢瘧之深重
者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減又與小柴胡去
半夏加黃連芍藥川芎生姜煎五六貼而安彼三人
者俱是濇脉或弦或不弦而治法迥別不求其本何
以議藥

○、濇脉論

人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六
寸一晝一夜一萬三千五百息脉行八百一十丈此
平人血氣運行之定數也醫者欲知血氣之病與不
病非切脉不足以得之脉之狀不一載於脉經者二
十有四浮沉芤滑實弦緊洪微緩濇遲伏濡弱數細
動虛促結代革散其狀大率多兼見人之爲病有四
曰寒曰熱曰實曰虛故學脉者亦必以浮沉遲數爲
之綱以察病情此不易之論也然濇之見固多虛寒
亦有痼熱爲病者醫于指下見有不足之氣象便以
爲虛或以爲寒孟浪與藥無非熱補輕病爲重重病

爲性狡而躁素患下痢瘧或作或止夏初患自利膈
上微悶醫與治中湯兩貼悶若死片時而起予脉
之兩手皆濇重取略弦似數予曰此下痢瘧之深重
者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減又與小柴胡去
半夏加黃連芍藥川芎生姜煎五六貼而安彼三人
者俱是濇脉或弦或不弦而治法迥別不求其本何
以議藥
○、濇脉論
人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六
寸一晝一夜一萬三千五百息脉行八百一十丈此
平人血氣運行之定數也醫者欲知血氣之病與不
病非切脉不足以得之脉之狀不一載於脉經者二
十有四浮沉芤滑實弦緊洪微緩濇遲伏濡弱數細
動虛促結代革散其狀大率多兼見人之爲病有四
必以浮沉遲數爲
濇之見固多虛寒
不足之氣象便以
補輕病爲重重病

死者多矣何者人之所藉以爲生者血與氣也或因憂鬱或因厚味或因無汗或因補劑氣騰血沸清化爲濁老痰宿飲膠固雜糅脈道阻澀不能自行亦見濇狀若重取至骨來似有力且帶數以意參之於證驗之形氣但有熱證當作痼熱可也此論爲初學者發關健之上必以爲贅東陽吳子方年五十形肥味厚且多憂怒脈常沉濇自春來得痰氣病醫認爲虛寒率與燥熱香竄之劑至四月間兩足弱氣上衝飲食減召予治之予曰此熱鬱而脾虛痿厥之證作矣形肥而脈沉未是死證但藥邪太盛當此火旺實難求生且與竹瀝下白朮膏盡二斤氣降食進一月後大汗而死書此以爲諸賢覆轍戒云

○養老論

人生至六十七十以後精血俱耗平居無事已有熱證何者頭昏目眵肌痒溺數鼻涕牙落涎多寐少足弱耳聵健忘眩運腸燥面垢髮脫眼花久坐兀睡未風先寒食則易饑笑則有淚但是老境無不有此或曰局方烏附丹劑多與老人爲宜豈非以其年老氣弱不虛理宜溫補今子皆以爲熱烏附丹劑將不可施之老人耶余曉之曰奚止烏附丹劑不可妄用至於好酒膩肉濕麵油汁燒炙煨炒辛辣甜滑皆在所忌或曰子何愚之甚耶甘旨養老經訓具在爲子爲婦甘旨不及孝道便虧而吾子之言若是其將有說以通之乎願聞其略予愀然應之曰正所謂道並行而不悖者請詳言之古者井田之法行鄉閭之教興人知禮讓比屋可封肉食不及幼壯五十纔方食肉強壯恣饕比及五十疾已蜂起氣耗血竭筋柔骨痿腸胃壅閼涎沫充溢而况人身之陰難成易虧六七十後陰不足以配陽孤陽幾欲飛越因天生胃氣尚爾留連又藉水穀之陰故羈縻而定耳所陳前證皆是血少內經曰腎惡燥烏附丹劑非燥而何夫血少之人若防風半夏蒼朮香附但是燥劑且不敢多况烏附丹劑乎或者又曰一部局方悉是溫熱養陽吾子之言無乃謬妄乎予曰局方用燥劑爲劫濕病也濕得燥則豁然而收局方用煖劑爲劫虛病也補腎不如補脾脾得溫則易化而食味進下雖暫虛亦可

少固內經治法亦許用劫正是此意蓋爲質厚而病淺者設此亦儒者用權之意若以爲經常之法豈不大悞彼老年之人質雖厚此時亦近乎薄病雖淺其本亦易以撥而可以劫藥取速効乎若夫形肥者血少形瘦者氣實間或有可用劫藥者設或失手何以取救吾寧稍遲計出萬全豈不美乎烏附丹劑其不可輕餌也明矣至於飲食尤當謹節夫老人內虛脾弱陰虧性急內虛胃熱則易飢而思食脾弱難化則食已而再飽陰虛難降則氣鬱而成痰至於視聽言

動皆成廢懶百不如意怒火易熾雖有孝子順孫亦是動輒扼腕況未必孝順乎所以物性之熱者炭火製作者氣之香辣者味之甘膩者其不可食也明矣雖然腸胃堅厚福氣深壯者世俗觀之何妨奉養縱口固快一時積久必爲災害由是觀之多不如少少不如絕爽口作疾厚味措毒前哲格言猶在人耳可不慎歟或曰如子之言殆將絕而不與於汝安乎予曰君子愛人以德小人愛人以姑息況施於所尊者哉惟飲與食將以養生不以致疾若以所養轉爲所養恐非君子之所謂孝與敬也然則如之何則可曰好生惡死好安惡病人之常情爲子爲孫必先開之以義理曉之以物性旁譬曲喻陳說利害意誠辭確一切以敬慎行之又次以身先之必將有所感悟而無扞格之逆矣吾子所謂絕而不與施於有病之時尤是孝道若無病之時量酌可否以時而進某物不食某物代之又何傷於孝道乎若夫平居閒話素無開導誘掖之言及至飢腸已鳴饞涎已動飲食在前馨香撲鼻其可禁乎經曰以飲食忠養之忠之一字

恐與此意合請勿易看過予事老母固有愧於古者然母年踰七旬素多痰飲至此不作節養有道自謂有術只因大便燥結時以新牛乳豬脂和糜粥中進之雖以暫時滑利終是膩物積多次年夏時鬱爲粘痰發爲脇瘡連日作楚寐興陨穫爲之子者置身無地因此苦思而得節養之說時進參朮等補胃補血之藥隨天令加減遂得大腑不燥面色瑩潔雖覺瘦弱終是無病老境得安職此之由也因成一方用參朮爲君牛膝芍藥爲臣陳皮茯苓爲佐春加川芎夏

加五味黃芩麥門冬冬加當歸身倍生姜一日或一貼或二貼聽其小水纔覺短少便進此藥小水之長如舊即是却病捷法後到東陽因問老何安人性聰敏七十以後稍覺不快便却粥數日單進人參湯數貼而止後九十餘無疾而卒以其偶同故筆之以求是正。

○慈幼論

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫煗甚于布也裘皮衣溫煗甚于帛也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫煗則陰暗消是以下體不與帛絹夾厚溫煗之服恐妨陰氣實爲確論血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸鹹甜辣一切魚肉木果濕麵燒炙煨炒但是發熱難化之物皆宜禁絕只與乾柿熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可謂養陰之助然栗大補柿大澀俱爲難化亦宜少與婦人無

知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有疾則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎歟至于乳子之母尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情欲動中乳脉便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或爲口糜或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必甚少便須詢問隨證調治母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄情性之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤爲關係或曰可以已矣曰未也古之胎教具在方冊愚不必贅若夫胎孕致病事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱則俱熱得寒則俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密東陽張進士次子二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘予視之曰此胎毒也慎勿與解利藥衆皆愕然予又曰乃母孕時所喜何物張曰辛辣熱物是其所喜因口授一方用人參連翹芎連生甘艸陳皮芍藥

木通濃煎沸湯入竹瀝與之數日而安或曰何以知之曰見其精神昏倦病受得深決非胎毒而何予之次女形瘦性急體本有熱懷孕三月適當夏暑口渴思水時發小熱遂教以四物湯加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎藥致貼而止其後此子二歲瘡痍遍身忽一日其瘡頓愈數日遂成痎瘧予曰此胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有又陳氏女八歲時得癇疾遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲如羊鳴予視之曰此胎受熱也其病深痼調治半年病亦可安仍須淡味以佐藥功與燒丹元繼以四物湯入黃連隨時令加減半年而安

夏月伏陰在内論 陽外盛而腹内虛也

天地以一元之氣化生萬物根於中者曰神機根于外者曰氣血萬物同此一氣人靈于物形與天地參而為三者以其得氣之正而通也故氣升亦升氣浮亦浮氣降亦降氣沉亦沉人與天地同一橐籥子月一陽生陽初動也寅月三陽生陽初出于地也此氣

之升也巳月六陽生陽盡出於上矣此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中虛矣經曰夏月經滿地氣溢滿入經絡受血皮膚充實長夏氣在肌肉所以表實表實者裏必虛世言夏月伏陰在内此陰字有虛之義若作陰冷看其誤甚矣或曰以手捫腹明知其冷非冷而何前人治暑病有玉龍丸大順散桂苓丸單煮良姜與縮脾飲用草果等皆行溫熱之劑何吾子不思之甚也予曰春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也其意可見矣若夫涼臺水館大扇風車陰水寒泉果冰雪涼之傷自内及外不用溫熱病何由安詳玩其意實非為内伏陰而用之也前哲又謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之若於夏月火令之時妄投溫熱寧免實實虛虛之患乎或曰巳月純陽於理或通五月一陰六月二陰非陰冷而何予曰此陰之初動於地下也四陽浮於地上燔灼焚燎流金爍石何陰冷之有孫眞人製生脉散令人夏月服之非虛而何

○豆瘡陳氏方論

之升也巳月六陽生陽盡出於上矣此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中虛矣經曰夏月經滿地氣溢滿入經絡受血皮膚充實長夏氣在肌肉所以表實表實者裏必虛世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看其悞甚矣或曰以手捫腹明知其冷非冷而何前人治暑病有玉龍丸大順散桂苓丸單煮良姜與縮脾飲用草果等皆行溫熱之劑何吾子不思之甚也予曰春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也其意可見矣

四氣調神論曰春夏養陽秋冬養陰以從其根今有曰夫陰根於陽陽根於陰 以陽生陽以陰長所以春夏則養陽以為秋冬之地秋冬則養陰以為春夏之地皆所以從其根也今人有春夏不能養陽者每因風涼生冷傷此陽氣以致秋冬多患瘧瀉此陰勝之為病也有秋冬不能養陰者每因縱慾過熱傷此陰氣以致春夏多患火症此陽勝之為病也

按王冰注與今有不同俟考可也

之傷
為內
熱溫
實寶
陰六

月二陰生陰淺而伏予曰此陰之初動於地下也四陽浮於地上燔灼焚燎流金爍石何陰冷之有孫眞人製生脉散令人夏月服之非虛而何

豆瘡陳氏方論

讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求適於用不可得也豆瘡之論錢氏爲詳歷舉源流經絡明分表裏虛實開陳其施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方圓於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而長之可爲無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際據證檢方漫爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜溫而惡寒喜補而惡解

利忽得陳氏方論皆燥熱補劑其辭確其文簡懽然用之翕然信之遂以爲錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方爲不足歟曰陳氏方誠一偏論雖然亦可謂善求病情者其意大率歸重于太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛也足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾胃土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附朮半夏所以治脾之濕也使其肺果有寒脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則止何傷之有今也不然徒見其瘡之出遲者身

熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實率投木香散異功散間有偶中脫手獲效設或悞投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐有因用若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白术參芪等率有監制輔佐之藥不專務于溫補耳然其用涼寒者多而于輔助一法略開端緒未曾深及癡人之前不可說夢錢氏之慮至矣亦將以俟達者擴充推廣而用雖然瀉者用溫藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附丁香等燥熱恐未爲

適中也何者桂附丁香輩當有寒而虛固是的當虛而未必寒者其爲害當何如耶陳氏立方之時必有挾寒而豆瘡者其用燥熱補之固其宜也今未挾寒而用一偏之方寧不過于熱乎予嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也試舉一二以證之從子六七歲時患豆瘡發熱微渴自利一小方脈視之用木香散每貼又增丁香十粒予切疑焉觀其出遲固因自利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐非有寒而虛遂急止之已投一貼矣

繼以黃連解毒湯加白术與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出其後肌常有微熱而手足生癰癤與涼劑調補踰月而安又一男子年十六七歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈皆豁大而略數知其爲勞傷矣時里中多發豆者雖不知人與藥則飲與粥則食遂教參芪當歸白术陳皮大料濃煎與之飲至三十餘貼豆始出又二十餘貼則成膿泡身無全膚或曰病勢可畏何不用陳氏全方治之余曰此但虛耳無寒也只守前方又數十餘貼而安後詢其病因謂先四

五日恐有出豆之病遂極力樵採連日出汗甚多若用陳氏全方寧無後悔至正甲申春陽氣早動正月間邑間豆瘡不越一家率投陳氏方童幼夭者百餘人雖由天數吾恐人事亦或未之盡也

○○痛風論

氣行脈外血行脈內晝行陽二十五度夜行陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷於七情外傷於六氣則血氣之運或遲或速而病作矣彼痛風者大率因血受熱已自

沸騰其後或涉冷水或立濕地或扇取涼或卧當風寒涼外搏熱血得寒汙濁凝澀所以作痛夜則痛甚行於陰也治法以辛熱之劑流散寒濕開發腠理其血得行與氣相和其病自安然亦有數種治法稍異謹書一二以證予言東陽傅文年踰六十性急作勞患兩腿痛甚動則甚痛予視之曰此兼虛證當補血溫血病當自安遂與四物湯加桃仁陳皮牛膝生甘草煎入生姜研潛行散熱飲三四十貼而安又朱宅閫內年近三十食味甚厚性躁急患痛風攣縮數月

醫禱不應予視之曰此挾痰與氣證當和血疏氣導痰病自安遂以潛行散入生甘草牛膝炒枳殼通草陳皮桃仁姜汁煎服半年而安又鄰鮑六年二十餘因患血痢用澀藥取效後患痛風叫號撼鄰予視之曰此惡血入經絡證血受濕熱久必凝濁所下未盡留滯隧道所以作痛經久不治恐成偏枯遂與四物湯加桃仁紅花牛膝黃芩陳皮生甘草煎入生姜研潛行散入少酒飲之數十貼又與刺委中出黑血近三合而安或曰比見鄰人用草藥研酒飲之不過數貼亦有安者如子之言類皆經久取效無乃太迂緩乎予曰此劫病草藥石上采石絲為之君過山龍等佐之皆性熱而燥者不能養陰却能燥濕病之淺者濕痰得燥則開熱血得熱則行亦可取效彼病深而血少者愈劫愈虛愈劫愈深若朱之病是也子以我為迂緩乎

○痎瘧論

內經謂夏傷于暑秋傷于風必有痎瘧痎瘧老瘧也以其隔兩日一作纏綿不休故有是名前賢具有治

法然皆峻劑有非稟受性弱與居養所移者所宜用也惟許學士方有用參芪等補劑而又不曾深論後學難于推測因見近年以來五十歲以下之人多是怯弱者況嗜欲縱恣十倍于前以弱質而得深病最難為藥始悟常山烏梅砒丹等為劫痰之劑若誤用之輕病為重重病必死何者夫三日一作陰受病也作于子午卯酉日少陰瘧也作于寅申巳亥日厥陰瘧也作于辰戌丑未日太陰瘧也瘧得于暑當以汗解或涼臺水閣陰木冷地他人揮扇泉水澡浴汗不

得泄鬱而成瘧其初感也胃氣尙强全不自覺至于再感瞢然無知又復恣意飲食過分勞動將力房室胃氣大傷其病乃作深根固蔕宜其難愈病者欲速愈甘辛峻劑醫者欲急利遽便將投殊不知感風感暑皆外邪也當以汗解所感旣深決非一二升汗可除亦有胃氣少囘已自得汗不守禁忌又復觸冒舊邪未去新邪又感展轉沉滯其病愈深況來求治者率皆輕試速效劫病之藥胃氣重傷吾知其難免於禍矣由是甘爲遲鈍範我馳驅必先于參朮陳皮芍

藥等補劑輔以本經之藥惟其取汗若得汗而體虛又須重用補劑以助之俟汗出通身下過委中方是佳兆仍教以淡飲食省出入避風就溫遠去帷薄謹密調養無有不安若感病極深雖有大汗所感之邪必自臟傳出至腑其發也必亂而失期亦豈是佳兆故治此病春夏爲易秋冬爲難非有他也以汗之難易爲優劣也或曰古方用砒丹烏梅常山得效者不爲少子以爲不可用乎予曰腑受病者淺一日一作間一日一作者是胃氣尙强猶可與也彼三日一作者病已在臟矣在臟者難治以其外感猶可治也而可用劫藥以求速效乎前歲憲僉詹公禀賦壯形甚强色甚蒼年近六十二月得瘧召予視之知其飫於醲肥者告之曰須遠色食淡調理浹月得大汗乃安公不悅一人從旁曰此易耳數日可安與劫藥三五貼病退旬日後又作又與又退綿延至冬病猶未除又來求治予知其久得藥瘧亦少惟胃氣未完又天寒汗未透遂以白朮粥和丸與二斤令其遇饑時且未食取一二百丸以熱湯下只與白粥調養盡此

藥當大汗而安已而果然如此者甚多但藥略有加減不必盡述

○病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論

凡言治國者多借醫爲喻仁哉斯言也眞氣民也病邪盜賊也或有盜賊勢須剪除而後已良相良將必先審度兵食之虛實與時勢之可否然後動動涉輕妄則吾民先困于盜次困于兵民困而國弱矣行險僥倖小人所爲萬象森羅果報昭顯其可不究心乎請舉一二以爲凡例永康呂親形瘦色黑平生嗜酒

多飲不圖年近半百月有別館忽一日大惡寒發戰且自言渴却不飲予診其脉大而弱惟右關稍實略數重取則濇遂作酒熱內鬱不得外泄由表熱而不虛也黃芪一物以乾葛湯煎與之盡黃芪二兩乾葛一兩大得汗次早安矣又渠先生患滯下後甚逼迫正合氣承證予曰氣口虛形雖實而面黃稍白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍一兩日辛苦遂與參术陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍完與承氣兩貼而安苟不先補完胃氣之傷而遂行承氣吾

恐病安之後寧免瘦憊乎又一婢色紫稍肥性沉多憂年近四十經不行三月矣小腹當中有一氣塊初起如栗漸如炊餅予脉之兩手皆濇重取却有試令按其塊痛甚捫之高半寸遂與千金消石丸至四五次彼忽自言乳頭黑且有汁恐有娠予曰非也濇脉無孕之理又與三五貼服之稍覺虛豁予悟曰藥太峻矣令止前藥與四物湯倍加白术佐以陳皮至三十貼候脉完再與消石丸至四五次忽自言塊消一暈便令莫服又半月經行痛甚下黑血半升內如椒核數十粒乃塊消一半又來索藥以消餘塊余曉之曰勿性急塊已開矣不可又攻若次月經行當盡消矣次月經行下少黑血塊又消一暈又來問藥余曰但守禁忌至次月必消盡已而果然大凡攻擊之藥有病則病受之病邪輕而藥力重則胃氣受傷夫胃氣者清純沖和之氣也惟與穀肉菜果相宜盡藥石皆是偏勝之氣惟參芪輩爲性亦偏況攻擊之藥乎此婦胃氣自弱好血亦少若塊盡而却藥胃氣之存者幾希矣議論至此醫云乎哉。

○治病先觀形色然後察脉問證論

經曰診脉之道觀人勇怯肌肉皮膚能知其情以爲診法也凡人之形長不及短大不及小肥不及瘦人之色白不及黑嫩不及蒼薄不及厚而況肥人濕多瘦人火多白者肺氣虛黑者腎氣足形色既殊臟腑亦異外證雖同治法逈別所以肥人責脉浮瘦人責脉沉躁人疑脉緩緩人疑脉躁以其不可一槩觀也試陳一二幸以例推東陽陳兄露筋骨體稍長患體虛而勞頭痛甚至有決別之言余察其脉弦而大帶

藥以人參白朮為君川芎陳皮為佐至五六日未減衆皆訝之以藥之不對也余曰藥力有次第矣更少俟一二宿當自安忽其季來問曰何不少加黃芪予哭不答又經一宿忽自言病頓愈予脈之覺指下稍盛又半日病者言膈上滿不覺飢視其腹紋已隱矣予曰夜來藥中莫加黃芪否曰然止與二貼遂速與二陳湯加厚朴枳殼黃連以瀉其衛三貼而安矣浦江義門鄭元年二十餘秋間大發熱口渴妄言妄見病似邪鬼七八日後召予治脈之兩手洪數而實視

其形肥面赤帶白却喜露筋脈本不實涼藥所致此因勞倦成病與溫補藥自安曰柴胡七八貼矣以黃芪附子湯冷與之飲三貼後困倦鼾睡微汗而解脈亦稍軟繼以黃芪白朮湯至十日脈漸收斂而小又與半月而安夫黃芪補氣藥也此兩人者一則氣虛一則氣實便有宜不宜存焉可不審乎

○大病不守禁忌論

病而服藥須守禁忌孫真人千金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌之由敢陳其略以為規戒夫胃氣者清純沖和之氣人之所賴以為生者也若謀慮神勞動作形苦嗜欲無節思想不遂飲食失宜藥餌違法皆能致傷既傷之後須用調補恬不知怪而乃恣意犯禁舊染之證尚未消退方生之證與日俱積吾見醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣無復完全之望去死近矣予族叔形色俱實痎瘧又患痢自恃強健能食絕無忌憚一日召予曰我雖病却健而能食但苦汗出耳汝能止此汗否予曰痎瘧非汗出不能愈也可虞者正在健與能食耳此非痢也胃熱善消脾

病不化食積與病勢已甚矣此時節擇飲食以養胃氣省出入以避風寒候汗透而安叔曰世俗謂無飽死痢我今能食何謂可虞余曰痢而能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不節擇者不從所言恣口大嚼遇渴又多喫水果如此者月餘後雖欲求治不可著手矣淹淹又月餘而死內經以驕恣不倫于理為不治之病信哉又周其姓者形色俱實患痢善食而易飢大嚼不擇者五日矣予責之曰病中當調補自養豈可滋味戕賊遂教之只用熟蘿蔔喫粥且

少年調治半月而安

○○虛病痰病有似邪祟論

魂魄者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰執其咎憲幕之子傅兄年十七八時暑月因大勞而渴恣飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼診其脈兩手皆虛弦而帶沉數予曰數為有熱虛弦是大驚又梅酸之漿鬱於中脘

補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白术陳皮茯苓芩連等濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未効衆皆尤藥之不審余脈之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入荊瀝又旬日而安外弟歲一日醉飽後亂言妄語妄見詢之係伊亡兄附體言生前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪食腥與酒太過痰所為耳權鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大作困睡一宵而安又金氏婦壯年暑月赴筵歸乃姑詢其坐次失序遂赧然自愧因成此病言語失倫其中又多間一句曰奴奴不是脈皆數而弦余曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而咒之旬餘而死或問曰病非邪而邪治之何遽至於死余曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而況舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是寒其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱內燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟或曰外祟亦要有禁呪一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術

耳可治小病若內有虛邪外有實邪當用正大之法自有成式昭然可考然符水惟膈上熱痰一呷凉水胃熱得之豈不清快亦可取安若內傷而虛與冬嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解率得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖爭去死為近。

○○面鼻得冷則黑論

諸陽聚于頭則面為陽中之陽鼻居面中央而陽明起于頞中一身之血運到面鼻到面鼻陽部皆為至

清至精之血矣酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血爲極熱熱血得冷爲寒氣所搏汙濁凝結滯而不行宜其先爲紫而後爲黑色也須用融化滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈予爲酒製四物湯加炒片茯苓陳皮生甘草酒紅花生薑煎調五靈脂末飲之氣弱者加酒黃芪無有不應者

、胎自墮論

陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足榮養其胎自墮

或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三箇月左右必墮診其脉左手大而無力重取則濇知其少血也以其妙年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白术湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全而生因而思之墮於內熱而虛者於理爲多曰熱曰虛當分輕重好生之工幸毋輕視

(一〇)難產論

世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若貧賤辛苦者無有也方書止有瘦胎飲一論而其方爲湖陽公主作也實非極至之言何者見有此方其難自若予族妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之余甚憫焉視其形肥而勤於針指構思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使和平故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運而其氣愈弱久坐胞胎因母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健而易產今其有孕至五六箇月

遂於大全方紫蘇飲加補氣藥與十數貼因得男而甚快後遂以此方隨母之形色性稟參以時令加減與之無不應者因名其方曰大達生散

(一一)難產胞損淋瀝論

常見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病遂爲廢疾一日有徐姓婦壯年得此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚曰難產之由多是氣虛難產之後血氣尤虛試與峻補因以參术爲君芎歸爲臣桃仁陳皮黃芪茯苓爲

佐而煎以豬羊胞中湯極飢時飲之但劑率用一兩至一月而安蓋是氣血環長其胞自完恐稍遲緩亦難成功

格致餘論卷之一終

格致餘論卷之二

元　義烏　丹溪朱震亨彥脩甫　撰
明　金壇　宇泰王肯堂損菴甫　校

○胎婦轉胞病論

轉胞病胎婦之禀受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疏導藥鮮有應效因思胞爲胎所墜展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疏水道自行然胎之墜下必有其由一日吴宅寵人患此脉之兩手似濇重取則弦然左手稍和余曰此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不清而溢則胞之所避而就下故墜遂以四物湯加參术半夏陳皮生甘艸生姜空心飲隨以指探喉中吐出藥汁俟少頃氣定又與一貼次早亦然如是與八貼而安此法未爲的確恐偶中耳後又歷用數人亦效未知果如何耶仲景云婦人本肥盛且舉自滿全羸瘦且舉空減胞系了戾亦致胞轉其義未詳必有能知之者

○○乳硬論

乳房陽明所經。乳頭厥陰所屬。乳子之母不知調養。怒忿所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。故竅不得通。而汁不得出。陽明之血沸騰。故熱甚而化膿。亦有所乳之子。膈有滯痰。口氣焮熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。便須忍痛。揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰癤。治法。疏厥陰之滯。以青皮。清陽明之熱。細研石膏。行汙濁之血。以生甘草之節。消腫導毒。以瓜蔞子。或加沒藥。青橘

葉。皂角刺。金銀花。當歸。或湯或散。或加減。隨意消息。然須以少酒佐之。若加以艾火兩三壯於腫處。其效尤捷。彼村工喜於自衒。便用針刀。引惹拙病。良可哀憫。若夫不得於夫。不得於舅姑。憂怒鬱悶。昕夕積累。脾氣消阻。肝氣橫逆。遂成隱核。如大棊子。不痛不痒。數十年後。方為瘡陷。名曰妳岩。以其瘡形嵌凹似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心清神安。然後施之以治法。亦有可安之理。予族姪婦年十八時。會得此病。察其形脈稍實。但性急躁。伉儷自諧。所難者後姑耳。遂以本草單方青皮湯。間以加減四物湯。行以經絡之劑。兩月而安。

受胎論

成胎以精血之後先分男女者。褚澄之論。愚切惑焉。後閱李東垣之方。有曰經水斷後一二日。血海始淨。精勝其血。感者成男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。此確論也。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之情性也。左右陰陽之道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血。因感而會。精之施也。血能攝精成

其子。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交媾。胎孕乃凝。所藏之處。名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。則陽為之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。則陰為之主。受氣於右子宮。而女形成。或曰。分男分女。吾知之矣。男不可為父。女不可為母。與男女之兼形者。又若何而分之耶。余曰。男不可為父。得陽氣之虧者也。女不可為母。得陰氣之虛者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。而成其類不一。以女函男有二。一則遇男

爲妻遇女爲夫一則可妻而不可夫其有女具男之全者此又駁之甚者或曰駁氣所乘獨見於陰而所乘之形又若是之不同耶予曰陰體虛駁氣易於乘也駁氣所乘陰陽相混無所爲主不可屬左不可屬右受氣於兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也

○○人迎氣口論

六陽六陰脉分屬左右手心小腸肝膽腎膀胱在左主血肺大腸脾胃命門三焦在右主氣男以氣成胎

故氣爲之主女以血成胎故血爲之主若男子久病氣口充於人迎者有胃氣也病雖重可治女子久病人迎充於氣口者有胃氣也病雖重可治反此者逆

或曰人迎在左氣口在右男女所同不易之位也脉法讚曰左大順男右大順女何悖耶曰脉經一部王叔和諄諄於教醫者此左右手以醫者爲主而言若主於病者奚止千里之謬

○○春宣論

春蠢也陽氣升浮艸木萌芽蠢然而動前哲謂春時人氣在頭有病宜吐又曰傷寒大法春宜吐宣之爲言揚也謂吐之法自上出也今之世俗往往有瘡痍者膈滿者蟲積者以爲不於春時宣瀉以毒藥不可愈也醫者遂用牽牛巴豆大黃枳殼防風輩爲丸名之曰春宣丸於二月三月服之得下利而止於初瀉之時臟腑得通時暫輕快殊不知氣升在上則在下之陰甚弱而用利藥戕賊其陰其害何可勝言況仲景用承氣湯等下藥必有大滿大實堅有燥屎轉失氣下逼迫而無表證者方行此法可下之證未悉具

猶須遲以待之泄利之藥其可輕試乎余伯考形肥骨瘦味厚性沉五十歲輕於聽信忽於三月半贖春宜丸一貼服之下兩三行每年率以爲常至五十三歲時七月初炎熱之甚無病暴死此豈非妄認春宣爲春瀉而致禍耶自上召下曰宣宣之一字吐也明矣張子和先生已詳論之昔賢豈妄言哉詳之審訂無疑後之死者又有數人愚故表而出之以爲後人之戒

○○醇酒宜冷飲論

醇酒之性大熱有大毒清香美味既適於口行氣和
血亦宜於體由是飲者不自覺其過於多也不思肺
屬金性畏火其體脆其位高為氣之主腎之母木之
夫酒下咽膈肺先受之若是腎者理宜冷飲過於肺
入於胃然後漸溫肺先得溫中之寒可以補氣一益
也次得寒中之溫可以養胃二益也冷酒行遲傳化
以漸不可恣飲三益也古人終日百拜不過三爵既
無酒病亦免酒禍今余稽之於禮經則曰飲齊視冬
時飲齊酒也視猶比也冬時寒也參之內經則曰熱

因寒用厥旨深矣今則不然不顧受傷只圖取快益
熱飲有三樂存焉膈滯通快喉舌辛美盃行可多不
知酒性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀於下肺受賊
邪金體必燥恣飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷
耗其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡痍或鼻齄或自
泄或心脾痛尚可發散而去之若其久也為病深矣
為消為渴為內疸為肺痿為內痔為鼓脹為失明為
喘哮為勞嗽為癲癇亦為難明之病倘非具眼未易
處治可不謹乎或曰人言一盞冷酒須二盞血乃得

行酒不可冷飲明矣余曰此齊東之語耳今參之於
經證之以理發之為規戒子以為迂耶

○○癰疽當分經絡論

六陽經六陰經之分布周身有多氣少血者有少氣
多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處
近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞也何
則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其多
氣少血其血本少肌肉難長瘡久未合必成死證其
有不思本經少血遽用驟毒利藥以伐其陰分之血

禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者余從叔
父平生多慮質弱神勞年近五十忽左膊外側廉上
起一小紅腫大約如栗子視之曰慎勿輕視且生與
人參大料作湯得二三斤為好人未之信漫進小貼
數服未解而止旬餘值大風拔木瘡上起一道紅如
線繞至背胛直抵右肋予曰必大料人參少加當歸
川芎陳皮白朮等補劑與之後與此方兩閱月而安
又東陽李兄年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作
勞且過於色忽左腿外側廉上一紅腫其大如栗一

醫問其大腑堅實與承氣兩貼下之不效又一醫教與大黃硃砂生粉艸麒麟竭又二三貼半月後召予視之曰事去矣又一李兄年四十餘而面稍白神甚涜忽脇下生一紅腫如桃一人教用補劑衆哄且誹於是流氣飲十宣散雜而進之旬餘召予視之予曰非惟不與補藥抑且多得解利血氣俱憊矣已而果然或曰太陽經非多血少氣者乎何臀癰之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰臀居小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位

僻雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年之後不可生癰纔有痛腫參之脉證但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之禍如指諸掌

○○脾約丸論

成無己曰約者結約之約又約束之約胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便硬故曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結化津流入胃大便利小便少而愈矣愚切有疑焉何者既曰約脾弱不能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗也原其所由久病大下大汗之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣又傷於脾而成此證傷元氣者肺金受火氣無所攝傷脾者肺爲脾之子肺耗則液竭必竊母氣以自救金耗則木寡於畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行精液乃能入胃則腸潤而通矣今以大黃爲君枳實厚朴爲臣

雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤爲之佐使用之熱甚而氣實者無有不安愚恐西北二方地氣高厚人稟壯實者可用若用於東南之人與熱雖盛而血氣不實者雖得暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣後之欲用此方者須知在西北以開結爲主在東南以潤燥爲主慎勿膠柱而調瑟

○○鼓脹論

心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸

於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲無病之人今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於斯時也清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀鬱而爲熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若蟲侵蝕有蠱之義驗之治法理宜補脾又須養肺金

以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清化之令卻鹽味以防助邪斷妄想以保母氣無有不安醫不察病起於虛急於作效衒能希賞病者苦於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠古方惟禹餘糧丸又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊爲切當亦須隨證亦須順時加減用之余友俞仁叔儒而醫連得家難年五十得此疾日制禹餘糧丸服之

予診其脈弦濇而數曰此丸新製煅煉之火邪尚存溫熱之藥太多宜自加減不可執方余嘆曰今人不及古人此方不可加減服之一月口鼻見血色骨立而死又楊兄年近五十性嗜好酒病瘧半年患脹病自察必死來求治診其脈弦而濇重則大瘧未愈手足瘦而腹大如蜘蛛狀予教以參朮爲君當歸川芎芍藥爲臣黃連陳皮茯苓厚朴爲佐生甘艸些少作濃湯飲之一日定三次彼亦嚴守戒忌一月後瘧因汗而愈又半年小便長而脹愈中間雖稍有加減大意只是補氣行濕又陳氏年四十餘性嗜酒大便時

見血於春間患脹色黑而腹大其形如鬼診其脈數而濇重似弱予以四物湯加黃連黃芩木通白朮陳皮厚朴生甘艸作湯與之近一年而安一補氣一補血餘藥大率相出入皆獲安以保天壽或曰氣無補法何予補氣而獲安果有說以通之乎予曰氣無補法世俗之言也以氣之爲病痞悶壅塞似難於補恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所著而不出所以爲病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟或

氣怯不用補法氣何由行或曰子之藥審則審矣何效之遲也病者久在床枕必將厭子之迂而求速效者矣予曰此病之起或三五年或十餘年根深矣勢篤矣欲求速效自求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與利藥耶予曰灼知其下因于虛受病亦淺脾胃尚壯積滯不痼而又有可下之證亦宜略與疏導若授張子和濬川散禹功丸爲例行迅攻之策實所不敢。

○○疝氣論

疝氣之甚者睾丸連小腹急痛也有痛在睾丸者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有聲或無聲有形如瓜有聲如蛙自素問以下歷代名醫皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒故引不行所以作痛理固然也亦有得寒而無疝者又必有說以通之可也予嘗屢因門戶雪上有霜沒脛之水踢冰徒涉不曾病此以予素無熱在內也因而思之此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束濕熱之邪不得疏散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致乎曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之久母能生子虛濕氣便盛厥陰屬木久於肝爲將軍之官其性急速火性又暴爲寒所束宜其痛之大暴也愚見有用烏頭梔子等分作湯用之其效亦敏後因此方隨證與形加減用之無有不應然濕熱又須分多少而始治但濕者腫多癩病是也又有挾虛而發者當以參术爲君而以疏導藥佐之診其脈有甚沉緊而大豁無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳。

○○秦桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用藥溫熱近乎人情欣然授之錮然服之甘受燔灼之禍猶且懵然不悔何者陽精之施也陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須補其陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何乃輕用熱

劑煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵矣或曰春氣溫和
則萬物發生冬氣寒凜則萬物消殞非春之溫
熱何由得子臟溫暖而成胎耶予曰詩言婦人和平
則樂有子和則氣血不乖乎則陰陽不爭今得此藥
經血轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久
則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成
胎縱使成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸之耗損
天眞之陰也戒之愼之鄭廣使之子年十六求醫曰
我生七箇月患淋病五日七日必一發其發也大痛
地叫天水道方行狀如漆和粟者約一盞許然後

定診其脈輕則濇重則弦視其形瘦而稍長其色靑
而蒼意其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之
命門而然遂以紫雪和黃蘗細末丸梧子大曬十分
乾而與二百丸作一服經二時又與三百丸作一服
率以熱湯下以食物壓之又經半日痛大作連腰腹
水道乃行下如漆和粟者一大碗許其病減十分之
八後張子中以陳皮一兩桔梗木通各半兩作一貼
與之又下漆粟者一合許遂安父得燥熱且能病子

況母得之者乎余書此以證東垣紅絲瘤之事

○○惡寒非寒病惡熱非熱病論

經曰惡寒戰慄皆屬於熱又曰禁慄如喪神守皆屬
於火惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身自覺凜
凜戰慄禁慄動搖之貌如喪神守惡寒之甚原病式
曰病熱甚而反覺自冷此爲病熱實非寒也或曰往
往見有得熱藥而少愈者何也予曰病熱之人其氣
炎上鬱爲痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰
得熱亦爲暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此

誰敢以寒涼與之非殺之而何予曰古人遇戰慄之
證有以大承氣下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱證
但有虛實之分耳經曰陰虛則發熱夫陽在外爲陰
之衛陰在內爲陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗
散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱也實非
有熱當作陰虛治之而用補養之法可也或曰惡寒
非寒宜用寒藥惡熱非熱宜用補藥甚駭耳目明示
我之法可乎予曰進士周本道年逾三十得惡寒病
服附子數日而病甚求予治診其脈弦而似緩予以

江茶入薑汁香油些少吐痰一升許減綿太半周甚喜予曰未也燥熱已多血傷亦深須淡食以養胃內觀以養神則水可生而火可降彼安於往進一切發外不守禁忌予曰若多與補血涼藥亦可稍安內外不能則腎水不生附毒必發病安後宜於羹戒遂夜胃寒非附子不可療而性怕生薑只得以猪腰子作片炙附子與三貼而安予曰可急歸知其附毒易發彼以爲迂幾年後果發背而死又司丞叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於上常自言曰我稟質壯

不怕冷予曰此足三陰之虛宜早斷欲事以補養陰血庶乎可免吠而不答年方五十患瘓半年而死觀此二人治法盍可知矣或曰傷寒病惡寒惡熱者亦是虛耶予曰若病傷寒者自外入內先賢論之詳矣愚奚庸贅

○○經水或紫或黑論

經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血爲氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指爲風冷而行溫熱之劑禍不旋踵矣良由病源論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北方水之色也紫淡於黑非冷而何予曰經曰亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也況婦人性執而見鄙嗜慾加倍臟腑厥陽之火無日不起非熱而何若夫風冷必須

外得設或有之蓋千百而一二者也

○○石膏論

本艸藥之命名固有不可曉者中間亦多有意義學者不可以不察以色而名者大黃紅花白前青黛烏梅之類是也以形而名者人參狗脊烏頭貝母金鈴子之類是也以氣而名者木香沈香檀香麝香茴香之類是也以質而名者厚朴乾薑茯苓生熟地黃之類是也以味而名者甘艸苦參淡竹葉艸龍膽苦酒之類是也以能而名者百合當歸升麻防風滑石之

類是也以隸而名者半夏茵蔯冬葵寅雞夏枯草之類是也以石膏火煅細研醋調封丹爐其固密甚於脂苟非有膏焉能爲用此兼質與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石爲石膏況石膏其味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石者止有體重質堅性寒而已求其所謂有膏而可爲三經之主治者焉在哉醫欲責效不亦難乎

○○脉大必病進論

脉血之所爲屬陰大洪之別名火之象屬陽其病得之於內傷者陰虛爲陽所乘故脉大當作虛治之其病得之於外傷者邪客於經脉亦大當作邪勝治之合二者而觀之皆病證方長之勢也謂之病進不亦宜乎海藏云君侵臣之事也就爲是否幸有以教之

○○生氣通天論病因章句辯

禮記曰一年視離經謂離析經理在乎章句之絕內經生氣通天論病因四章第一章論因於寒欲如運樞以下三句與上文意不相屬皆衍文也體若燔炭汗出而散兩句當移在此夫寒邪初客於肌表邪鬱而爲熱有似燔炭得汗則解此仲景麻黃湯之類是也第二章論因於暑暑者君火爲病火主動則散故自汗煩渴而多言也第三章論因於濕濕者污濁之氣首爲諸陽之會其位高而氣清其體虛故聰明得而係焉濁氣熏蒸清道不通沉重而不爽利似乎有物以蒙冒之失而不治濕鬱爲熱熱留不去大筋緛短者熱傷而不能養筋故爲拘攣小筋弛長者濕傷

筋不能束骨故爲痿弱因於濕首如裹各三字爲句濕熱不攘以下各四字爲句文正而意明第四章論因於氣爲腫下文不序病證蓋是脫簡四維相代三句與上文意不相屬亦衍文也王太僕曰暑熱濕氣三病皆以爲發於傷寒之毒次第相仍展轉生病五段通爲一章余有疑焉暑病不治伏而生熱熱久生濕濕久氣病蓋有之矣內經止有冬傷於寒不即病至夏有熱病之言未聞寒毒伏藏至夏發於暑病至於濕病亦蒙上文之熱謂反濕其首望濕物裹之望

除其熱當以因於濕首爲句如果濕又爲句則濕首之濕果濕之濕皆人爲也與上下文列言寒暑之病因文義外乖不容於不辨或曰先賢言溫濕寒濕風濕矣未聞有所謂濕熱病者攷之內經亦無有焉吾子無乃失之迂妄耶予曰六氣之中濕熱爲病十居八九內經發明濕熱此爲首出至眞大要論曰濕上甚而熱其間或言濕而熱在中者或曰熱而濕在中者此聖人愛人論道之極致使天下後世不知濕熱之治法者太僕啓之也君其歸取原病式熟讀而參思之幸甚

○○太僕章句

因於寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮

因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散

因於濕首句如果濕句熱不攘句大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿

因於氣爲腫云云

○○新定章句

因於寒體若燔炭汗出而散

因於暑汗煩則喘喝靜則多言

因於濕句首如裹句濕熱不攘句大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿

因於氣爲腫云云

○○倒倉論

經曰腸胃爲市以其無物不有而穀爲最多故謂之倉若積穀之室也倒者傾去積舊而滌濯使之潔淨也胃居中屬土喜容受而不能自運者也人之飲食遇適口之物寧無過量而傷積之乎七情之偏五味

之厚寧無傷於沖和之德乎糟粕之餘停痰瘀血互相糾纏日積月深鬱結成聚甚者如核桃之穰諸般奇形之蟲中宮不清矣土德不和矣誠於中形於外發爲癱瘓爲勞瘵爲蠱脹爲癩疾爲無名奇病先哲製爲萬病丸溫白丸等劑攻補兼施寒熱並用期中病情非不工巧然不若倒倉之爲便捷也以黃牡牛擇肥者買一二十斤長流水煮糜爛融入湯中爲液以布濾出查滓取淨汁再入鍋中文火熬成琥珀色則成矣每飲一鍾少時又飲如此者積數十鍾寒月

則重湯溫而飲之。病在上者欲其吐。多病在下者欲其利。多病在中者欲其吐下俱多。全在活法而爲之緩急多寡也。須先置一室明快而不通者。以安病人處所出之物。可盡病根則止。吐利後或渴不得與湯。其小便必長。取以飲病者。名曰輪廻酒。與一二碗。非惟可以止渴抑且可以滌濯餘垢。睡一二日。覺飢甚乃與粥淡食之。待三日後始與少菜羹自養。半月覺精神渙發形體輕健。沉痾悉安矣。其後須五年忌牛肉。吾師許文懿始病心痛。用藥燥熱香辛。如丁附桂

姜輩治數十年而足攣痛甚。且惡寒而多嘔。甚而至於靈砂黑錫黃芽歲丹。繼之以艾火十餘萬。又雜治數年而痛甚。自分爲廢人矣。衆工亦技窮矣。如此者又數年。因其煩渴惡食者一月。以通聖散與半月餘而大腑遁迫後重肛門熱氣如燒。始時下積滯如五色爛錦者如桕燭油凝者。近半月而病似退。又半月略思穀而兩足難移。計無所出。至次年三月。遂作此決。節節如應。因得爲全人。次年再得一男。又十四年以壽終。其餘與藥一婦人久年脚氣吐利而安。又鎮

海萬戶蕭伯善公以便濁而精不禁。親與試之有効。又臨海林兄患久嗽吐紅。發熱消瘦。衆以爲瘵。百方不應。召予視之。脉兩手弦數。日輕夜重。計無所出。亦因此而安。時冬月也。第二年得一子。牛坤土也。黃土之色也。以順爲德而效法乎健以爲功者。牡之用也。肉者胃之樂也。熟而爲液。無形之物也。横散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲。無不入也。積聚久則形質成。依附腸胃回薄曲折處。以爲栖泊之窠臼。阻礙津液氣血。薰蒸燔灼成病。自非剖腸刮骨之神妙

孰能去之。又豈合勺銖兩之丸散所能窺犯其藩墻戶牖乎。竊詳肉液之散溢。腸胃受之。其厚皆倍於前。有似乎腫。其回薄曲折處非復向時之舊。肉液充滿流行。有如洪水泛漲。其浮莝陳朽皆推逐蕩漾。順流而下。不可停留。表者因吐而汗。清道者自吐而涌。濁道者自泄而去。凡屬滯礙一洗而定。牛肉全重厚和順之性。盎然渙然。潤澤枯槁。補益虛損。寧無精神渙發之樂乎。正似武王克商之後。散財發粟以賑殷民之仰望也。其方出於西域之異人。人於中年後亦行

一二次亦却疾養壽之一助也

○○相火論

太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火金木土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配于五行故謂之君以位而言生于虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒于動人有此生亦恒于動其所以恒于動皆相火之爲也見于天者出于龍雷則木之氣

出于海則水之氣也具于人者寄于肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出于木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附于地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也或曰相火天人之所同何東垣以爲元氣之賊又曰火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可以使之無勝負也曰周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲物所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起于妄變化莫測無時不有煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚于君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉此善處乎火者人心聽命乎道心而

又能主之以靜彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用耳何賊之有或曰內經相火注曰少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何邪曰足太陽少陰東垣嘗言之矣治以炒蘗取其味辛能瀉水中之火是也戴人亦言膽與三焦尋火治肝和胞絡都無異此歷指龍雷之火也予亦備述天人之火皆生於動如上文所云者實推廣二公之意或曰內經言火不一往往于六氣見之言臟腑者未之見也二公豈它有所據耶子能爲我言之

乎經曰百病皆生于風寒暑濕燥火之動而爲變者。歧伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火之爲病之出于臟腑者乎致諸内經少陽病爲瘛瘲太陽病時眩仆少陰病瞀暴瘖鬱冒不知人非諸熱瞀瘛之屬火乎少陽病惡寒鼓慄膽病振寒少陰病洒淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒非諸禁鼓慄如喪神守之屬火乎少陽病嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝胸小腹控睪引腰脊上衝心少陰病氣上衝胸嘔逆非諸逆衝上之屬火乎少陽病譫

妄太陽病譫妄膀胱病狂顛非諸躁狂越之屬火乎少陽病胕腫善驚少陰病瞀熱以酸胕腫不能久立非諸病胕腫疼酸驚駭之屬火乎又原病式曰諸風掉眩屬于肝火之動也諸氣膹鬱病痿屬于肺火之升也諸濕腫滿屬于脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬于心火之用也是皆火之爲病出於臟腑者然也注文未之發耳以陳無擇之通敏且以暖識論君火日用之火言相火而又不曾深及宜乎後之人不無聾瞽也悲夫

左大順男右大順女論

肺主氣其脈居右寸脾胃命門三焦各以氣爲變化運用故皆附焉心主血其脈居左寸肝膽腎膀胱皆精血之隧道筦庫故亦附焉男以氣成胎則氣爲之主女挾血成胎則血爲之主男子久病右脈充于左者有胃氣也病雖重可治女子久病左脈充于右者有胃氣也病雖重可治反此者虛之甚也或曰左心小腸肝膽腎膀胱右肺大腸脾胃命門三焦男女所同不易之位也脈法贊曰左大順男右大順女吾子

之言非惟左右倒置似以太爲充果有說以通之乎曰大本病脈也今以大爲順蓋有充足之義故敢以充言之脈經一部諄諄于教爲醫者爾此左右當以醫者爲言若主於病奚止於千里之謬或曰上文言肝心出左脾肺出右左主司官右主司府下文言左爲人迎右爲氣口皆以病人之左右而爲言何若是之相反耶曰脈經第九篇之第五章上文大浮數動長滑沉濇弱弦短微此言形狀之陰陽下文關前關後等語又言部位之陰陽陰附陽陽附陰皆言血氣

之陰陽同爲論脉之陰陽而所指不同若此上下與文何足疑乎讚曰陰病治宫非治氣乎陽病治府非治氣乎由此参考或恐于經意有合

○茹淡論

或問内經謂精不足者補之以味又曰地食人以五味古者年五十食肉子今年邁七十矣盡卻鹽醯豈中道乎何子之神茂而色澤也曰味有出于天賦者有成于人爲者天之所賦者若穀菽菜果自然冲和之味有食人補陰之功此内經所謂味也人之所爲者皆烹飪調和偏厚之味有致疾伐命之毒此吾子所疑之味也今鹽醯之卻非眞茹淡者大麥與粟之鹹粳米山藥之甘葱薤之辛之類皆味也子以爲淡乎安于冲和之味者心之收火之降也以偏厚之味爲安者欲之縱火之勝也何疑之有内經又曰陰之所生本在五味非天賦之味乎陰之五宫傷在五味非人爲之味乎聖人防民之具於是爲備凡人飢則必食彼粳米甘而淡者土之德也物之屬陰而最補者也惟可與菜同進經以菜爲充者恐于飢時頓食

或慮過多因致胃損故以菜助其充足取其疏通而易化此天地生物之仁也論語曰肉雖多不使勝食氣傳曰賓主終日百拜而酒三行以避酒禍此聖人施教之意也蓋穀與肥鮮同進厚味得穀爲助其積之也久寧不助陰火而致毒乎故服食家在卻穀者則可不卻穀而服食未有不被其毒者内經謂久而增氣物化之常氣增而久夭之由也彼安于厚味者未之思爾或又問精不足者補之以味何不言氣補曰味陰也氣陽也補精以陰求其本也故補之以味若甘艸白术地黄澤瀉五味子天門冬之類皆味之厚者也經曰虚者補之正此意也上文謂形不足者温之以氣夫爲勞倦所傷氣之虚故不足温者養也温存以養使氣自充氣完則形完矣故言温不言補經曰勞者温之正此意也彼爲局方者不知出此凡諸虚損證悉以温熱佐輔補藥名之曰温補不能求經旨者也

○氣逆論

叱病氣逆也氣自臍下直衝上出于口而作聲之名

也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬于火東垣謂火與元氣不兩立又謂火氣之賊也古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蔕竹茹陳皮等劑治之未審孰爲降火孰爲補虛人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗木賊也胃爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此似爲死證然亦有實者不可不知敢陳其說趙立道年近五十質弱而多怒七月炎暑大飢索飯其家不能急具因大怒兩日後

得滯下病口渴自以冷水調生蜜飲之甚快滯下亦漸緩如此者五七日召予視脉稍大不數遂令止蜜水渴時但令以人參白术煎湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後覺倦甚發吃予知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尚未止又以煉蜜飲之如此者三日吃猶未止衆皆尤藥之未當將以姜附飲之予曰補藥無速効附子非補陰者服之必死衆曰冷水飯多得無寒乎予曰炎暑如此飲凉非寒勿多疑待以日數力到當自止又四日而吃止滯下亦安

又陳擇仁年近七十厚味之人也有久喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作召予視脉皆大豁衆以爲難予曰形瘦者尚可爲以人參白术湯下大補丸以補血至七日而安此二人者虛之爲也又一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒而吃作每作則舉身跳動神昏不知人問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參蘆煎湯飲一椀大吐頑痰數椀大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陽中之陰者也蘆則反爾大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主

怒肺主氣經曰怒則氣逆氣因怒逆肝木乘火侮肺故吃大作而神昏參蘆喜吐痰盡氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解麻黃發汗節能止汗穀屬金糠之性熱麥屬陽麩之性凉先儒謂物物具太極學者其可不觸類而長引而伸之乎

○房中補益論

或問千金方有房中補益法可用否予應之曰傳曰吉凶悔吝生乎動故人之疾病亦生于動其動之極也病而死矣人之有生心爲火居上腎爲水居下水

能升而火能降一升一降無有窮已故生意存焉水之體靜火之體動動易而靜難聖人于此未嘗忘言也儒者立教曰正心收心養心皆所以防此火之動于妄也醫者立教恬澹虛無精神內守亦所以遏此火之動于妄也蓋相火藏于肝腎陰分君火不妄動相火惟有稟命守位而已焉有燔灼之虐燄飛走之狂勢也哉易兌取象于少女兌說也遇少男艮為咸咸無心之感也艮止也房中之法有艮止之義焉若艮而不止徒有戕賊何補益之有竊詳千金之意彼

壯年貪縱者水之體非向日之靜也故著房中之法為補益之助此可用于質壯心靜遇敵不動之人也苟無聖賢之心神仙之骨未易為也女法水男法火水能制火一樂于與一樂于取此自然之理也若以房中為補殺人多矣況中古以下風俗日偷資禀日薄說夢向癡難矣哉

○天氣屬金說

邵子曰天依地地依天天地自相依附內經曰大氣舉之也夫自清濁肇分天以氣運于外而攝水地以形居中而浮于水者也是氣也即天之謂也自其無極者觀之故曰大氣至清至剛至健屬乎金者也非至剛不能攝此水非至健不能運行不息以舉地之重非至清至剛健不能長上古而不老或曰子以天氣為屬金者固易卦取象之義何至遂以屬金言之乎善言天者必有證於人善言大者必有譬於小願明以告我曰天生萬物人為貴人形象天可以取譬肺主氣外應皮毛內經謂陽為外衛非皮毛乎此天之象也其包羅骨肉腑臟於其中此地之象也血行

於皮裏肉腠晝夜周流無端此水之象也合三者而觀非水浮地天攝水地懸於中乎聖人作易取金為氣之象厥有旨哉

○張子和攻擊注論

愚閱張子和書惟務攻擊其意以為正氣不能自病因為邪所客所以為病也邪去正氣自安因病有在上在中在下深淺之不同立為汗吐下三法以攻之初看其書將謂醫之法盡於是矣後因思內經有謂之虛者精氣虛也謂之實者邪氣實也夫邪所客必

因正氣之虛然後邪得而客之苟正氣實邪無自入之理由是于子和之法不能不致疑於其間又思內經有言陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕又思仲景有言病當汗解診其尺脉濇當與黃芪建中湯補之然後汗之於是以子和之書非子和之筆也馳名中上其法必有過於明輩者何其書之所言與內經仲景之意若是之不同也於是決意於得名師以為之依歸發其茅塞遂遊江湖但聞某處有某治醫便往拜而問之連經數郡無一人焉後到定城始得原病式東垣方藁乃大悟子和之孟浪然終未得的然之議論將謂江浙間無可為師者泰定乙丑夏始得聞羅太無於陳芝岩之言遂往拜之蒙叱罵者五七次趑趄三閱月始得降接因觀羅先生治一病僧黃瘦倦怠羅公詢其病因乃蜀人出家時其母在堂及遊浙右經七年忽一日念母之心不可遏欲歸無腰纏徒爾朝夕西望而泣以是得病時僧二十五歲羅令其隔壁泊宿每日以牛肉猪肚甘肥等煮糜爛與之凡經半月餘且時慰諭之之言勞之又曰我

與鈔十錠作路費我不望報但欲救汝之死命爾察其形稍甦與桃仁承氣一日三貼下之皆是血塊痰積方止次日只與熟乾菜稀粥將息又半月其人遂如故又半月餘與鈔十錠遂行因大悟攻擊之法必其人充實稟質本壯乃可行也否則邪去而正氣傷小病必重重病必死羅每日有求醫者來必令其診視脉狀回稟羅但臥聽口授用某藥治某病以某藥監其藥以某藥為引經往來一年半並無一定之方至於一方之中自有攻補兼用者亦有先攻後補者有先補後攻者又大悟古方治今病焉能吻合隨時取中其此之謂乎是時羅又言用古方治今病正如拆舊屋揍新屋其材木非一不再經匠氏之手其可用乎由是又思許學士釋微論曰予讀仲景書用仲景之法然未嘗守仲景之方乃為得仲景之心也遂取東垣方藁手自抄錄乃悟治病人當如漢高祖蹤秦暴周武王蹤商之後自非發財散粟與三章之法其受傷之氣倦憊之人何由而平復也於是定為陰易乏陽易亢攻擊宜詳審正氣須保護以局方為戒

故

格致餘論卷之二終

丹谿先生金匱鈎玄三卷

（元）朱震亨撰

明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

金匱鉤元三卷、江蘇巡撫採進本

元朱震亨撰、明戴原禮校補。中稱戴云者、原禮說也。末附論六篇、不列於目錄中。一曰火豈君相五志俱有論、一曰氣屬陽動作火論、一曰血屬陰難成易虧論、一曰滯下辨論、一曰三消之疾燥熱勝陰論、一曰泄瀉從濕治有多法論、皆不題誰作。觀其滯下辨論引震亨之言、則亦原禮所加也。震亨以補陰爲宗、實開直補眞水之先。其以鬱治病、亦妙闡內經之旨、開諸家無窮之悟。雖所用黃蘗知母不如後人之用六味圓直達本原。所製越鞠丸亦不及後人之用逍遙散和平無弊。然蓽路藍縷、究以震亨爲首庸。是書詞旨簡明、不愧鉤元之目。原禮所補、亦多精確。明史方技傳載此書於原禮傳中、卷數與今本同。稱其附以己意、人謂不愧其師、其爲醫家善本可知矣。原禮、浦江人、洪武中御醫。本名思恭、以字行、故史作戴思恭。朱國禎湧幢小品曰、戴元禮、國朝之聖醫也。太祖稱爲仁義人。太孫即位、拜院使云云。元禮即原禮、蓋國禎得諸傳聞、故音同字異耳。

丹溪先生金匱鉤玄目錄

卷第一

中風 六鬱 癩 寒
傷寒 注夏 暑風
濕 火 傷風
發斑 溫病 瘧
咳嗽 喘 哮
痢 禁口痢 泄瀉 脾泄
霍亂 乾霍亂 嘔吐 惡心
翻胃 傷食 痞 噯氣
吞酸 嘈雜 五疸 消渴泄瀉
水腫 鼓脹 自汗 盜汗
吃逆 頭風 頭痛 頭眩
眩暈 眉痛 耳聾

卷第二

心痛 腰疼 脇痛 腹痛
痛風 勞瘵 咳血 嘔血
咯血 衄血 溺血 下血
腸風 夢遺 精滑 濁
淋 小便不通 關格 小便不禁
癇 健忘 怔忡 驚悸
痓 血塊 吐蟲 癥瘕
疝 脚氣 痿 發熱
陽虛惡寒 手心熱 手麻 手木
厥 面寒面熱 喉痺 纏喉風
咽喉生瘡 口瘡 酒査鼻 肺癰
肺痿 天疱瘡 漏瘡 痔瘡
腸癰 結核 脫肛

卷第三

婦人科 經水 血崩 帶下赤白
白帯并痛風 子嗣 胎前
胎動 惡阻 束胎 安胎
胎漏 子腫 難產 催生方
產後 血暈 補虛 消血塊
泄 惡露不盡 中風
發熱惡寒
小兒科 吐瀉黃疸 急慢驚風
疳病 痘瘡 腹脹 夜啼
口糜 脫囊 脫肛 木舌
癮疹 咯紅 喫泥 痢疾食積

解顱　蚘蝕　口噤　風痰
癩頭　赤瘤　鼻赤

丹溪先生金匱鉤玄卷第一

門人戴元禮校　新安吳勉學校正

中風

大率主血虛有痰以治痰為先或虛挾火與濕亦有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在

右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鰕汁皂角重用藜蘆半錢或三分加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝

又法以猪牙皂角白礬等分為末薑湯調下名稀

涎散

血虛者四物湯補之　挾痰者亦用薑汁竹瀝

脉訣內言諸不治證見則不可治筋枯者不治舉

動則筋痛者是筋枯以其無血滋潤故也

治痰氣實能食用荊瀝　氣虛少食用竹瀝

此二味用開經絡行血氣入四物湯中必用薑

汁助之

肥白人多濕少用附子烏頭行經

初昏倒急掐人中至醒然後用去痰藥二陳湯四

物四君子等湯加減用

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此為傳化失常六鬱之病見矣氣鬱者胷脇痛脉沉澁濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則即喘寸口脉沉滑熱鬱者昏小便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食便紅脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛者是也

氣血中和萬病不生一有怫鬱諸病生焉

氣鬱　香附子　蒼朮　川芎

濕　蒼朮　川芎　白芷

痰　海石　香附　南星　瓜蔞

熱　青黛　香附　蒼朮　川芎　梔子

血　桃仁　紅花　青黛　川芎　香附

食　蒼朮　香附　鍼沙醋炒　山查　神麴炒

春加芎　夏加苦參　秋冬加吳茱萸

越鞠丸　解諸鬱　又名芎朮丸

蒼朮　香附　撫芎　神麴　梔子等分為

末水丸如菉豆大

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假

如食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

癩

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蟲於穀道中出所出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其疙瘩與瘡上先見者上體多者在上也下先見者下體多者在下也上下同得者在上復

在下也陽明胃經與大腸無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多血氣俱受之者上下俱多也自非賢者帥手病者鐵心罕有免此夫從上從下以漸而來者皆可治人見其病勢之緩多忽之雖按法施治病已痊可若不能忌口絕色皆不免再發發則終於不能救也余曾治五人中間惟一婦人不再發以其貧共而且寡無物可喫也餘四人三四年後皆再發孫真人云吾嘗治四五十人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病藥外又服百餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分安愈

治法　在上者醉仙散在下者通天再造散後用通神散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者不治之也

醉仙散

胡麻仁　牛蒡子　蔓荊子　枸杞子各半兩為粗末同炒紫色

白蒺藜　苦參　瓜蔞根

防風各半兩

右八味為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻大人一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下惡臭屎為度量大小虛實加減與之證候重而急者須以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物止可淡粥及淡煮熟蔬菜食之茄亦不可食惟有烏稍蛇菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

鬱金半兩生用　大黃一兩炮　皂角刺一兩黑者大者

白牽牛頭末六錢半炒半生用之

右為末五錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄出蟲

如蟲口黑色乃是多年蟲口如赤色是近者三數日又進一服直候無蟲則絕根也

寒　主乎溫散

有卒中天地之寒氣有口傷生冷之物

戴云此傷寒謂身受肅殺之氣口食冰水瓜果冷物之類病者必脈沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言語或遇熱病誤用此法輕者至重重者至死凡脈數者或飲水者或煩燥動搖者皆是熱病寒熱二證若水火也不可得而同治誤即殺人學者慎之

傷寒

傷寒必須身犯寒氣口食寒物者從補中益氣湯中加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之證出入加減氣虛熱甚者少用附子以行參芪之劑如果氣虛者方可用此法　已上傷寒治法可用於南方不宜北

暑

戴云暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辯或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲蓋黃連退暑熱香薷消畜水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在分肉也當以解毒白虎湯加柴胡氣如虛者加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脈數者熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可遲則不可治矣或火乘金也此為中暑凡治病須要明白辯別慎勿滾同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方為妙

黃連香薷飲　挾痰加半夏　乘虛加人參黃

食或清暑益氣湯加減用之

注夏　屬陰虛元氣不足

戴云秋初夏末頭痛腳軟食少體熱者是也補中益氣湯去柴胡升麻加炒黃柏挾痰止用南星半夏陳皮之類或生脈散出千金方

暑風

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎爍所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞礙心之竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之挾火挾痰實者可用吐法吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

濕

戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多自下起以重腿腳氣者多治當汗散久者宜疏通滲泄西北地高人多食生冷濕麵或飲酒後寒氣怫鬱濕不能越作腹皮脹痛甚則水鼓脹滿或通身浮腫如泥按之不起此皆自內而出也辯其元

氣多少而通利其二便責其根在內也此方土內外亦互相有之但多少不同須對證施治不可執一

本草蒼朮治濕上下俱可用

二陳湯加酒芩羌活蒼朮散風之藥行濕最妙

內傷

一內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺家可用參苓甘草少許薑汁冷服或茶匙挑薑汁與之虛者可用人參湯世之病此者爲多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於內而發者皆以補元氣爲主看其所挾之病而兼用藥

火

有可發者二 風寒外來者可發 鬱者可發

陰虛火動難治 火鬱當發看何經 輕者可降重則從其性升之 實火可瀉 小便降火極速

凡氣有餘便是火

火急甚重者必緩之生甘草兼瀉兼緩人參白朮亦可

人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝冰水飲之人虛火盛狂者可用生薑湯與之若投以冰水正治立死有補陰即火自降者炒黃柏地黃之類

山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下行降火人所不知

凡火盛者不可驟用涼藥必用溫散

又方左金丸治肝火

黃連六兩 茱萸一兩或半兩 水爲丸白湯下五十丸

傷風

戴云新咳嗽鼻塞聲重者是也

屬肺者多 散宜辛溫或辛涼之劑

發斑 屬風熱

戴云斑有色點而無頭粒者是如有頭粒即疹也

風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散消息當以微汗而散之下之非理也

內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降之發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之下之非理也

疹

戴云疹浮小有頭粒者是隨出即收收則又出者是也非若斑之無頭粒也當明辨之

屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者

溫病

衆人病一般者是也又謂之天行時疫有三法宜補宜降宜散

又方

大黄　黄芩　黄連　人參　桔梗　防風

蒼术　滑石　香附　人中黄

右為末神麯為丸每服五七十丸分氣血痰作湯使氣虚四君子湯血虚四物湯痰多二陳湯送下如熱甚者可用童子小便送下

大頭天行病東垣有方

羌活　酒芩　大黄酒蒸

冬温為病非其時而有其氣者冬時君子當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表

又方以竹筒兩頭留節中作一竅納甘草於中仍以竹木釘閉竅於大糞缸中浸一月取出晒乾專治疫毒

瘧　有風有暑有食老瘧瘧母痰病

老瘧病此係風暑入陰分在臟用血藥川芎撫芎紅花當歸加蒼术白术白芷黄柏甘草煎露一宿次早服之無汗要有汗散邪為主帶補有汗要無汗正氣為主帶散有瘧母者丸藥消導醋煮鱉甲為君三稜蓬朮香附隨證加減

三日一發者受病一年間日發者受病半年一日一發者受病一月連二日發者住一日者氣血俱受病一日間一日者補藥帶表藥後用瘧丹截之在陰分者用藥徹起在陽分方可截之

又方

草果　知母　檳榔　烏梅　常山　甘草炙

川山甲炮　用水酒一大碗煎至半碗露一宿臨發日前二時温服如吐則順之

截瘧青蒿丸

青蒿一斤　冬青葉二兩　馬鞭草二兩

官桂二兩

右三葉皆晒乾秤為末法丸如胡椒子大每兩作四服於當發前一時服盡

大法暑風必當發汗夏月多在風凉處歇遂閉其汗而不泄因食者從食上治

瘧而虚者須先用參术一二貼托住其氣不使下陷後用他藥治内傷挾外邪者同法内必主痰必以汗解二陳湯加常山柴胡黄芩草果

痢而甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗可與參芪术苓蓮梔子川芎苓术半夏等治

久病瘧二陳湯加川芎苓术柴胡葛根白术一補一發

欬嗽

風寒　火主降火　勞　肺脹　火鬱

痰主降痰

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也

風寒行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔梗

火降火清金化痰

勞四物湯中加竹瀝薑汁必以補陰為主

肺脹而嗽者用訶子青黛杏仁訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火之功佐以海蛤粉香附瓜蔞青黛半夏麴

食積痰作嗽發熱者半夏南星為君瓜蔞蘿蔔子為臣青黛石鹼為使

火鬱嗽者訶子海石瓜蔞青黛半夏香附

咳嗽聲嘶者此血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調服

久嗽風入肺用鵝管石雄黃鬱金款冬花碾末和艾中以生薑一片留舌上灸之以煙入喉中為度

乾咳嗽者難治此係火鬱之證乃痰鬱火邪在中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞倒倉好此證不得志者有之

嗽而脇痛宜疎肝氣用青皮等方在後二陳湯內加南星香附青黛薑汁

治嗽藥大槩多用生薑者以其辛散也

上半日嗽多者屬胃中有火貝母石膏能降胃火

金匱鉤玄　卷一　十二

午後嗽多者此屬陰虛必用四物湯加知母黃柏先降其火

五更嗽多者此胃中有食積至此時候流入肺金知母地骨皮降肺火

火氣浮於肺者不宜用凉藥用五味五倍斂而降之有痰因火逆上者先治火後治其痰也

肺虛甚者用參膏此好色腎虛有之以生薑陳皮佐之大槩有痰者可加痰藥治之

治嗽多用粟殼不必疑但要先云病根此乃收後之藥也　師云陰分嗽者多屬陰虛治之也

有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治

治嗽煙筒

佛耳草　款冬花　鵝管石

右爲末用紙捲燒其煙薰之或白湯調亦得

治嗽有痰天突肺腧二穴灸治嗽泄火熱大瀉肺氣三椎骨下橫過各一寸半是穴

嗽春是春升之氣用清藥二陳加薄荷之類夏是火炎上最重芩連秋是濕熱傷肺冬是風寒外來用藥發散之後以半夏必逐去痰庶不再來

又方治嗽劫藥

五味子半兩　五倍子一錢　甘草二錢半

風化硝一錢　爲末以蜜爲丸噙化之

痰　脉滑當吐

凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生多

濕痰　用蒼朮

老痰　海石　半夏　瓜蔞子　香附　五倍子

熱痰　用青黛　黃連

食積痰　神麯　麥糵　山查子

痰在膈間者可下而愈痰在經絡中者非吐不可出吐法中就有發散之義也

一膈上之痰必用吐之瀉亦不能去也

氣實痰熱結在上者則吐吐難得出或成塊或吐咯不出氣滯兼鬱者此則難治矣

膠固者必用吐之

吐法兼用牙茶齏水薑汁醋少許瓜蔞散少許加防風桔梗皆升動其氣便吐也

吐法　用附子尖　桔梗蘆　人參蘆　瓜蔕

砒不甚用　藜蘆　艾葉　末茶

右藥此皆自吐不用手探但藥但湯皆可吐

吐法先以布搭膊勒腰於不通風處行此法

蘿蔔子半升擂和以漿水一椀濾去相入少油與蜜旋至半溫服後以鵝翎探吐凡用鵝翎須以桐油浸却以皂角水洗去肥晒乾用之

又法用蝦帶殼半斤入醬蔥薑等料物煮汁先喫蝦後飲汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹

二陳湯一身之痰都能管如在下加下引藥如在上加上引藥

凡人身上中下有塊者多是痰也問其平日好食何物吐下後用藥

許學士用蒼朮治痰飲成窠囊一邊行極効痰挾

瘀血遂成窠囊

痰之清者屬寒用二陳湯之類

內傷挾痰必用人參黃芪白朮之屬多用薑汁傳送或用半夏之屬虛甚者宜加竹瀝

痰熱者多挾風外證為多

濕者多軟如身倦而重之類熱者清之食積者必用攻之兼氣虛者用補氣藥補之

因火盛逆上者治火為先白朮黃芩石膏之類中氣不足則加人參白朮痰之為物隨氣升降無處不到

脾虛者清中氣二陳加白朮之類兼用提藥

中焦有痰與食積胃氣賴其所養卒不便虛若攻之盡則虛矣

眩暈嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連類

噎氣吞酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏為臣橘紅佐之熱多者加青黛

痰在脅下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外者非薑汁竹瀝不可達

痰在膈間使人顛狂健忘宜用竹瀝風痰亦服竹瀝又能養血痰在四肢非竹瀝不開

痰結核在咽喉燥不能出入化痰藥加軟堅鹹藥

杏仁　海石　桔梗　連翹　瓜蔞仁

少佐朴硝以薑汁蜜調丸噙化之

海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥

黃芩治熱痰假以降其熱也

竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡也

枳實瀉痰能衝牆壁　五倍子能治老痰

小胃丹　治膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛然能損胃氣食積痰實者用之不宜多

青礞石丸去濕痰重在風化硝

潤下丸降痰最妙

陳皮半斤去白以水化鹽半兩拌陳皮令得所煮候乾炒燥一方不去白　甘草一兩炙

右為末蒸餅丸菉豆大每服三十五丸溫水下

油炒半夏大治濕痰又治喘止心痛粥丸薑湯下

三十九

痰方

黃芩[illegible]　香附　半夏薑製　貝母已上治濕痰加瓜蔞仁　青黛　作丸子治熱痰

中和丸治濕痰氣熱

蒼朮 黄芩 香附 半夏各等分為末粥丸

燥濕痰方亦治白濁因痰者

南星一兩 半夏一兩 蛤粉二兩 青黛為衣

右為末神麯糊丸

痰嗽方

黄芩一兩半酒浸洗 滑石半兩 貝母一兩

南星一兩 風化硝二錢半 白芥子半兩去殼

右為末湯浸蒸餅為丸

導痰湯

半夏四兩 南星 橘皮 枳殼 赤茯苓一兩

甘草半兩

用生薑煎服之

千緡湯

半夏七枚炮製四片破之 皂角一寸二分去皮炙 甘草炙一寸

生薑如指大

煎服之治喘

治痰方

南星 半夏 滑石 輕粉各三錢 巴豆三十粒

右用皂角仁浸濃汁丸如梧桐子大每服五十丸

黄連化痰丸

黄連一兩 陳皮五錢 吳茱萸酒浸一錢

半夏一兩五錢

右為末入桃仁二十四箇研如泥和勻神麯糊丸如菉豆大每服百丸薑湯送下

消痰方

益元散七錢 吳茱萸三錢

治鬱痰方

白殭蚕 杏仁 瓜蔞 訶子 貝母

喘

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃虛喘者抬肩擷肚喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大概胃中有實火膈上有稠痰得食咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也昔葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安矣

凡久喘未發以扶正氣為要已發以攻邪為主

有氣虛短氣而喘　有痰亦短氣而喘
有陰虛自小腹下火起而上者
喘急有風痰者婦人大全方千緡湯
陰虛有痰喘急者補陰降火四物湯加枳殼半夏
氣虛者人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類
大概喘急之病甚不可用苦藥涼藥火氣盛故也
可用導痰湯加千緡湯治之
諸喘不止者用劫藥一二貼則止之劫藥之後因
痰治痰因火治火椒目碾極細末用一二錢以
生薑湯調下止之

又法用蘿蔔子蒸熟為君皂角燒灰等分為末以
生薑汁煉蜜為丸小桐子大每服五七十丸噙
化下之効

哮
專主於痰宜吐法
治哮必用薄滋味不可純用涼藥必帶表散
治哮方　用雞子略敲殼損膜不損浸於尿缸內
三四日夜取出煮熟食之効蓋雞子能去風痰

痢　身熱　後重　腹痛　下血
戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱
治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

身熱挾外感
不惡寒小柴胡湯去人參
惡寒發熱為表證宜微汗和解
蒼朮　川芎　陳皮　芍藥　甘草生薑煎服
後重積與氣鬱墜下兼升兼消
或氣行血和積少但虛坐努力此為亡血倍用歸
身尾却以生芍藥生地黃桃仁佐之復以陳皮
和之
或下痢而大孔痛者此因熱流於下也用木香檳
榔黃芩黃連炒乾薑

或纏退減十之七八積已盡糟粕未實當炒芍藥
炒白朮炙甘草陳皮茯苓湯下固腸丸三十粒
然固腸丸性燥有去濕實腸之功恐滯氣未盡
者不可遽用此藥只宜單服此湯可也
或痢後糟粕未實或食稍多或饑甚方食腹中作
痛者切勿驚恐以白朮陳皮各半盞煎服和之
則安
或久痢後體虛氣弱滑瀉不止又當以訶子肉豆
蔻白礬半夏之類擇用以澁之甚則加牡蠣然
須以陳皮為佐若大澁亦能作痛又甚者灸天

樞氣海

古方用厚朴爲瀉凝滯之氣然朴太温而散氣久服大能虛人滯氣稍行卽去之餘滯未盡以炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴少緩比陳皮亦重滯退一半當去之只用陳皮以和諸藥陳皮去白有補瀉之兼才若爲參朮之佐亦能補也

凡痢疾腹痛必以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲佐惡寒痛者加桂惡熱痛者加黃栢達者更能參以歲氣時令用藥則萬擧萬全豈在乎執方哉

諸不治證

下痢純血者必死　下痢如塵腐色者死

下痢如屋漏者死　下痢如竹筒注者不可治

下痢如魚腦者半生半死

噤口痢　胃口熱甚故也

黃連多加人參煮湯終日呷之如吐了再喫開以降之人不知此多用温藥甘味此以火濟火以滯益滯哀哉

一方臍中用田螺盦之以引下其熱

亦有誤服熱藥澁藥之毒犯胃者當明審以袪其毒　痢方亦作丸

大黃　黃連　黃芩　黃栢　枳殼　當歸

白芍藥　滑石　甘草　桃仁　白朮各等分

右爲末神麴糊丸

孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓　滑石

右煎下保和丸

小兒八歲下痢純血以食積治

蒼朮　白朮　黃芩　白芍　滑石　茯苓

甘草　陳皮　炒麴　右煎下保和丸

又下痢法熱不止者屬陰虛用寒凉藥兼升藥熱

泄瀉　濕　氣虛　火　痰　食積

戴云凡瀉水腹不痛者是濕也飲食入胃不住或完穀不化者是氣虛也腹痛瀉水腹鳴痛一陣瀉一陣是火也或瀉時或不瀉或多或少是痰也腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積也

濕燥濕兼滲泄之四苓散加蒼朮白朮甚者二朮炒

氣虛人參白朮芍藥炒升麻

火宜伐火利小水黃芩木通入四苓散

痰積宜豁之海石青黛黃芩神麴蛤粉或用吐法

瀉[illegible]頭條之神麯大黃

已上諸藥皆作丸子服之

凡泄瀉水多者仍用五苓散治之

一世俗類用澁藥治痢與瀉若積久而虛者或可行之而初得之者恐必變他疾為禍不小矣殊不知多因於濕惟分利小水最為上策

止瀉方

肉豆蔻 五錢　滑石 春冬一兩二錢半 夏二兩半秋二兩

又方薑麯丸

陳麯 六兩炒　陳麥 亦可　茴香 五錢　生薑 一兩

右炒白朮炒麯炒芍藥或丸或散或湯作丸妙

脾泄

治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄之疾

白朮 二兩炒　白芍藥 一兩酒拌炒　神麯 一兩半炒

山查 一兩半炒　半夏 一兩洗　黃芩 五錢炒

右為末荷葉包飯燒為丸

治一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡水膿後腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮最少

下保和丸二十五丸第二日前證俱減獨小便不利以益元散服之

霍亂

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩傍邊此乃千金妙法也

內有所積外有所感陽不升陰不降乖隔而成矣

切勿以米湯啜之立死　脉多伏為絕

見成吐瀉還用吐提其氣起

大法生薑理中湯最好　有可吐者　有可下者

吐用二陳湯加減亦可　或梓樹木煎湯吐亦可

乾霍亂

此病最難治死在須臾升降不通故也

此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐法者則兼發散之義也

吐提其氣極是良法　世多用鹽湯

有用溫藥解散者　其法解散不用凉藥

一二陳湯加和解散　川芎防風蒼朮白芷

嘔吐

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦

有痰膈中焦食不得下者　有氣逆者

有寒氣鬱於胃口者　胃中有痰有熱者

然胃中有火與痰而致嘔吐者多矣

朱奉議以半夏生薑橘皮爲主

孫真人誤以噦爲咳逆

劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳

胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生薑

久病嘔者胃虛不納穀也以生薑人參黃芪白朮

香附

惡心　有熱　有痰　有虛

戴云惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心非心經之病其病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也　皆用生薑隨證用藥

翻胃　即膈噎　膈噎乃翻胃之漸　發揮備言

戴云翻胃有四血虛氣虛有熱有痰血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物爲主氣虛者四君子湯爲主熱以解毒爲主痰以二陳爲主

大約有四　血虛　氣虛　有熱　有痰兼病

必用童便竹瀝薑汁牛羊乳

糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

痰用二陳湯爲主寸關脉沉或伏而大

有氣滯結者通氣之藥皆可用也寸關脉沉而澀

氣虛四君子湯爲主血虛四物湯爲主左手脉無力大不可用香燥之藥服之必死宜薄滋味

馬剝兒燒灰存性一錢重好棗肉平胃散二錢溫酒調服食即可下然後隨病源調理神効

陳皮一斤三兩　厚朴三斤二兩　甘草二十兩　蒼朮五斤

傷食

戴云惡食者胸中有物導痰補脾

二陳湯加　白朮　山查　川芎　蒼朮

痞　食積兼濕　東垣有法有方

又痞滿方

吳茱萸三兩　黃連八兩　粥爲丸

軟石膏碾末醋丸如菉豆大瀉胃火食積痰

噯氣　胃中有火有痰

南星　半夏　軟石膏　莎草根　或湯或丸

吞酸

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器濕熱則易酸也必用茱萸順其性而折之反佐茱萸黃連

嘈雜　只是痰因火動

戴云此則俗謂之心嘈也

梔子薑炒黃連不可無　梔子黃芩爲君

南星　半夏　橘皮　熱多加青黛

肥人嘈雜二陳湯加撫芎用蒼朮白朮炒梔子

五疸

不用分五同是濕熱如盦麴相似

戴云五疸者遍身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量其虛實下其食積其餘但利小便爲先小便利白則黃自退

輕者小溫中丸　重者大溫中丸

熱多者加黃連　濕多者茵蔯五苓散加食積藥

消渴泄瀉

先用白朮白芍藥炒爲末調服後却服消渴藥

消渴　養肺　降火　生血爲主　分上中下治

黃連末　天花粉末　人乳　生藕汁

生地黃汁

右二物汁爲膏入上藥攪和佐以薑汁和蜜湯爲膏徐徐留於舌上以白湯少許送下

能食加軟石膏　瓜蔞根治消渴神藥

水腫

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣實者可下

此因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾氣得實則自能健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下

二陳湯加白朮人參爲主佐以蒼朮炒梔子黃芩

麥門冬制肝木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通

氣若陷下升麻柴胡提之隨證加減必須補中

產後必用大補氣血爲主少佐以蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾壅滿用半夏陳皮香附監之

有熱當清肺麥門冬黃芩之屬

一方用山梔子去皮取仁炒搥碎米飲送下若胃脘熱病在上者帶皮用

鼓脹　又名單鼓　其詳在格致論中

大補中氣行濕此乃脾虛之證須必遠音樂斷厚味以大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類

有血虛 當以四物湯行血

脉實與人壯盛者或可用攻藥便用收拾白朮爲主厚朴治腹脹因味辛以散其氣在中焦故也

自汗 屬氣虛 濕熱 陽虛

東垣有法有方

人參 黃芪 少佐桂枝

陽虛附子亦可用

撲法

牡蠣 麩皮 藁本 糯米 防風 白芷

麻黃根 爲末週身撲之

大氣上蒸胃中之濕亦能作汗凉膈散主之

痰證亦有汗者

盜汗 血虛 陰虛

戴云盜汗者睡則汗自出覺則無矣非若自汗而自出也 小兒不須治

東垣有法有方當歸六黃湯

盜汗方

白朮四兩一兩同黃芪炒一兩同石斛炒一兩同牡蠣炒一兩用麩皮同炒

微黃色餘藥不用只用白朮

右爲細末每服三錢用粟米湯調下盡四兩効

吃逆 有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

不足者人參白朮湯下大補丸

有餘并痰者吐之人參蘆之屬

頭風 有痰者多

左屬風 荊芥 薄荷

屬血虛 川芎 當歸 芍藥

右屬痰 蒼朮 半夏 屬熱 黃芩

搐藥有用蓽撥猪膽

頭痛 多主於痰

痛甚者火多 亦有可吐者 亦有可下者

清空膏治諸般頭痛除血虛頭痛不治

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯

古方有追涎藥 出東垣試効

羌活 防風 黃連各炒一兩 柴胡七錢 川芎二錢

甘草炙一兩半 黃芩三兩刮去黃色剉一半酒洗一半炒

右爲末每服二錢七熬盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用湯送下臨臥服之

頭眩

痰挾氣虛火治痰爲主　挾補氣藥并降火藥

屬痰　無痰則不能作眩

屬火　痰因火動　又有濕痰者　有火多者

左手脉數熱多　脉濇有死血

右手脉實痰積　脉大必是久病

頭暈　火動其痰

二陳湯加黄芩蒼朮羌活散風行濕　或用防風行濕之劑可也

昔有一老婦患赤白帶一年半是頭眩坐立不久睡之則安　專用治赤白帶除之其眩自安矣

眉稜痛

風熱痰　作風痰治類痛風

白朮酒黄芩末茶調服

又方川烏頭草烏二味爲君童便浸洗炒去毒細辛黄芩羌活甘草佐之

耳聾

少陽厥陰熱多　皆屬於熱耳鳴者是

戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

蓖麻子四十九粒　棗肉十箇

右入人乳搗成膏子石頭上晷晒乾便丸如桐子大以綿裹塞於耳中

又方用鼠膽入耳中尤好　仍開痰散風熱

大病後須用四物湯降火

有陰虛火動耳聾者亦如上法

丹溪先生金匱鈎玄卷第二

門人戴元禮錄　明新安吳勉學校正

心痛　即胃脘痛

心痛雖日數多不喫飲食不死若痛方止便喫還痛必須三五服藥後方可喫物

大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物而病於初得之時當以溫散或溫利之藥若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱則久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散寧無助火添病耶由是古方中多以山梔爲熱藥之向導則邪伏而病易退正易復而病易安雖然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時必難治之也

山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生薑汁令辣再煎小沸服或入芎一錢尤妙山梔大者用七箇或九箇大槩胃口有熱而作痛非山梔子不可佐以薑汁或半夏橘紅各五黃芩三甘草一

用二陳湯加蒼芎倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石鹼川芎蒼朮梔子必炒去皮用作丸服之

凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因平日喜食熱物以致血流於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥中兼用之

以物拄按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾薑和之有蟲痛者面上白斑唇紅能食屬蟲治以苦楝根錫灰之類脈堅實不大便者下之

痛甚者脈必伏多用溫藥不用參朮可用附子

諸痛不可用補氣藥

客寒犯胃草豆蔻丸用之熱亦可用止用一二服

草豆蔻一錢四分裹燒熟去皮　吳茱萸湯泡洗焙乾

益智仁　白僵蠶　橘皮　人參　黃芪已上各八分

生甘草　歸身　炙甘草　桂皮各六分

麴末　薑黃各四分　桃仁七箇去皮　半夏洗一錢

麥蘖一錢半炒黃　澤瀉一錢小便多減半用之

柴胡四分詳膈下痛多爲用之

右一十八味除桃仁另研如泥外餘極細末同桃仁研勻用湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服三十丸食遠用熱白湯送下旋斟酌多少用之

又方用黃荊子炒焦爲末米飲調服亦治白帶

又方脚痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生
薑煎辣湯調服為佳
又方單用牡蠣粉酒調下一二錢氣實不可用

腰疼　濕熱　腎虛　瘀血

濕熱腰疼者遇天陰或坐久而發者是腎虛者疼
之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

脉大者腎虛用杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之
類用猪脊髓丸

脉澁者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花

濕熱者用蒼朮杜仲黃柏川芎

痰者用南星

凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用温散之藥
諸痛不可用人參蓋人參補氣氣旺不通而痛愈
甚矣

臍下忽大痛者人中加黑色者多死難治也

人面上忽有紅點者多死

脇痛

肝火盛　木氣實　有死血　肝急　有痰流注

木氣實　川芎　蒼朮　青皮　當歸

龍會丸瀉火要藥

死血　桃仁　紅花　川芎

痰流注　二陳湯加　南星　蒼朮　川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮血病入血藥中
行血脇痛甚者用薑汁下龍會丸肝火盛故也

咳嗽脇痛二陳湯加南星多香附青皮青黛薑汁

腹痛　有寒　積熱　死血　食積　濕痰

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者
是熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積
者甚欲大便利後痛減者是濕痰者凡痛必小便
不利

脉弦強者食　脉滑者痰

滑痰多作腹痛用苔芎蒼朮香附白芷生薑汁入
湯服腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加黃
芩黃連梔子

凡心腹痛必用温散此是鬱結不散阻氣不運故
病在下者多屬食宜温散之

一老人腹痛年高不禁下者用
川芎　蒼朮　香附　白芷　乾薑　茯苓
滑石

痛風

四肢百節走痛　風熱　風濕　血虛　有痰

大法主方

蒼朮　南星　川芎　白芷　當歸　酒黃芩

在上者加羗活　桂枝　桔梗　威靈仙

在下者加牛膝　防巳　木通　黃柏

血虛者多用川芎　當歸　佐以桃仁　紅花

薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂領南星蒼朮等治之

上中下痛風方

威靈三錢　南星二兩　蒼芎一兩

桃仁五錢　白芷五錢　桂枝二錢　防巳半錢

蒼朮二兩　黃柏二兩酒浸炒　紅花一錢半　羗活三錢

神麴一兩炒　草龍膽五分

張子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參一兩　白朮一兩　黃柏二兩炒黑色

山藥一兩　海石一兩　瑣陽五錢　乾薑五錢燒灰

南星一兩　敗龜板二兩酒炙　熟地黃二兩　粥爲丸

治臂痛

半夏一錢　陳皮五分　伏苓五分　蒼朮一錢半

酒芩一錢　威靈仙八分　白朮一錢　甘草炒少許

南星一錢　香附一錢

勞瘵　其主在乎陰虛　痰與血病

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減二斗去蒿熬至一斗入猪膽汁七箇再熬數沸甘草末收之

虛勞身瘦屬火因火燒爍

勞病四物湯加人尿薑汁

咳血　痰盛　身熱多是血虛

戴云咳血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每咯出血皆是血疙瘩衄血者鼻中

出血也溺血小便出血也下血者大便出血也雖有名色分六俱是熱證但有虛實新舊之不同或妄言爲寒者誤也

青黛　訶子　山梔　海石　瓜蔞仁

右爲末薑汁蜜調噙化嗽甚者加杏仁後以八物湯加減調理

身熱多是血虛四物湯加減

嘔血　火載血上錯經妄行

脈大發熱喉中痛者是氣虛用人參黃芪蜜炙黃栢荊芥并當歸生地黃用之

嘔血用韭汁童便薑汁磨鬱金同飲之其血自清
大抵血上錯經妄行四物湯加炒梔子童便薑汁
山茶花童便薑汁酒調
鬱金末治吐血入薑汁童便
痰帶血絲出者童便薑汁竹瀝
又方用韭汁童便二物相合用鬱金細研入在二
物之內同飲其血自消
又方治衂血以鬱金如無鬱金以茶薑汁童便和
好酒調服即止之

咯血

薑汁童便青黛入血藥中用之加四物湯地黄膏
牛膝膏之類

衂血

凉血行血爲主　犀角地黄湯入鬱金同用
經血逆行或血腥或唾血吐血用韭葉汁立効

溺血　屬熱

山梔子炒水煎服　或用小薊琥珀
有血虛者四物湯加牛膝膏

下血

不可純用寒凉藥必於寒凉藥中用辛味并溫如
酒浸炒凉藥酒煮黄連之類
有熱四物湯加炒梔子升麻秦艽阿膠珠
下血屬虛當歸散四物湯加炮乾薑升麻
又方用白芷五倍子丸
凡用血藥不可單行單止
有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝生血故也有
濕傷血宜行濕消熱可也
內經謂身熱即死寒則生此亦是大概言之必兼
證詳之則可今豈無身熱生寒而死者
脉沉小流連或微者易治
脉浮大洪數者難治宜滑不宜弦

仲景治痢可温者五法可清者十法或解表或利
小便或待其自已區分易治難治極密但與瀉
同立法不分學者當辨之
大孔痛一曰温之一曰清之
久病身冷自汗脉沉小者宜温
暴病身熱脉浮洪者宜清
有可吐者　有可下者　有可汗者
初得時原氣未虛必推蕩之此通用之法稍久氣
虛則不可

先水泄後膿血此脾傳腎賊邪難愈
先膿血後水泄此腎傳脾微邪易愈
如豆汁者濕也蓋脾胃爲水穀之海無物不受常兼四臟故如五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之
因熱而作不可用巴豆等藥如傷冷物者或可用亦宜謹之
又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似却宜明運氣之勝復以治之

腸風 獨在胃與大腸出
黃芩 秦艽 槐角 升麻 青黛

夢遺 專主熱 脫精
戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者謂之精滑皆相火所動久則有虛而無寒者也
帶下與夢遺同法治
青黛 海石 黃柏 即樗樹根丸
内傷氣血不能固守常補以八物湯加減吞樗樹根丸思想成病其病在心安神帶補熱則流通
知母 黃柏 蛤粉

精滑 專主濕熱
戴云滑者小便精滑下也俱是膀胱濕熱雖有赤白之異終無寒熱之別河間云天氣熱則水渾濁寒則澄澈清冷由此觀之濁之爲病濕熱明矣
黃柏 知母 牡蠣 蛤粉
又方
良薑三錢 芍藥二錢 黃柏二錢燒灰存
樗樹皮白皮一兩
右爲末糊爲丸每服三十丸

濁
濕熱 有痰 有虛 赤濁屬血 白濁屬氣
寒則堅凝 熱則流通
大率皆是濕熱流注宜燥中宮之濕用二陳湯加蒼术白术燥去濕赤者乃是濕傷血加白芍藥仍用珍珠粉丸加樗樹根皮滑石青黛等作丸
虛勞者用補陰藥大槩不利熱藥
肥白人必多痰以二陳湯去其熱胃弱者兼用人參以柴胡升麻升胃中之氣丸藥用
青黛 黃柏炒褐色 乾薑炒微黑色
海石 蛤粉

胃中濁氣下流爲赤白濁者用柴胡升麻蒼术白
术二陳湯丸藥用樗末蛤粉炒乾薑炒黄柏
專主胃中之濁氣下流滲入膀胱用青黛蛤粉。
肝脉弦者用青黛以瀉肝

又方

黄柏一兩炒　生柏二錢半一兩　海石二兩
神麯五錢　爲末水丸

有熱者　黄柏　滑石　青黛之類
燥濕痰　南星　半夏　蛤粉
右神麯爲丸青黛爲衣或用海石代麯

張子元氣血兩虚有痰痛風時作陰火間起小便
白濁或帶下赤白方在前痛風中

一人便濁常有半年或時夢遺形瘦作心虚主治
珍珠粉丸和匀定志丸服

一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦
不清濁氣流入膀胱下注白濁白濁即是濕痰
也

戴云斷用二陳湯去痰加升麻柴胡升胃中之清
氣加蒼术去濕白术補中全在活法服四貼後濁
減大半覺胸滿因柴胡升麻升動其氣痰阻滿閉
用二陳湯加炒麯白术素無痰者升動胃氣不滿

丸藥方

青黛　椿皮　蛤粉　滑石
乾薑炒　黄柏炒
右爲末炒神麯糊丸仍用前燥濕痰丸亦能治
帶

又方

滑石利竅　黄柏治濕熱
青黛解鬱結　蛤粉鹹寒入腎
炒乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生乾薑監制
之

淋

皆屬於痰熱

淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也
解熱利小便山梔子之類用苦　甘草煎服諸藥
中皆加牛膝

老人亦有氣虚者人參白术中帶木通山梔

亦有死血作淋者以牛膝作膏此證亦能損胃不
食

小便不通

小便不通姜木芥茂地骑拌吃要吉人參足八味兄長手方致蓮可出救人

氣虛　血虛　痰　風閉　實熱

吐之以提其氣氣升則水自下之蓋氣承載其水也

氣虛用人參黃芪升麻等先服後吐或參芪藥中探吐

血虛四物湯先服後吐芎歸湯吐亦可痰多二陳湯先服後吐皆用探吐

痰氣閉塞二陳湯加木香香附探吐實熱利之

一婦人肥痰後患大小便不通此是痰隔中焦氣滯於下焦二陳湯加木通初喫後煙再煎服吐之

關格

戴云關格者謂膈中覺有所礙欲升不升欲降不降欲食不食此為氣之橫格也

必用吐提其氣之橫格不必在出痰也

有痰以二陳湯吐之吐中便有降有中氣虛不運者補氣藥中升降

小便不禁

屬熱　屬虛

戴云小便不禁出而不覺赤者有熱白者為氣虛也熱者五苓散加解毒散虛者五苓散加四物湯

癇

驚　痰　宜吐

戴云癲者俗曰猪癲風者是也

大率行痰為主

黃連　南星　瓜蔞　半夏

尋痰尋火分多少治無不愈

分痰分熱有熱者以涼藥清其心

有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸

此證必用吐吐後用平肝之藥青黛柴胡川芎之類

健忘

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非比生成之愚頑不知世事者

精神短少者多　亦有痰者

怔忡

大段屬血虛

有慮便動屬虛　時作時止痰因火動

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

瘦人多是血少　肥人屬痰尋常者多是痰

自覺心跳者是血少用四物安神之類

驚悸

血虛　用硃砂安神丸

痓

大率與癇病相似

多是血病有火兼痰人參竹瀝之類不用煎服藥

血塊 一名積瘕

塊在中為痰飲　在右為食積　在左為血積

氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血

此塊晚蠶醋煮海石三稜莪朮桃仁紅花五靈

脂香附之類

白朮湯吞下瓦壟子能消血塊次消痰

治塊當降火消食積食積即痰也

行死血塊塊去須大補石鹼一物有痰積有血塊可

用洗滌垢膩又消食積

吐蟲　以黑錫炒成灰檳榔末米飲調下

癥瘕

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或

有或無或上或下或左或右者是瘕

用蜀葵根煎湯煎人參白朮陳皮青皮甘草梢牛

膝成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲一服

可見塊下

病重者補接之後加減再行

消塊丸即千金大硝石丸止可磨塊不令人困須

量虛實而用可也

硝石六兩　大黃八兩　人參　甘草各三兩

右為末以三年苦酒三斗置銅器中以竹片作

準每入一升作一刻柱器中熬先納大黃不住

手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火

熬使可丸則取丸如鷄子中黃大每服一丸米

飲下如不能大丸則作小丸如梧子大每服三

十丸後下如鷄肝如米泔赤黑等色下後忌風

冷淡軟粥將理

又三聖膏

未化石灰半斤為末瓦器中炒令淡紅色提出火外候熱少減次下大黃末

大黃一兩為末就爐外炒伺熱減入下桂心末

桂心半兩為末略炒入米醋熬

成膏厚薄攤貼患處

貼積聚塊

大黃　朴硝各一兩

右為末用大蒜搗膏和勻貼之

痞塊在皮裏膜外須用補氣香附開之兼二陳湯

加補氣藥先須斷厚味

茶癖　石膏　黃芩　升麻

右為末砂糖水調服

癭氣　先須斷厚味

海藻一兩　黃藥二兩

右爲末以少許置於掌中時時舐之津嚥下如消三分之二須止後藥服

食積一方乃在婦人門食積條下

疝

濕熱痰積流下作痛大槩因寒鬱而作也即是痰飲食積并死血

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

子和云疝本肝經宜通勿塞只此見治之法要且肝經與腎絕無干不宜下癩濕多疝氣灸大敦穴

食積與瘀血成痛者

梔子　桃仁　山查　枳實　吳茱萸

右爲末生薑汁順流水作湯調服

按之不定必用桂枝屬虛

桂枝　山梔炒　烏頭細切炒

右爲末薑汁爲丸每服三十丸勞蒸

治疝方定痛速效　濕勝者加荔枝

枳殼十五箇　山梔　棠毬炒　茱萸炒

又方[illegible]治癩要藥不疼者

蒼朮　南星　白芷　山查　川芎　半夏

枳實　爲末神麴作丸

治陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腹連毛際結核悶痛不可忍

山梔炒　枳殼炒　桃仁炒　山查等分

右研細砂鉢內入生薑汁用水一盞煎令沸熱服之

治諸疝發時用海石香附二味爲末以生薑汁湯調服亦能治心痛

治疝方

梔子　桃仁　橘核　茱萸　川烏

右碾煎服劫藥用烏頭細切炒梔子橘核散單止痛

脚氣

蒼朮鹽炒　白朮　防己　檳榔　川芎

犀角　甘草　木通　黃連

生地黃酒炒　黃柏　有熱加黃芩　黃連

有熱加竹瀝薑汁

大熱及時令熱加石膏大便實加桃仁小便澁加

牛膝

有食積流注

蒼朮 黃柏 防已 南星 川芎 白芷

犀角 檳榔 血虛加牛膝龜板

如常腫者專主乎濕熱朱先生有方肥人加痰

戴云有脚氣衝心宜四物加炒柏再宜湧泉穴用

附子津拌貼以艾灸泄引其熱

健步丸

歸尾 芍藥 陳皮 蒼朮各一兩 生地黃一兩半

大腹子三兩 牛膝 茱萸各半兩 黃芩半兩

桂枝二錢

右為末蒸餅為丸每服百丸白木通草煎湯食前下

一婦人足腫

黃柏 蒼朮 南星 紅花酒洗 草龍膽

川芎 牛膝酒洗 生地黃

筋動於足大指動上來至大腿近腰結 奉養厚

因風寒作四物湯加酒芩紅花蒼朮南星

筋轉皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花

人病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生則陰生故也不可用附子可用參多服

痿

斷不可作風治而用風藥

濕熱 痰 無血而虛 氣弱 瘀血

濕熱東垣健步方中加燥濕降陰火藥芩柏蒼朮之類

濕痰二陳湯中加蒼朮黃芩黃柏白朮之類入竹瀝

氣虛四君子湯加蒼朮黃芩黃柏之類

血虛四物湯中蒼朮黃柏下補陰丸

亦有食積妨碍不得降者 亦有死血者

健步丸方

羌活 柴胡 滑石 甘草炙 天花粉酒製各半兩

防已 防風 澤瀉各三錢 肉桂半錢

川烏 苦參酒製各一錢

右為末酒糊丸如桐子大每服七十丸煎愈風湯以空心下

發熱 陰虛難治

戴云凡脉數而無力者便是陰虛也

陰虛發熱用四物湯加黃柏兼氣虛加參芪白朮

并用四物湯加黃柏知母降火補陰之妙藥
又云陰虛發熱用四物湯甚者加龜板炒黃柏
嗜酒人發熱者難治
不飲酒之人若因酒而發熱者亦難治
一男子年三十歲因酒發熱用青黛瓜蔞仁薑汁
每日以數匙入口中三日而愈

陽虛惡寒
戴云凡背惡寒甚者脉浮大而無力者是陽虛也
用人參黃芪之類甚者加附子少許以行參芪之
氣

一女子惡寒用苦參一錢赤小豆一錢為末齏水
吐用川芎蒼木南星黃芩酒麴丸

手心熱
梔子 香附 蒼术 白芷 川芎
半夏生用 為末麯糊丸

手麻
此是氣虛也

手木
東垣云麻木氣不行也補肺中之氣是濕痰死
血 十指麻是胃中有濕痰死血

厥 因痰 用白术 竹瀝
厥者手足冷也熱厥逆也非寒證因氣虛血虛
熱承氣湯外感解散加薑汁酒

面寒面熱
火起 寒鬱熱 面寒 退胃熱

喉痺
大槩多是痰熱也只以桐油吐之 或用射干逆
流水吐
又方用李實根皮一片噙口內更用李實根碾水
傅項上一遭立効新採園中者

纏喉風
戴云屬痰熱纏喉風者謂其咽喉裏外皆腫者是
也用桐油以鵝翎探吐 又法用燈油脚探吐之
又方用遠志去心水調傅項上一遭立効

喉咽生瘡并痛
多屬虛血熱游行無制客於咽喉人參蜜炙黃柏
荊芥
虛 人參 竹瀝 無實火
熱 黃連 荊芥 薄荷 硝石
右為細末用蜜薑汁調噙

血虛　四物湯中加竹瀝

口瘡

服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上無制用理中湯甚者加附子　或噙官桂亦可

又方用西瓜漿水口痛甚者以此徐徐飲之冬月紫榴皮燒灰噙之

酒皶鼻　血熱入肺

四物湯加陳皮紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就炒五靈脂末服效　又用桐油入黃連以大男藤燒出熱傳之

肺癰

已破入風者不治　搜風湯吐之 出醫壘元戎

收斂瘡口止有合歡樹皮白斂煎湯飲之

肺痿

專主養肺養血養氣清金

天疱瘡

通聖散及蚯蚓泥略炒蜜調傅之效

從肚皮上起者裏熱發外還服通聖散可也

漏瘡

須先服補藥以生氣血即參朮歸芎為主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大漏小艾炷亦小但灸令微熱不可令痛乾則易之乾研為末再和再灸如困則止來日如前法再灸直至肉平為效亦有用附片灸仍前氣血藥作膏藥貼之

痔漏

用五倍子朴硝桑寄生蓮房煎湯先熏後洗腫者用木鱉子五倍子研細末調傅

漏專以凉藥為主

痔漏方

人參　黃芪　當歸　川芎　升麻　枳殼

條芩　槐角

腸癰

作濕熱食積治　入風難治

治漏外塞藥　蘆甘石小便煅　牡蠣粉

結核

或在頸在項在身在臂如腫毒者多痰注作核不散治耳後頂門各一塊

僵蠶炒　青黛　膽星　酒大黃

右為末蜜丸噙化之

頸頰下生痰核

二陳湯加炒大黄　連翹　桔梗　柴胡

治臂核作痛

連翹　防風　川芎　酒芩　蒼朮　皂角刺

治環跳穴痛不已防生附骨癰方

以蒼朮佐黄柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子黄芩體虚者加土牛膝以生甘草為使大料煎入生薑汁帶辣食前飲之病甚者加黄柏桂枝十數貼發不動少加大黄一兩貼又不動者恐癰將成矣急掘地成坑以火煅紅沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下體伏熱氣薰蒸腠理開血氣暢而愈

脫肛

氣熱　氣虚

氣虚補氣用人參　當歸　黄芪　川芎

升麻

血虚者四物湯

血熱者涼血四物湯加黄柏炒

丹溪先生金匱鉤玄卷之一

丹溪先生金匱鉤玄卷之三

明　新安吳勉學校正

婦人科

經水經候過期而作疼者乃虚中有熱所以作疼

經水不及期血熱也四物湯加黄連

經候將來而作疼者血實也

桃仁　香附　黄連

過期乃血少也

川芎　當歸　帶人參白朮與痰藥

過期紫黑色有塊血熱也必作痛

四物湯加　黄連　香附

淡色過期者乃痰多也

二陳湯加　川芎　當歸

紫色成塊者乃是熱也四物湯加黄連之類

痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如此

南星　蒼朮　香附　川芎　作丸服

肥人不及日數而多者痰多血虚有熱前方加黄連白朮若血枯經閉者四物湯加桃仁紅花

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芎連不可服地黄泥

陷陽也如用以生[illegible]汁炒

血崩

崩之為病乃血之大下豈可為寒但血去後其人
必虛當大補氣血
東垣有治法但不言熱其主於寒學者宜再思之
急則治其標白芷湯調百草霜
甚者棕櫚灰後用四物湯加乾薑調理
因勞者用參芪帶升補藥
因寒者加乾薑　因熱者加黃芩參芪
崩過多者先服五靈脂末一服當分寒熱五靈脂

能行能止婦人血崩用白芷香附為丸
白帶用椒目末又用白芷末
一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服
之
又方用五靈脂半生半熟為末以酒調服
氣虛血虛者皆於四物湯加人參黃芪
漏下乃熱而虛者四物湯加黃連

帶下赤白　赤屬血　白屬氣　主治燥濕為先
帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱宜升無人知
此肥人多是濕痰
海石　半夏　南星　蒼朮　川芎　椿皮
黃柏
瘦人帶病少如有帶者是熱也
黃柏　滑石　川芎　椿皮　海石
甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼朮白
朮仍用丸子　一本作瓦壟子
又云赤白帶皆屬於熱出於大腸小腸之分
一方黃荊子炒焦為末米飲湯下治白帶亦治心
痛
羅先生治法或十棗湯或神祐丸或玉燭散皆可

用不可峻攻實者可用此法虛則不宜
血虛者加減四物湯
氣虛者以參朮陳皮間與之
濕甚者用固腸丸
相火動者於諸藥中加少炒柏
滑者加龍骨赤石脂
滯者加葵花性燥者加黃連
寒月少入薑附臨機應變必須斷厚味
良薑　芍藥　黃柏 燒灰 各二錢　入椿樹皮末一兩半
右為末粥為丸每服三四十丸

痰氣帶下者

蒼术 香附 滑石 蛤粉 半夏 茯苓

婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星 蒼术 黃柏炒焦 滑石 半夏

川芎 辛夷 牡蠣粉炒 茯苓

白帶兼痛風

半夏 茯苓 川芎 陳皮 甘草 蒼术米泔浸

南星 牛膝 黃柏酒浸晒乾炒

子嗣

肥盛婦人不能孕育者以其身中脂膜閉塞子宮

而致經事不能行可用導痰湯之類

瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故

也可用四物湯養血養陰等藥

產前胎動

孕婦人因火動胎逆上作喘者急用條芩香附

之類將條芩更於水中沉取重者用之

固胎

地黃半錢 人參 白芍各一錢 白术一錢半

川芎 歸身尾一錢 陳皮一錢 甘草二錢

糯米一十四粒 黃連 黃柏各小

桑上羊兒藤七葉完者

右㕮咀煎湯服之

血虛不安者用阿膠 痛者縮砂行氣故也

一切病不可表

惡阻 從痰治

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也

肥者有痰瘦者有熱多用二陳湯

或白术爲末水丸隨所好或湯或水下

婦人懷娠愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其肝氣

止能生胎無餘物也

血塊死血食積痰飲成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜

眩暈身熱時作時止

黃連一兩半一半用茱萸炒去茱萸一半益智炒去益智 山梔半兩炒

台芎半兩 香附一兩用便浸 蘿蔔子一兩半炒

山查一兩 三稜 青皮 神麯各半兩

莪术半兩用米醋 桃仁半兩留尖去皮

白芥子一兩半炒 瓦龍子消血塊

爲末作丸子服之

婦人血塊如盤有孕難服峻削

香附四兩醋煮 桃仁一兩去皮尖 海石一兩醋煮 白术一兩

爲末神麴爲丸

束胎

束胎丸第八箇月服

黄芩（酒炒夏用一兩秋用七錢半冬用半兩） 茯苓（七錢半）

陳皮（忌火二兩） 白术（二兩） 粥爲丸

束胎散即達生散

人參（半錢） 陳皮（半錢） 白术 白芍

歸身尾（各一錢） 甘草（炙二錢） 大腹皮（一錢）

紫蘇（半錢）

或加枳殼砂仁作一貼入青葱五葉黄楊木葉稍十箇煎待於八九箇月服十數貼甚得力或夏加黄芩冬不必加春加川芎或有别證以意消息

第九箇月服

黄芩（一兩酒炒宜熱藥不宜涼藥怯弱人減半） 白术（一兩）

枳殼（七錢半炒） 滑石（七錢半臨月十日前小便多時減此一味）

右爲末粥爲丸如梧桐子大每服三十丸空心熱湯下不可多恐損元氣

安胎

白术 黄芩 炒麴 粥爲丸

黄芩安胎乃上中二焦藥能降火下行

縮砂安胎治痛行氣故也

益母草即茺蔚子治產前產後諸病能行血養血

難產作膏 地黄膏 牛膝膏

胎漏 氣虛 血虛 血熱

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下也

子腫 濕多

戴云子腫者謂孕婦手足或頭面通身浮腫者是也用山梔炒一合米飲湯吞下 三因方中有鯉魚湯

難產

難產之由亦是八九箇月内不謹者

氣血虛故亦有氣血凝滯而不能轉運者

催生方

白芷灰 滑石 百草霜

右爲末芎歸湯或薑汁調服之

治胎衣不下

婦人大全方别有治法

產後 血暈 虛火載血漸漸暈來

用鹿角燒灰出火毒研爲極細末以好酒調灌下

即醒行血極快也
又方用韭葉細切盛於有嘴瓶中以熱醋沃之急
封其口以嘴塞産婦鼻中可愈眩暈

産後補虛

人參 白朮 黄芩 陳皮
川芎 甘草炙 有熱加
生薑

必用大補氣血雖有雜證以末治之
當清熱補血氣

消血塊

滑石 沒藥 麒麟竭 無則用
牡丹皮 爲末醋糊作丸
瓦龍子能消血塊

泄

川芎 黄芩 白朮 茯苓 乾薑 滑石
白芍 陳皮 㕮咀煎湯服

惡露不盡

謂産後敗血所去不盡在小腹作痛
五靈脂 香附末 蛤粉 醋丸 甚者入
桃仁

如惡血不下以五靈脂爲末神麴糊丸白朮陳皮
湯下

中風

不可作風治切不可以小續命湯服之必大補氣
血然後治痰當以左右手脉分其氣血多少而
治
口眼喎斜不可服小續命湯

發熱惡寒

大發熱必用乾薑輕用茯苓淡滲其熱一應苦寒
熱發表藥皆不可用也
纔見身熱便不可表發熱惡寒皆是氣血
左手脉不足補血藥多於補氣藥
右手脉不足補氣藥多於補血藥
惡寒發熱腹滿者當去惡血脉滿者不是腹痛者
是
産後不可下白芍以其酸寒伐生發之氣故也
産後一切病皆不可發散

小兒科

小兒食積痰熱傷乳爲病大槩肝與脾病多
小兒肝病多及大人亦然肝只是有餘腎只是不

足

吐瀉黃疸

三稜　莪朮　陳皮　青皮　神麴　麥芽

甘草　白朮　茯苓　黃連　右爲末水調服

傷乳吐瀉者加山查　時氣吐瀉者加滑石　發熱者加薄荷

吐瀉用錢氏五補五瀉之藥俱可用

急慢驚風

發熱　口瘡　手心伏熱　痰熱　痰喘

痰嗽

並用通法重則用瓜蒂散輕則用苦參赤小豆末須酸虀汁調服吐之後用通聖散蜜丸服之

驚有二證一者熱痰主急驚當直瀉之一者脾虛乃爲慢驚所主多死當養脾

東垣云慢驚者先實脾土後散風邪

急者只用降火下痰養血

慢者只用硃砂安神丸更於血藥中求之

黑龍丸

牛膽南星　礞石（各一兩焰硝煅）　天竺黃

青黛（各半兩）　蘆薈（二錢半）　硃砂（二錢）　殭蠶（五分）

蜈蚣（二錢燒存性）

右爲細末煎甘草湯膏丸如雞頭大每服一丸或二丸急驚薄荷湯下慢驚桔梗白朮湯下

神聖牛黃奪命散

檳榔（半兩）　木香（二錢）　大黃（二兩麵裹煨熟）

白牽牛（一兩半生半炒）　黑牽牛（粗末一半生用一半炒用）

右爲一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜漿水調下不拘時候微利爲度

疳病

胡黃連丸

胡黃連（半錢去果）　阿魏（一錢半醋煮）　麝香（四粒）

神麴（炒一錢半）　黃連（二錢半炒去頭）

右爲末豬膽汁丸如黍米大每服二十丸白朮湯下

小兒疳病腹大胡黃連丸二十丸白朮湯下

痘瘡　分氣虛血虛補之

氣虛用人參白朮加解毒藥

但見紅點便忌升麻葛根湯發得表虛也

吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲實

裏實而補則結癰毒

陷伏觸黶灰白爲表虛或叫燒人屎黑陷甚者燒
人屎紅活綻凸爲表實而復用表藥則要潰爛
不結痂二者俱見爲表裏俱虛
痘瘡或初出或未出時人有患者宜預服此藥多
者合少少者合輕方用絲瓜近蒂三寸連瓜子
皮燒灰存性爲末砂糖拌喫入硃砂末亦可

解痘瘡毒藥
絲瓜 升麻 酒芍藥 甘草生用 糖毬
黑豆 犀角 赤小豆

解痘瘡法已出未出皆可用硃砂爲末以蜜水調

服多者可減少者可無

腹脹
蘿蔔子炒 紫蘇梗 陳皮 乾薑各等分
甘草減半 食減者加白朮煎服

夜啼
人參半錢 黃連一錢半薑汁炒 甘草半錢 竹葉二十片
作二服加薑一片煎服之

口糜
戴云滿口生瘡者便是 江茶粉草傅之
又方苦參黃丹五倍子青黛各等分傅之

臍囊腫大
戴云臍囊者陰囊腫大墜下不收上之說
木通 甘草 黃連 當歸 黃芩 煎服
臍囊紫蘇葉爲末水調傅上荷葉裹之

脫肛
戴云脫肛者大腸脫下之說
東北方陳壁上土湯泡先熏後洗亦可用臍囊服
之

木舌
戴云木舌者舌腫硬不和軟也又言重舌者亦是

此類二者蓋是熱病用
百草霜 滑石 芒硝 爲末酒調敷

癮疹 黑斑 紅斑 瘡瘍
用通聖散調服

咯紅
戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血
黑豆 甘草 陳皮 煎服

喫泥 胃熱故也
軟石膏 甘草 黃芩 陳皮 茯苓
白朮 煎服

痢疾　食積

黃芩　黃連　陳皮　甘草　煎服

赤痢加紅花桃仁　白痢加滑石末

食積痢

炒麴　蒼朮　滑石　芍藥　黃芩　白朮

甘草　陳皮　茯苓　右㕮咀煎下保和丸

解顱

乃是母氣虛與熱多耳

戴云卽初生小兒頭上骨未合而開者右以四君子湯四物湯有熱加酒芩炒黃連生甘草煎服外以帛束緊用白蘞末敷之

[illegible]舌

續斷根為君佐以二陳湯煎服

口噤

鬱金　藜蘆　瓜蒂　為末搐鼻

風痰

南星一兩切　白礬半兩入器中水高一指浸晒乾研細末

白附子二兩　用飛白麪為丸如雞頭大每服一丸或二丸薑蜜薄荷湯化下服之

癩頭

用紅炭焠長流水令熱洗之又服酒製通聖散除大黃酒炒外以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為末調敷

又方

松樹厚皮燒灰一兩　白膠香熬沸傾石上二兩

黃丹一兩火飛　白礬半兩火飛　軟石膏一兩

黃連半兩　大黃半兩　輕粉四盝

右極細末熬熟油調敷瘡上須先洗了瘡口敷乃佳

赤瘤

生地黃　木通　荊芥

苦藥帶表之類用芭蕉油塗患處

鼻赤

雄黃　黃丹　同敷

一小兒好喫粽成腹痛

黃連　白酒藥

為末調服乃愈

火豈君相五志俱有論

火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消爍於物莫能禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能不違道於常以禀位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火龍火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移他經事非細故動之極也病則死矣經所以謂一水不勝二火之火出於天造君相之外又有厥陰藏府之火根於五

志之內六欲七情激之其火隨起大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君主自焚則死矣丹溪又啓火出五藏主病曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸痛瘡瘍屬於心火之用也諸氣膹鬱屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也經所謂一水不勝五火之火出自人為又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸氣逆上皆屬於火諸躁擾狂越皆屬於火諸病胕腫疼痠驚駭皆屬於火而河間又廣其說火之致病者甚多矣原內經之意曰喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衊血汙之病皆少陰君火之火乃真心小腸之氣所為也若瞀瘛暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭胕腫痠疼氣逆上衝禁慄如喪神守啑嘔瘡瘍喉哑耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注瞤瘛暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所為也是皆火之見於脈者也謂為脈虛則浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火

也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之如黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為火虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑折

之如大黃朴硝之屬若腎水受傷其陰失守無根之火為虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脱之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土為火鬱之病以升散之劑發之如升麻乾葛柴胡防風之屬不明諸此之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集略其說略備處方之用庶免實實虛虛之禍也

氣屬陽動作火論

捍衛沖和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火當其

和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣曷嘗病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者遽變之為濁行者抑遏而反止表失衛護而不和內失健悍而少降營運漸遠肺失主持妄動不已五志厥陽之火起焉上燔于肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則為火矣河間曰五志過極則為火也何後世不本此議而一槩類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言七氣湯製作其用青皮陳皮三稜蓬朮益智官桂甘草遂以為平和可常用通治七情所傷混同一意未喻其藥以治其氣以下諸氣亦有甚焉者茲不復叙況所居之情各各不同且夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者溫之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之九氣之治各有分別何嘗混作寒治論而類聚香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂歟若香辛燥熱之劑但可劫滯氣衝快於一時以其氣久抑滯借此暫行開發之意藥中無佐使制

伏所起之氣服之甚則增熾鬱火蒸熏氣液而成積自積滋長而成痰一飲下膈氣乃氤氳清虛之象若霧露之着物雖滯易散內挾痰積開而復結服之日久安有虛實而不動氣動而不散者乎此皆人所受誤之由習俗已久相沿而化卒莫能救升發太過香辛散氣燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛不能攝氣歸原遂與蘇子降氣湯四磨湯下黑錫丹養氣丹鎮墜上升之氣且硫黃黑錫佐以香熱又無補養之性藉此果能生氣而補腎乎請熟詳之夫濕痰盛甚者亦或當之初服未顯增變由其氣墜而愈進

形質弱者何以收救不惜哉受火炎子氣亦弱降令不行火無以制相扇而動本勢空虛命絕如縷積而至深丹毒濟火一旦火氣狂散喘息奔急而死所以有形丹石丸藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨而降之乎譬以石投水水固未嘗沉也豈不死歟丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱愈甚自覺無冷非真冷也火熱似水積熱之甚陽亢陰微故有此證認假作真似是之禍可勝言哉內經雖云百病皆生於氣以正氣受邪之不一也今七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發為諸病當詳所起之因滯於何經

有上下部分藏氣之不同隨經用藥有寒熱溫涼之同異若枳殼利肺氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣與夫木香之行中下焦氣香附之快滯氣陳皮之泄氣藿香之馨香上行胃氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣檳榔之瀉至高之氣沉香之升降其氣腦麝之散真氣若此之類氣實可宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能却氣之標而不能治氣之本豈可又佐以燥熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之常服多服可乎氣之與火一理而已動靜之變反化為二氣作火論治與病亦相得丹溪發揮論云冷生氣者出於高陽生之諺言也自非身受寒氣口食寒物而足論寒者吾恐十之無一二也

血屬陰難成易虧論

內經曰營者水穀之精也和調五藏灑陳於六腑乃能入於脈也源源而來生化於脾總統於心藏於脾肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脈少則澀充則

實常以飲食日滋故能陽生陰長液汗變化而赤為血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脈由此而空虛可不謹養哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內而無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易而調治也難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陽道常饒陰道常乏陽常有餘陰常不足以人之生也年至十四而

經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧知此陰氣一虧傷所變之證妄行於上則吐衄衰涸於外則虛勞妄返於下則便紅稍血熱則膀胱癃閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中濕蒸熱瘀則為滯下熱極腐化則為膿血火極似水血色紫黑熱盛於陰發於瘡瘍濕滯於血則為痛癢瘾疹皮膚則為冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則為喜狂墮恐跌仆則瘀惡內凝若分部位身半已上同天之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證

輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中之氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生眞陰之虛也當歸分三治血中主藥通腎經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血氣腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨經損益損其一二味之所宜為主治可也此特論血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蓯蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑桂者血寒所宜生地黃苦參血熱所宜此特取其正治之大略耳以其觸類而長可謂無窮之應變矣

滯下辯論

滯下之病嘗見世方以赤白而分寒熱妄用兜澁燥劑止之或言積滯而用巴硇丸藥攻之或指濕熱而與淡滲之劑利之一偏之誤可不明辯乎謹按原病式所論赤白同於一理反復陳喻但不熟察耳果腸

胃積滯不行法當辛苦寒涼藥推陳致新蕩滌而去不宜巴硇毒熱下之否則鬱結轉甚而病變危者有之矣若瀉痢不分兩證混言濕熱不利小便非其治也夫泄者水穀濕之象滯下者垢瘀之物同於濕熱而成治分兩岐而藥亦異若淡滲之劑功能散利水道濁流得快使泄自止此有無之形豈可與滯下混同論治而用導滯行積可乎其下痢出於大腸傳送之道了不干於腎氣所下有形之物或如魚腦或下

如豈汁或便白膿或下純血或赤或白或赤白相雜若此者豈可與瀉混同論治而用淡滲利之可乎嘗原其本皆由腸胃日受飲食之積餘不盡行留滯於內濕蒸熱瘀鬱結日深伏而不作時逢炎暑不行相火司令又調攝失宜復感酷熱之毒至秋陽氣始收火氣下降蒸發蓄積而滯下之證作矣以其積滯之滯行故名之曰滯下其濕熱瘀積干於血分則赤干於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪矣久而不愈氣血不運脾積不磨陳積脫滑下凝猶若魚腦矣甚則腸胃空虛關司失守濁液并流色非一類錯雜混下

注出狀如豈汁矣若脾氣下陷虛坐努責便出色如白膿矣其熱傷血深濕毒相瘀黏結紫色則紫黑矣其污濁積而欲出氣滯而不與之出所以下迫窘痛後重裏急至圊而不能便總行頻併亦少乍止乍起而不安此皆大腸經有所壅遏窒礙氣液不得宣通故也眾言難處何法則可求之長沙論云利之可下者悉用大黃之劑可溫者悉用薑附之類何嘗以巴硇熱毒下之緊澁重藥兜之又觀河間立言後重則宜下腹痛則宜和身重則宜溫脈弦則去風膿血黏稠以重藥竭之身冷自汗以重藥溫之風邪內束宜汗之鶩溏為痢當溫之在表者汗之在裏者下之在上者涌之在下者竭之身表熱者內疏之小便澁者分利之用藥輕重之別又加詳載行血則便膿自愈調氣則後重自除治實治虛之要論而丹溪又謂大虛大寒者其治驗備載局方發揮觀此治法豈可膠柱而調瑟又有胃弱而閉不食此名禁口痢病七方未有詳論若以內經大法推之內格嘔逆火起炎上之象究乎此則胃虛木火乘之是土敗木賊也見此多成危候

三消之疾燥熱勝陰

嘗讀劉河間先生三消之論始言天地六氣五味以配養人身六味五藏而究乎萬物之源終引內經論渴諸證以辯乎世方執藥之悞此比物立象反復詳明非深達陰陽造化之機者孰能如是邪請陳其略夫經中有言心肺氣厥而渴者有腎熱而渴者有言胃與大腸結熱而渴者有言脾痺而渴者有因小腸痺熱而渴者有因傷飽肥甘而食渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇天熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因痛風而渴者雖五藏之部分不同而病之所遇各異其為燥熱之疾

一也三消之熱本濕寒之陰氣衰燥熱之陽氣大甚皆因乎飲食之餌失節腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱甚或因久嗜鹹物恣食炙煿飲食過度亦有年少服金石丸散積久實熱結於下焦虛熱血氣不能制實熱燥甚於腎故渴而不飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消此三消者其燥熱同也故治疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟一身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故泄漏消渴多者不知其書謂因下部腎水虛不能制其上焦心火使上實熱而多煩渴下虛冷而多小便若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則自然渴止小便如常而病愈也吁若此未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則為熱心火屬陽而本熱虛則為寒若腎水陰虛則心

火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱矣以彼人言但見消渴數溲妄言為下部寒爾豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也且夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水令腎水既不能勝心火則上下俱熱奈何以熱養腎水欲令勝心火豈不謬哉彼不謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多此又不知消渴小便多者蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外以養乎百骸故腸胃之外燥熱太甚雖多飲水入於腸胃之內終不能浸潤於外故渴不止而小便多水液既不能滲泄浸潤於外則陰燥竭而無以自養故久而多變為聾盲瘡瘍痤痱之類而危殆其為燥熱傷陰也明矣

泄瀉從濕治有多法

泄瀉者水濕所為也由濕本土土乃脾胃之氣也得此證者或因於內傷或感於外邪皆能動乎脾濕脾病則升舉之氣下陷濕變注并出大腸之道以胃與大腸同乎陽明一經也云濕可成泄墜故治濕大意而言後世方論泥云治濕不利小便非其治也故凡

泄瀉之藥多用淡滲之劑利之下久不止不分所得之因遽以為寒而用紫蔻熱藥兜之夫泄有五飧泄者水穀不化而完出濕兼風也溏泄者所下汁積粘垢濕兼熱也鶩泄者所下澄徹清冷小便清白濕兼寒也濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也若此有寒熱虛實之不同舉治不可執一而言謹書數法于後夫泄有宜汗解者經言春傷於風夏必飧泄又云久風為飧泄者保命集云用蒼朮麻黃防風之屬是也有宜下而保安者若長沙言下痢脉滑而數者有宿食也當下之下利已差至其時復發者此為下未盡更下之安悉用大承氣湯加減之劑有宜化而得安者格致餘論夏月患泄百方不效視之久病而神亦瘁小便少而赤脉滑而頗弦格悶食減因悟此久積所為積濕成痰留於肺中宜大腸之不固也清其源則流自清以茱萸等作湯溫服一碗許探喉中一吐痰半升如利減半次早晨飲吐半升而利止有以補養而愈者若脾胃論言脉弦氣弱自汗四肢發熱大便泄瀉從黃芪建中湯有宜調和脾濕而得止者若潔古言曰四肢懶倦小便不利大便走泄沉困飲食減少以白朮芍藥茯苓加減治之有宜升舉而安者若試效方言胃中濕脾弱不能運行食下則為泄助甲膽風勝以尅之以升陽之藥羌活獨活升麻防風炙甘草之屬有宜燥濕而後除者若脾胃論言上濕有餘脉緩怠惰嗜卧四肢不收大便泄瀉從平胃散有宜寒涼而愈者若長沙言協熱自利者黃芩湯主之舉其濕熱之相宜者若長沙言下利脉遲緊痛未欲止當溫之下利心痛急當救裏下利清白水液澄徹可與理中四逆湯輩究其利小便之相宜者河間言濕勝則濡泄小便不利者可與五苓散益元散分導之以其收斂之相宜者東垣言寒滑氣泄不固製訶子散澀之以上諸法各有所主宜獨利小便而濕動也豈獨病因寒必待龍骨石脂紫重燥毒之屬澀之治者又當守士究一途取利約而不博可乎

外科精義四卷

(元)齊德之撰

明刻東垣十書本

外科精義二卷（江蘇巡撫採進本）

元齊德之撰。德之始末未詳。惟其結銜稱醫學博士充御藥院外科太醫。是編先論後方、於瘡腫診候淺深虛實最為詳盡。考周禮天官瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊。註曰、劀謂刮去膿血。殺謂以藥食其惡肉。又曰凡療瘍以五毒攻之。註曰、今醫方有五毒之藥、合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之。三日三夜其煙上著。以雞羽埽取之、以注創惡肉、破骨則盡出。又曰以五氣養之、以五藥療之、以五味節之。註曰、既劀殺而攻盡其宿肉、乃養之也。五氣當作五穀字之誤也。節節成其藥之力云云。是則古者瘍醫攻補兼施之明證。後之瘍醫惟持攻毒之方。治其外而不治內、治其末而不治本、故所失恆多。德之此書務審病之所以然、而量其陰陽強弱、以施療。故於瘍科之中、最為善本。書中無一字及李杲、李杲平生亦不以外科著。原本附東垣十書之末、蓋坊刻雜合之本、取以備十書之數。與所載朱震亨書均為濫入。孫一奎赤水元珠引之、竟稱東垣外科精義、不考甚矣。

外科精義序

嘗聞名臣奏疏對策每
及治道取喻乎醫云
修身者內而元神宜固
外而癬疥宜防相因然

理也未有元神虛而癬
疥之為虞者未有癬疥
得平而元神不至斷者
此以喻善喻也乎又以
治道喻醫夫內治修而

外治亦備則身齊治可
平之內治修而外治備
即軒轅克蚩尤而奏垂
裳虞舜征有苗而臻恭
已是醫有內外科亦然

序二

昔神農嘗草黃帝作經
實開萬世醫學之源嗣
後名醫代作推本二聖
人遂義裝其所未發以
啟來學至乎御醫齊其

邃于醫而於外科尤精手錄古人醫說之要与其平日治法之驗者題曰外科精義屬予訂正因讀之三複而恍有得

焉夫醫之為義實難矣脈候雖有訣而杳乎入微方書雖有傳而艱于對病藥集欲博而約汰粗為精皆古名家雖著

辨脈論證一以虛實為據条而用之具有明驗種種在錄察脈証之虛實實其虛虛其實要得義也第時醫少知其義于外

癰疽疔腫諸危證往往不察虛實局守方藥而槩以試之于人鮮不為其所誤既此篇不可不傳于世也一篇止聲上

六二卷其起死回生之書若扁華秘書修內攘外默寓經世之神功原始要終備舉活人之妙用醫人治國理固不異

起沉疴于康乂而登壽為之源者豈止是焉已哉蓋君子胞與民物視天下之瘵疾痛癢疾疲癃羌痌瘝乃身皆有

以惕于中而動其不忍雖髮膚身體皆可以用焉毫者且能以濟之而無所靡將使斯世世躋壽域無一不樂生彼澤

者而何有夭札瘥短折之患語云不為良相即為良醫推是義而其功詎小補也哉至于防患所謂藥醫于未病無

此又齊尹醫方三外之
深義也循此義以為治
是則真氣精而膚頡消
外攘之績能內修之要
務耶君之仁民愛物自
當與天壤並存云

宣授保全郎陝西等路
醫局提舉馬雲卿拜題

卷之一
論瘡腫診候入式法
論榮衛色脉參應之法
論持手訣消息法
論三部所主臟腑病證
論脉證名狀二十六種所主病證
論三部脉所主證候
論三部脉所主雜病法訣
論診候肺疽肺痿法
論將護忌慎法
卷之二
論瘡疽腫虛實法
辨瘡腫淺深法
辨膿法
辨瘡疽癤腫證候
辨瘡疽善惡法
砭鎌法

貼熁法
溻漬瘡腫法
針烙瘡腫法
灸療瘡腫法
內消法
追蝕瘡疽腫法
托裏法
止痛法
用藥增損法

療瘡腫權變通類法
論五發疽
論癰疽
論附骨疽
論陰瘡
論時毒
論諸瘡
論丁瘡腫
辨丁腫十三種形色禁忌
論疥癬治法
論痔瘻

卷之三

漏蘆湯
化毒丹
內消丸
五利大黃湯
內消升麻湯
五香連翹湯

牡礪大黃湯
和血通氣丸
地黃煎丸
槐角煎丸
皂角煎丸
苦參散
苦參丸
肺風丸
連翹散

竹葉黃芪湯
枳殼丸
五香湯
托裏黃芪湯
托裏茯苓湯
托裏當歸湯
托裏散
托裏玄參散
內托散

內補散
內塞散
香粉散
止痛當歸湯
黃芪茯苓湯
內補防風散
伏梁丸
溫經丸
木香溻腫湯

升麻溻腫湯
溻腫升麻湯
猪蹄湯
甘草大豆湯
溻腫湯
洗毒湯
浴毒湯
何首烏散
八仙散

消毒湯
熨風散
應痛丸
黃芪丸
梔子仁湯
葛根牛蒡子湯
通氣散
白丁香散
金銀花散

引膿散
乳香散
釣苓散
截疳散
抵聖散
青金錠子
白龍散
桃紅散
檳榔散

金黃散
生肌散
水澄膏
拔毒散
金露散
消毒散

卷之四

大檳榔散
天麻散
皂蛤散
十香膏
犀角膏
乳香膏
白龍膏
消毒膏
磨風膏
天麻膏
善應膏

靈應膏
翠玉膏
追毒散
廻瘡錠子
射膿丸
替鍼丸
治瘰癧并馬老鼠瘡
翠霞散
搜膿散

決効法
水銀膏
平肌散
神黄散
博金散
金傷散
完肌散
定血散
碧霞錠子

漏蘆湯
圡粉散
香蔡散
紫金散
通耳丹
菖蒲錠子
寸金錠子
薫痔散
通靈丸

三神丸
玉芝飲子
平和飲子
玄參丸
犀角散
防風散
烏金散
劉守眞瘡論
沒藥膏

必效散
烏金散
抵聖丸
應效散
白金散
如聖散
天蛾散
必効散
蛤粉散

治小兒丹瘤
治小兒瘡口瘡
治破傷風 并洗頭風藥
烏龍丸
紫參丸
萬靈丸
治眼
治吹妳
治痔瘡

洗痔
寸金丹
牙疳藥
廻瘡蟾酥錠子
乳香托裏散
四聖旋丁散
天丁散
萬應膏
治小兒面湮瘡
治赤白口瘡
治乾濕疥癬
治湯火燒燙瘡
治破傷風
治破傷
治風狗咬破傷風
論炮製諸藥及單方主療瘡腫法
目録終

外科精義卷之一

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宜授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○○論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索塗動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘當淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡

腫之生皆由陰陽不和血氣凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫于診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法略而未詳比夫諸科甚有減裂愚雖不才輒取黄帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覧此則判然可曉了無疑滯於胸次一朝臨病診候了然則察逆從決成敗若黑白之易分耳

○○論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脉中衛行脉外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行内則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於

脉故曰氣血者人之神也脉者氣血之神也所以治病之始五決爲紀蓋五決者五臟之色脉也脉應於内色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉可以萬全也凡爲醫先須調明色脉況爲瘡科若於此不精雖聰惠辨博亦不足季也

○○論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平旦爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進氣血未亂經脉未盛絡脉調勻故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論内經所謂持脉

有道以虛靜爲保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沉以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不調者病謂如室女尼冠脉當濡而弱嬰兒孺子之脉細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至爲平比夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以中指揣按掌後高骨骨下爲關得其關位然後齊下

兩左右二指若臂長人疎排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息一一類此若診得三部之中浮沉滑濇遲疾不調何病所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽略此醫之庸下也

○○論三部所主臟腑病證

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛尚於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探頤索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰神豈容易可至哉常考於經脉有三部寸關尺一從魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲陽即寸口也

關後爲陰即尺脉也陽出陰入以關爲界寸主上焦頭手皮毛關主中焦腹及腰尺主下焦小腹及足此三部所主大略也又有左右兩手三部爲之六脉也又有人迎氣口神門所主又各不同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分即曰神門故脉法讚曰肝心出左肺脾出右腎爲命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手太陽爲表裏小腸合爲府左手關上肝之部也其經足厥陰與足少陽爲表裏膽合爲府左

手關後腎之部也其經足少陰與足太陽爲表裏膀胱合爲府右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明爲表裏大腸合爲府右手關上脾之部也其經足太陰與足陽明爲表裏胃合爲府右手關後命門之部也其經手厥陰與手少陽爲表裏三焦合爲府此謂六部所主臟腑十二經之義也又脉要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候

亶中前以候前後以候後上竟上者胸喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也粗大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲眴仆諸浮不躁者皆在陽爲熱其有躁者在手陽諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉行五動爲以大息不大不小不長不短不滑不濇不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平人

之常氣也所以人常稟氣於胃故脉以胃氣爲本也正理論曰穀入於胃脉道乃行合靈樞經云胃爲水穀之海也又曰脉應四時曰平信夫四時之脉皆以胃氣爲本謂春弦夏洪秋毛冬石春之胃脉微弦曰平餘皆倣此逆四時有病其若診婦人之脉妊身則慎勿亂投湯散其婦人之脉診得少陰脉動甚則有子也又曰陰搏陽爲有子也又曰身汗而無脉者即有妊也蓋重身者悶其月事觀其體貌然後主治不可忽也又經曰察色按脉先別陰陽蓋陰陽者天地

之道也是以治病者必求其本本於陰陽寒暑四時五臟之根也以脉言之則浮沉也以部言之則尺寸也故經云脉者陰陽之法以應五臟是謂呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味其脉在中也以浮沉論之則曰浮者陽也沉者陰也應在臟腑則浮而大散者心也浮而短濇者肺也所以心肺俱浮也牢而長者肝也按之而大舉指來實者腎也所以肝腎俱沉也遲緩而長者脾也脾為中州所以脉在中也仲景曰大浮數動滑皆陽也沉濇弱弦微皆陰也

陽者熱也陰者寒也所以寒則脉來沉而遲熱則脉來浮而數故曰諸數為熱諸遲為寒無如此驗也脉經曰諸浮為風諸緊為痛諸伏為聚諸弦為飲芤者失血長則氣治短則氣病濇則煩心大則病進浮為在表沉為在裏遲為在臟數為在腑又形壯脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胸中氣多者死形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脉之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無後其時也所以形氣相得者生色澤以浮者療易已脉從四時者可治脉弱以滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色夭不澤及脉逆四時或脉實益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脉靜泄而脉大脫血脉實汗後脉躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄脉滑數者難治也凡癰膿多或加清泄脉滑大散寒熱發渴者治之無功也若患肺癰者咳嗽膿血脉見洪滑治之難痊矣大凡診脉見浮數應當發熱而反惡寒雖頭項拘急四肢煩痛或復戰慄渴甚者但有痛處欲發瘡癤也

○論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診脉之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者識之以要其中謹於諸家脉法中攝其機要剪去繁蕪載其精義

○浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太過瞥瞥然見於皮毛間其主表證或為風或為虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡

寒者瘡疽之謂也

○洪脈之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脈洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脈見洪大則難治若自利者不可救治也

○滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其主或為熱或為虛此陽脈也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始

為熱而為虛也

○數脈之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數為熱仲景曰脈數不時見則生惡瘡也又曰肺脈俱數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

○散脈之診似浮而散按之則散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊退者診其脈洪滑粗散難治也

以其正氣虛而邪氣實也又曰肢體沉重肺脈大則斃謂浮散者也

○芤脈之診似浮而輭按之中央空兩邊實其主血虛或為失血瘡腫之病診得芤脈膿潰後易治以其脈病相應也

○長脈之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脈也百病皆愈謂之長則氣治也

○牢脈之診按之則實大而弦且沉且浮而有牢堅

之意若瘰癧結腫診得牢脈者不可內消也

○實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

○弦脈之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而不移緊如內繩而轉動以此為異春脈浮弦而平不時見則為飲為痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

○緊脈之診似弦而緊按之如切繩而轉動其主切

痛積瘀也瘡腫得之氣血沉濇也亦主痛也
○濇脉之診按之則散而復來舉之則細而不足脉濇則氣濇也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也
○短脉之診按舉則不及本位内經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脉短皆難治也瘡腫脉短真氣短也
○細脉之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微其主亡陽裏也瘡腫之病脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也

○微脉之診按之則軟小而極微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而匀舉自差也
○遲脉之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊
○緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰陽同等謂之緩脉兄長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣也
○沉脉之診舉之不足按之方見如燗綿其主邪氣在臟也水氣傳之則逆此陰脉也瘡腫得之邪氣深也
○伏脉之診比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪益深矣
○虛脉之診按之不足遲大而輭輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也

○輭脉之診按之則如帛在水中極輭而沉細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏
○弱脉之診似輭而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏
○促脉之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之
○結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景

曰陰盛則結經曰促結則生代則死

○代脉之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脉也代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而況見代脉乎

○動脉之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動揺者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣成而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也

○論三部脉所主證候

○夫寸關尺者脉之位也浮沉滑濇者脉之體也莫位分體指文語證者診脉之要道也脉經曰大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也

○寸口脉浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒脇下冷飲也沉而緊者心下寒而積痛沉而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛也弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脇下痛也偏絃者不遂也俱絕者不治也漉漉如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛絲者陽氣衰也

○關主中焦胸腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在胃也數者熱結中焦也沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也弱者胃氣虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而實者腹滿響響噎塞而不通或復大痛澀者氣逆也芤則瀉血濇堅太實按之不減而有力者中焦實有結伏在胃也微浮者積熱不消蚘動心悸也

○尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脉浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也輭者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛而癥瘕穀不化也細者溏泄而下冷也芤者小便瀝血而下虛也牢而小者足膝寒痺脚下隱隱疼痛也細而急者筋攣不能行也來而

斷絕者。男子小腹有滯氣也。婦人月水不利也。

○○論三部脉所主雜病法訣

夫三部之中。俱見一脉。所主雜病。畧而言之。脉經曰。陽邪來見浮洪。陰邪來見微細。水穀之邪來見實堅。寒癖之邪來見弦小。又曰。浮而滑者。宿食也。短而滑者。酒病也。遲而滑者。脹滿也。洪而大者。傷寒也。浮而數者。傷風也。浮而急者。飲食不消。脾不磨也。沉而弦者。寒氣結而陰痛也。浮而緩者。皮膚不仁也。滑而散者。癱瘓也。遲而濇者。寒癥也。浮而濇者。霍亂也。弱而濇者。反胃也。緊而滑者。吐逆也。短而數者。心痛也。弦

而數者。為瘧也。緊而急者。尸遁也。實小而堅者。病在內而冷也。浮滑而緊者。病在外而熱也。短而急者。病在上也。長而緩者。病在下也。長而弦者。病在肝也。滑而洪者。病在心也。微而輭者。病在脾也。浮而濇者。病在肺也。沉而緊者。病在腎也。又訣曰。諸浮為風。或為虛也。諸緊為痛。或為積也。諸濇為痺。諸弦為飲。諸數為熱。諸遲為寒。芤則為失血。輭則為虛。若脉沉沉澤澤。四肢不仁者。亡祟也。或大而愵愵者。社祟也。若脉來乍大乍小。乍短乍長者。鬼祟也。

○○論診候肺疽肺痿法

夫肺者。五臟之華蓋也。處于胸中。主于氣。候于皮毛。勞傷血氣。腠理虛而風邪乘之。內感于肺也。則汗出惡風。咳嗽短氣。鼻塞項強。胸膝脹滿。久久不瘥。已成肺痿也。風中於衛。呼氣不入。熱至於榮。則吸而不出。所以風傷皮毛。熱傷血脉。風熱相搏。氣血稽留。蘊結於肺。變成瘡疽。診其脉候。寸口脉數而虛者。肺痿也。數而實者。肺疽也。肺痿之候。久嗽不已。汗出過度。重

亡津液。便如爛瓜。下如豕脂。小便數而不渴。渴者自愈。欲飲者。欲瘥。此由肺多唾涎沫。而無膿者。肺痿也。其肺疽之候。口乾喘滿。咽燥而渴。甚則四肢微腫。咳唾膿血。或腥臭濁沫。胸中隱隱微痛者。肺疽也。又聖惠曰。中府隱隱而微痛者。肺疽也。上肉微起者。肺瘡也。中府者。穴也。在雲門下一寸六分。乳肋間動脉應手陷中也。是以候始萌則可救。膿成則多死。若欲知有膿者。但診其脉。若微緊而數者。未有膿也。緊甚而數者。已有膿也。又內經曰。血熱則肉敗。榮衛不行。必

將為膿大凡肺瘡當咳嗽短氣胸滿時唾膿血久久如粳米粥者難治若嘔膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其脉短而濇者自痊浮大者難治其面色當白而反面赤者此火之尅金皆不可治

○論將護忌慎法

大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不以為急此雖大患宜速辨之不可自忽若能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚

委之於命束手待斃不以去道遠乎以致筋骨敗遺穿通臟腑死者十有八九矣可不慎歟蓋患瘡疽之人托命庸醫任意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不可不擇辨之何難若能飽讀經書久諳證候湯藥熟閑洞明色脉性情仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方為良醫委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼怨恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩為宜於患人左右止息煩雜切忌打觸器物諸惡音聲爭辨是非呪罵鬪毆及産婦婬男體氣不潔帶酒腥羶雞犬乳兒孳畜禽獸並須遠離設或親友重意問疾者可以預囑徐行低聲款曲伺候禮畢躬退勿令嗟呀驚怪話舊引其遊賞宴樂遠別親戚牽惹情懷但恐病人心緒悽愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患人疑滯不決秖合方便省問不可久坐多言勞倦病人深不長便失侍患者宜須壽近中年情性沉厚勤謹耐煩仁慈智惠全在調以粥藥無失時節勿令於患人左右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間忌慎非細不可不戒畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛

羖羊等并雜魚龜鼈蝦螺及淹浥臭陳自死病倒之類與勿嘗喫飛禽之中忌食鵝鴨鴻鴈雀鵲鴛鴦鷺鷥鳩鴿鴉雞雉及能學人言者慎勿食之野獸之中忌食獐鹿狐兔虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬忌慎勿嘗喫菜蔬之中忌食黃瓜茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥茵瓠韮蒜葱薤慎勿食之果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅輭棗紅柿銀杏胡桃榛松林檎及諸垂蔕未熟之果慎勿食之

若夫瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵝鴿鹿菁韮醬瓜蒡蘿蔔及黃白粮米細米稀粥餒飲若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅虀粥羹湯熟軟溫和稀稠得中製造如法勿令太飽此時猶忌饅頭蒸餅餺飥餛飩肉角煎餅及炙煿燥爆煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴登陟臺謝運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡瘢平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯之

外科精義卷之一

外科精義卷之二

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展證候危惡者須辨虛實況夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證多端不可不辨有瘡之虛實有臟腑氣血上下真邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷脉弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者

上實也精滑不滯大便自利腰脚沉重睡卧而不寧若下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者眞氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰眞氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛爲實痒爲虛也又曰診其脉洪大而數者實也微細而軟者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疏利而自導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

○○辨瘡腫淺深法

夫瘡候多端欲辨淺深直須得法若不素知方論而妄生穿鑿者如大匠捨其繩墨以意度量安能中於規矩哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽槩舉有三種高而軟者發于血脉腫下而堅者發于筋骨皮肉色不相辨者發于骨髓又曰凡疼瘡疽以手按摇瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居平和飲食如故其瘡浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛痒誤觸破之即焮展覺有深意速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等取通利疏暢兼用洛毒湯溻漬之類若浮淺者紙貼膏求差以此推之淺深之辨始終之次者也

○○辨膿法

夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辨膿生熟淺深不可妄開視其可否不至于危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺

也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非膿必是水也若發腫都軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰必多成瘻宜早服內塞散以排之諸癰瘤疣贅等至年衰皆自內潰若于年壯可無後憂也又凡療癰疽以手掩其上大熱者膿成自軟也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也若患瘰癧結核寒熱發渴

經久不消者其人面色痿黃被熱上蒸已成膿也至於臟腑腸胃內癰內疽其疾隱而不見目既不見手不能近所爲至難可以診其脉而辨之亦可知矣有患胃脘癰者當候胃脉人迎者胃脉也其脉沉細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃脘而爲癰也若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不慎也久久咳膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也又腸癰論曰或遶臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

○○辨瘡疽癤腫證候法

夫瘡疽癤腫其名甚多載之紛紜方書百緒及至臨疾治之無措不知所以內經曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮愚雖不才姑攝其要而言之熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過二三寸者癤也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光軟侵展廣大者癰也五臟風積蒸攻於肌骨風毒猛暴初生一頭如痞瘰白焦枯觸之應心者疽也夫癰發於六腑若燎原之火外潰膚肉疽生五臟沉澀難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療易得痊復夫癤與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以導其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其氣本深沉須達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎三者腫毒丹瘮可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或痒移走無常者謂之腫有因風而得之者有因風熱相搏而得之者腫硬色白因熱而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者

久久而不消熱勝於風若不即治血不流通與氣乘之以成膿也又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂之瘡瘤凡丹瘤之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鎌針所以忌也又頸腋之間而生結核初如豆粒或加梅李核累累相連歷歷三五枚久

久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者得於風熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣纏經所成證候不同治之者亦各異矣

○○辨癰疽善惡法

夫癰疽證候善惡逆從不可不辨從來醫癰集舉五善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑癰疽所論之證也發背腦疽別有善惡之證載之於後益七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也膿血既洩腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡

也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也喘麤短氣恍惚嗜臥四惡也肩背不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗脣鼻青赤面目四肢浮腫者七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消水鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣平和五善也病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是者豈淺識之所知哉只知五善併至則善無以加矣七惡併至見惡之極矣愚意裁之凡患癰疽之時五善之中乍見一二善證癰事治也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵證候癰疽之發虛中見惡證者不可救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼尚未痊者診其脉洪滑麤散者難痊微濇遲緩者易痊此善惡之證於診候之中亦可知也發背腦疽及諸惡癰別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是爲五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裏臟腑之傷也當隨證以治之

○○砭鐮法

大上古制砭石大小者隨病所宜也內經謂針石砭石鑱針其實一也今時用鐮者從聖濟總錄丹毒論曰法用鐮割出血明不可緩也合扁鵲云病在血脉者治之以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生于內治之砭石蓋砭石者亦東方來爲其東方之民其病多癰瘍其法宜砭石砭石之用自有證候非止丹瘤也但見腫起色赤遊走不定宜急鐮之先以生油塗赤上以鐮鐮之要在洪洩

其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九鍼之用而各有所宜也砭鎌之法雖治瘡疽不可輕用也

○○貼熁法

夫瘡腫之生於外者由熱毒之氣蘊結于內也蓋腫於外有生頭者有漫腫者有皮厚者有皮薄者有毒氣深者有毒氣淺者有宜用溫藥貼熁者有宜用涼藥貼熁者有可以乾換其藥者有可以濕換其藥者深淺不同用藥亦異是以不可不辨也若瘡腫初生

似有頭者即當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也於四畔亦須處擣生寒藥貼熁之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥艸膏之類有勢力微欲使瘥瘡者敵其勇夫不亦難乎又有麁工不審逆從便用寒藥敷貼迫逐邪毒復入于內歸于肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散腫毒血脉疎通寒熱逆從斷其去就焉慎不可執方無權安能散于鬱結不成膿乎其腫皮厚者以故軟布或以紙花子塗藥貼熁之待其藥乾換腫皮薄者即用疎紗或薄紙塗藥貼熁之其藥未乾即當換之若至膿潰之後即貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼之藥水調貼之夫血脉喜溫而惡寒若著冷氣過理即血滯難瘥矣

○○溻漬瘡腫法

夫溻漬瘡腫之法宜通行表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日

不退即須用湯水淋射之其在四肢者溻漬之其在腰腹背者淋射之其在下部委曲者浴漬之此謂疎道腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升為則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱溻其患處漸漸喜溻淋浴之稍涼則急令再換慎勿冷用夫血氣得寒則凝澀得熱則淖澤日用五七次病甚者日夜不住或十數次腫消痛止為驗此治瘡腫神良之法也

○○針烙瘡腫法

夫瘡疽之疾證候不一針烙之法實非小端蓋有淺有深有逆有疾宜與不宜不可不辨蓋疽腫皮厚口小腫多膿水出不快者宜用針烙瘺皮薄惟用針以決其膿血不可烙也如其未成膿已前不可以諸藥貼熁溻漬救療以待自消久久不消內潰成膿即當弃藥從其針烙當用久針如似火筯磨令頭尖如棗核樣圓滑用燈焰燒須臾作炬數揾油燒令赤于瘡頭近下烙之一烙不透即須再烙令透要在膿水易出不解按抑近代良醫倉卒之際但以金銀鐵鋌其

樣如鍼者可通用之實在泄其毒也或只以木炭熱火猛燒通赤蘸油烙之尤妙烙後實者撚髮為紝虛者以紙為紝于紝上蘸藥紝之上以帛攤溫熱稠粘膏藥貼之常令滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜肌肉腐爛若不鍼烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻其內內既消敗欲望其生豈可得乎嗟乎此疾針烙取差實為當理然忌太早亦忌稍遲嘗見粗工不審其證淺深妄施針烙之法或瘡深針淺烙毒氣不得泄以致內潰或瘡淺烙深誤傷良肉筋骨腐爛或抑按掀動加益煩痛或針之不當別處作頭或即時無膿經久方潰遂使痛中加痛真氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡用醫者不可不擇縱常醫療之得痊者幸矣

灸療瘡腫法

夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜溻漬之腫皮光軟則鍼開之以洩其毒治瘡之手法迨不過此而各有所宜故聖惠方論曰認是瘡疽便宜灸之一二百壯如菉豆許大灸後覺似焮痛經一

宿乃是火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出所以然也若其瘡痒宜隔豉餅子灸之其餅須以椒姜鹽葱相和搗爛捏作餅子厚薄如折三錢以來當瘡頭豉餅子上灸之若覺太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳若其瘡痛即須急灸壯數多為妙若其膿已成者慎不可灸即便針開之即得瘥也若諸瘡經久不瘥變成瘻者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊可瘡口大小安之別取少許硫黃于火上燒用釵尖挑起點硫黃令著三五遍取濃水乾差

為度若其發背初生即宜上餅灸法灸之初覺背上有瘡疼痒頗異認是發背即取淨土水和捻作餅子徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷灸之一炷一易餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如錢許大日夜不住灸以瘥為度已上數法並依本方一一親驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記疳瘻惡瘡諸醫不驗者取蟾蜍剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七炷一易不過七枚無不效者又法用乞火婆虫灸之同前法累驗之神效人皆秘之往

往父子不傳又法赤皮蒜搗爛焊作餅子一如豆豉餅子灸法灸之獨佳

○內消法

夫瘡疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝澀氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘍陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生于臟腑胸腹之中外則生于膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰特可疎滌風熱通利臟腑一二行徐次諸湯淋漬即得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致令膿血之聚也內經謂治病必求于本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內消也辨之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則焮腫色赤以為異也如其氣已結聚不可論內消之法宜用排膿托裏之藥此者先後之次也

○追蝕瘡疽膿法

夫瘡瘍生于外皆由積熱蘊于內內經謂血熱肉敗

榮衛不行必將為膿留于節腠必將為敗蓋瘡疽膿潰爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疼痛難任者所以立追蝕膿之方法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡紝其血出不止者則未可紝于瘡上摻追蝕之藥待其熱可紝方紝若其瘡紝之痛應心根者亦不可以強紝之誤觸其瘡其焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡瘍膿成未破于上薄皮剝起者即當用破頭代鍼之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取效如神矣若

膿血未盡便用生肌斂瘡之劑務其早愈殊不知惡肉未盡其瘡早合後必再發不可不慎也

○托裏法

夫瘡疽丹瘤結核瘰癧初覺有之即用内消之法經久不除氣血漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡口不合或聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱温涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

○止痛法

夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛殊不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以温熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而有痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡祕澀者利之臨機應變方爲上醫不可執方而無權也

○用藥增損法

古人用藥因病制宜治不執方隨病增損瘡積聚補益可用丸藥以從舊不改方增損蓋瘡疽危要之際證候多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發背腦疽惡丁腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥内加五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱者加地黃瓜蔞根往來寒熱者并潮熱者加柴胡地

骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者加木通燈艸虛煩者加枸杞子天門冬自利者加厚朴四肢厥冷者加附子生姜嘔逆者加丁香藿香多痰者加半夏并陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白斂官桂有風邪者加獨活防風心驚悸者加丹砂口目瞤動者加羗活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉

○瘰癧腫權變通類法

夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋溻及敷掃貼熁鍼鎌炙烙用之不同蓋知其道也舉治必効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今之通論也又有撿方療病妄製加減以意裁之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才略陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之

性其可因其類而取之也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱將自除腎水虛生寒當補心心火既降寒將自除此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間有正有權者何也蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也然爲瘡科於補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也太凡治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽一二日宜先服五利湯蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今湯法謂切剉㕮咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也次有丸散宜導血脉漸次消磨令緩散也助以淋溻調和榮衛行經絡也更當膏潤溫養兼磨傅四畔貼熁之藥順其陰陽也追蝕托裏汗下調補臨時製宜淺深緩急自有等差男女貴賤亦當別論晉尚書褚澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦此深達其情者也又仲景云物性

剛柔餐居亦異治亦不同也所以黃帝與四方之問岐伯舉四治之能況病之新舊刑志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜即當用托裡散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

○○論五發疽

夫五發者謂癰疽生于腦背眉髭鬢是也大槩論之分爲三等一者疽也二者癰也三者癤也夫疽初生

如黍米大痒痛有異誤觸破之即焮展四畔赤腫沉悶牽引脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展濃汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也其發於腦者爲腦疽也其發於鬢眉鬚者以類呼也又有初生其狀無頭腫闊三四寸如覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色浮赤而無根腫見于皮膚之間大小一二寸者癤也三者之候雖疽最重此疾初生皆曰滋味與厚衣不

服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則成癤實則爲癰深則爲疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初生認是癰則宜速療之若氣實之人惡服五香連翹湯漏蘆湯若年幾未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒餅之類貼溫熱膏劑更溻腫湯潰毒湯淋溻之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱觸著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃朴硝苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者即用追蝕之藥或錠子紝之上用鹿角散以鹹炭爲糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散畢霞散之類紝之若瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥纔得平復必再發其間調理次第臨時

制宜將護忌慎之法耳

○○論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之經所謂榮衛稽留于經脉之中則澀不行血脉不行則陽氣鬱遏而不通故生大熱熱毒之氣騰出于外畜結爲癰久而不散熱氣乘之腐化爲膿然而骨髓不焦枯腑臟不傷敗可治而愈也何爲疽五臟風毒積熱毒熱熾甚下陷肌膚骨髓皆枯血氣涸竭其腫色夭堅如牛領之皮故命曰疽癰者其腫皮薄以澤此其

候也癰疽之生有內有外內生胸腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒憂樂不時飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調使陰陽之不平而蘊結外使榮衛凝澀而腐潰輕者起於六腑浮達而爲癰氣行經絡而浮也重者發于五臟沉澀而爲疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

○論附骨疽

夫附骨疽者以其毒氣深沉附著于骨也此疾與賊

風相類而不同人不能辨治之悞矣蓋附骨疽者由秋夏露卧爲冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨動處即得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也賊風不治久而變爲彎曲偏枯所以不同也認是賊風則服引越脾治風之劑即得差矣

認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散踈下之次用內消升麻湯及溻漬膏貼之類縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣何者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏于骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以取消矣其次調治臨疾制宜故不復具載矣

○○論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者濕陰瘡二者妬精瘡三者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作臼妨悶痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡痞澀氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫焮腫尤甚衲瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰肉腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱

煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒湯等沉浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疎之更以截瘡抵聖散乾摻之四畔用磨風膏溫潤之後以將護忌慎之湯不止者服竹葉黃芪湯大便輭者宜服托裏茯苓調治之夫如是則無不差矣

○○論時毒

夫時毒者為四時邪毒之氣而感之于人也其候發于鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識

者將為傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始召瘡醫原夫此疾古無方論世俗通為丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之于經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為謂之丹瘤與夫時毒特不同耳蓋時毒者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜精辨之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也認是時毒氣實之人急服化毒丹以攻之熱實以不利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣軟者五香連翹湯主之又於鼻內嗃通氣散取十餘嚏作効若嗃藥不嚏者不可治之如嚏出膿血者治之必愈如左右看病之人日日用嗃藥嚏之必不傳染切須忌之其病人每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散宜鍼鎌砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉

閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死之候治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下嘗見粗工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

○○論諸瘡

夫諸瘡之生其類甚多種大小方書載之紛紛以要而論槩舉四等一者因于氣血稽留而結于內者謂腸胃之中癰疽是也二者因于氣血稽留而結于外者謂十丁九瘻五痔之類是也三者不因氣血而為

瘡謂墮仆并金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也四者不因氣血而骨肉損傷者謂虫獸爪牙所害之類是也然而四等皆不難損於肌膚害於筋骨不必具載今於隨方條下該說治證以法附之爲治之者臨疾制宜適事爲故耳

○論丁瘡腫

夫丁瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方論之凡有十種華元化載之五色丁千金方說丁瘡有十三種以至外臺秘要神巧萬全其論頗同然皆不離

於氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥過度不慎房酒以致邪毒蓄結遂生丁瘡內經曰膏粱之變足生大丁此之謂也其治之法急于艾炷炙之若不覺痛者針丁四邊皆令血出以迴瘡錠子從針孔紝之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等疎下之爲効若或針之不痛無血者以猛火燒鐵針通赤于瘡上烙之令如焦炭取痛爲効亦紝前錠子用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平服如針不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣入臟腑故也養生方云人汗入肉食食之則生丁瘡不可不慎也

○○辨丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血出去血傅藥藥力得入針孔中則佳若不達裏藥力不到又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也瘡上按之瘳痛應心者是秋冬寒毒久結皮膚中變作

此瘡不急療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身顫掉不已若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中見火光心神昏昧口乾心煩嘔吐不定宜速治之

○一曰麻子丁其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油衣布衣并入麻田中行

○二曰石丁其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫塼石之屬

○三曰雄丁其狀皰頭黑靨四畔仰皰漿起有水出

色黃大如錢孔形高者忌房室
○四曰雌丁其狀瘡稍黃向裏黶亦似炙瘡四面皰漿起心凹色赤如錢孔者忌房室
○五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑黶四邊有烟漿又如赤粟米者忌火燒烙
○六曰爛丁其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物
○七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十若滿三十六藥所不能治未滿三十六可治忌嗔怒畜積愁恨

○八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼人看并嫉妒人見忌毒藥
○九曰鹽膚丁其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起忌食鹽大忌
○十曰水洗丁其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑黶汁出中硬忌飲漿水水洗渡河
○十一曰刀鎌丁其狀濶狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治不可亂攻
○十二曰浮漚丁其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛
○十三曰牛拘丁其狀肉色皰起掐不破
右十三種丁瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁不同皆

宜將護依法治療禁忌勿得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云丁腫初發時突起如丁蓋故謂之丁令人惡心惡寒四肢強痛一二日瘡變爲焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死矣皆不可不速治也

○○論瘰癧治法

夫瘰癧之病其名甚多巢氏病源載之三十六種千

金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋故令筋畜結而腫其候多生於頸腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李核累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者當便服五香連翹湯或牡蠣大黃湯疎下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋傷腫湯漬毒湯時復淋溻如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂角丸之類漸以求差若腫結深

硬荏苒月日不能內消者久必成膿若腫高而稍軟其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法于瘡口中用追毒餅內錠子紝之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘻內經曰陷脉爲瘻留連肉腠即此病也可用蒜餅子灸之然後瘡口上用紫金散翠霞散等于上紝貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無造次焉

○論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脉腸澼滲漏衝注下部肛邊生瘡變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疎利臟腑及淋洗薰熨以取內消切忌酒麵辛熱房室肥膩稍縱

嗜欲腐潰膿血或逗流涎汁歲月已深旁穿竅穴即變痔漏即須用寸金錠子三五次痊愈若能味無味之味五味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹慎合宜未有不差者也

外科精義卷之二終

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧丁腫魚睛五發癧疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘澁小便赤黃並宜服之姙身莫服

漏蘆　白斂　黃芩去黑心

麻黃去節　枳實麩炒去穰　升麻

芍藥　甘草炙　朴硝已上各等一兩

大黃二兩

右除硝外餘㕮咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七分去柤空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥　乳香已上各五錢另研　草烏頭醋浸炮裂

浮石已上各一兩燒赤醋淬七次研餘醋另放

巴豆四十九粒去皮生用另研

右五味爲細末用浮石烏頭餘醋打麪糊爲丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或吐出惡瘡効

內消丸

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒欝滯服之內消矣大効

青皮　陳皮已上各二兩　牽牛八兩取頭末二兩

薄荷葉　皂角已上各八兩不蛀者去皮弦搥碎二味水一斗煮令極軟揉汁去柤用熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏子和丸如菉豆大每服三十丸食後荊芥茶清溫水皆可下

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者

大黃根　黃芩去腐　升麻已上各二兩

芒硝　梔子已上各八兩二錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎五七沸去柤空心稍熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃　升麻　當歸

黃芩去腐　枳實麩炒去穰　芍藥已上各二兩五錢

甘草炙一兩五錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去柤食前

稍熱服

五香連翹湯如不用五香只七味連翹湯

治證同前

沉香　藿香葉　木香

丁香已上各一兩　麝香一字五味爲極末另研

連翹　射干　獨活

升麻　甘草炙　寄生草已上各一兩

大黃一兩五錢

右七味㕮咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫服取利爲效未利則再服食前

牡蠣大黃湯

治證同前

牡蠣　木香　大黃煨已上各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分春夏露濕一宿於雞鳴時空心服之冬月於煖處放一宿婦人重身者勿服此藥決利三兩行便勿服已上五方對證選用

和血通氣丸

治證同前

人參一兩　麥門冬去心二兩　大黃

黃芩去腐　黃蘗已上各四兩　牽牛一斤炒香取頭末四兩

右六味爲細末鍊蜜爲丸如豌豆大每服二三十丸食後溫水送下尋常積熱之人隔三二日服此藥微利潤動永不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣

地黃煎丸

治臟腑有熱胸膈痰實血氣不和經絡祕濇多生

疏風已患惡瘡毒腫大小便結澀

生地黃 新者十兩洗水浸研如泥　黃連 五兩

黃芩 去腐三兩　枳殼 麩炒去穰　大黃 已上各二兩五錢

人參 二兩

右除地黃煎外並爲細末再和地黃煎和擣入鍊蜜丸如豌豆大每服五七十丸食後溫水下素有熱之人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服清利胸膈明目。

槐角煎丸

治瘡瘍瘰癧疥癬赤腫等瘡。

天麻　川芎　甘艸 炙

黃葉子　甘菊花　人參 已上各一兩

何首烏　苦參 已上各一兩五錢　荊芥穗

防風 已上各二兩　槐角 炒去仁

皂角 不蛀者已上各四兩水一斗揉汁去粗取仁熬成膏子其皂角子研入膏子用

右除皂角膏外槐仁與諸藥爲細末入膏內溲和鍊蜜爲丸如豌豆大每服五十丸食後竹葉湯下

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角 不蛀者三十鋌內十鋌炮黑十鋌酥炙十鋌用水一斗浸軟挼汁用度

何首烏　玄參　薄荷葉 已上各四兩

右爲細末與前膏子同鍊蜜爲丸如豌豆大每服三四十丸食後溫水送下。

苦參散 出郢夫多効方

治遍身瘡疥經年不較

苦參　蔓荊子　何首烏

荊芥穗　威靈仙 已上各等分

右爲細末每服二錢食前酒調下日進三服忌發

風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁　苦參　防風

玄參　獨活　枳實

甘菊花　黃連 去鬚　黃芩 去心

大黃 已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服五十丸茶酒

任下。食後服。

肺風丸 今體治世方

治面鼻風瘡及皶皰

細辛　旋覆花　羌活 已上各等分

晩蠶蛾 去翅足　苦參 已上各二兩

右為細末。軟飯和丸如梧桐子大。每服五十丸。茶酒任下。不拘時。

連翹散

治瘡瘍癤腫。一切惡瘡疼痛煩渴。大便溏泄。虛熱

不寧。

連翹　山梔子　甘艸

防風 已上各等分

右為粗末。每服二錢。水一盞。煎至七分。去粗溫服。不拘時候。

竹葉黃芪湯 出總錄一百三十一

治諸癰疽發背煩渴。及一切惡瘡發大渴者。

淡竹葉 二兩　黃芪　當歸

川芎　甘艸　黃芩 去心

芍藥　人參　麥門冬 去心

半夏 湯洗　石膏 已上各三兩　生地黃 八兩

右為粗末。每服五錢。水一盞半。竹葉五片。生薑五片。煎至一盞。去粗溫服。

枳殼丸

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼 去穰麩炒　牽牛 炒取頭末　木香

青皮 已上各一兩　甘艸　大黃

右為細末。用皂角長一尺許者三錠。約三兩。炮燋

搥碎。以好酒煮軟。挼取汁熬膏稠粘。和前藥末為丸如梧桐子。大每服三五十丸。食後葱茶下。日進二服。

五香湯 出總錄

治諸瘡毒氣入腹托裏。

丁香　木香　沈香

乳香 已上各一兩　麝香 三錢嘔者去麝香加藿香渴加

人參 已上各一兩

右為細末。每服三錢。水一盞。煎至六分。去粗空心

稍熱服總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未可與服

托裏黃芪湯 出總錄

治諸瘡潰後臟多內虛

茯苓去皮　人參　官桂去白

遠志去心　麥門冬　五味子炒

黃芪　當歸已上各等分

右為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服食前

托裏茯苓湯

防風　桔梗　芍藥

五味子　川芎　甘草

麥門冬去心　桂去皮　熟地黃已上各一兩

當歸　黃芪　茯苓已上各一兩五錢

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫水

托裏當歸湯 太醫瘡科何君玉方

當歸　黃芪　人參

熟地黃　川芎　芍藥

甘草炙　柴胡已上各等分

右為粗末每服五錢水一盞煎至六分去粗食前溫服

托裏散 出太醫瘡科成子玉方

川烏頭炮　茯苓已上各三兩　乾姜炮

麻黃去節　甘草炙已上各一兩五錢　杏仁炒去皮尖

五味子　桂心已上各一兩

右為粗末每服五六錢水一盞半煎至一盞去粗食前溫服

托裏玄參散 出總錄

主托裏止渴解熱煩渴

玄參　人參　甘草炙

甘菊花已上各等分

右為細末每服二錢菉豆湯調下亦名內托散

內托散 洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉方劑

治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可

服內消宜詳細用之。

當歸　芎藭　黃芪
厚朴去皮　桔梗　防風
甘艸炒　官桂去皮　人參
白芷　芍藥已上各一兩

右爲細末。每服三錢。溫酒調下。或木香湯亦可。

內補散 聖惠六十一。總錄一百三十。八無川芎。

黃芪　麥門冬去心　川芎
當歸　茯苓去皮　人參

五味子已上各一兩　遠志去心　甘艸炙
桂心已上各五錢

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。生姜三片。棗三枚。煎八分。溫服無時。

內塞散 總惠一百二十三。萬全方中去附子用天雄。

治瘡瘻不差諸瘡。

附子二個炮　官桂去皮　赤小豆
甘艸炙　黃芪　當歸
茯苓　防風　白芷
桔梗　川芎　人參
遠志去心　厚朴已上各一兩

右爲末。每服二錢。溫酒調下。空心日進二服。

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱。

真菉豆粉三兩　南乳香一兩

右爲細末。每服三錢。新水調下。

止痛當歸湯 出總錄一百三十。

治腦疽發背穿潰疼痛。

當歸　黃芪　人參
官桂　芍藥　甘艸炙
生地黃已上各一兩

右爲粗末。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去粗。溫服。日進三服。

黃芪茯苓湯 出總錄一百二十

治諸瘡潰後托裏除虛熱。

黃芪　白茯苓　官桂去皮
麥門冬　五味子　川芎已上各一兩

右爲粗末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半
煎至一盞去粗溫服食前日進三服

內補防風散

附子二箇炮炙去皮臍　防風　茯苓
白芷　桔梗　川芎
當歸　人參　甘草炙
遠志　官桂去皮　黃芪已上各一兩
厚朴二兩生薑汁製　赤小豆半斤酒浸一宿

右爲細末每服二錢溫酒調下

伏梁丸出養生必用方

治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴生薑汁製　茯苓　枳殼麩炒去穰
白朮　荊三稜炮　半夏湯洗七次
人參已上各一兩

右爲細末麪糊爲丸如小豆大每服三十丸食前
米飲湯下

溫經丸出[illegible]方

治陷脉瘺

厚朴生薑汁製　官桂去皮　白朮
甘草炙　乾薑炮　木香已上各一兩
附子二兩醋浸炮淬七次去皮臍

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食
後飲湯下

木香溻腫湯

治諸瘡疽始發腫焮增長熱痛

木香　犀角　大黃
梔子仁　升麻　黃芩

黃連　射干　黃蘗
白斂　甘草炙　朴硝
紫檀　羚羊角已上各一兩

右㕮咀入生地黃汁五合如無只用生乾地黃五
兩剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝
香五錢淨帛蘸藥熱搨腫上日兩三度冷卽再熱

升麻溻腫湯

升麻　黃芪　防風
川芎　生地黃　細辛已上各等分

右㕮咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋溻內消如神。

溻腫升麻湯 出總錄淋溻條下

升麻 芒硝 黃芩

漏蘆 梔子仁 蒴藋 已上各等分

右㕮咀每用藥二兩水三升煎十沸帛蘸藥溻消腫處。

猪蹄湯 出聖惠方

升麻 甘艸 芍藥

蒴藋 已上各等分

右㕮咀每用藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄輭取出火下藥再煎十沸帛蘸淋溻之

甘草大豆湯 出聖惠方

治外陰蝕下疳瘡瘡腫痛。

甘艸 三兩 赤皮葱 三莖 大豆 一合

右用水三升煮豆熟爲度用槐條一握同煮取清汁熱淋浴冷即再溫浸三二時爲度大効。

溻腫湯

芍藥 丹參 黃芩 去黑心

白斂 已上各等分

右㕮咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻溻之

洗毒湯

苦參 防風 甘艸 炙

露蜂房 已上各等分

右㕮咀水煮濃汁洗瘡腫

浴毒湯 出拾遺衛生方

治小腸風陰瘡痒痛。

木通 藁本 枳殼

管仲 白芷 荆芥

甘松 薄荷 已上各等分

右㕮咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱洗浴瘡。

何首烏散 出秘寶生方

治遍身瘡腫痒痛。

防風 苦參 何首烏

薄荷 已上各等分

右爲粗末每用藥半兩水酒各一升共用一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者二日痊愈

八仙散 出南生方

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風癢痒生瘡

細辛 荊芥 白芷

川芎 黄芩 防風

甘艸 地骨皮已上各等分

右爲粗末每用藥二兩水二碗煎十沸去柤熱淋瀉患處

消毒湯

治百雜瘡腫悉能內消

獨活 防風 細辛

藁本 川芎 枸杞子

荊芥 漏蘆 大黄

黄芩去腐 官桂 苦參

葳靈仙 丹參 黄芪

當歸 芍藥 茯苓

黄連 無心艸 黄蘗

麻黄 葛根 蒴藋

菊花 杜仲 地骨

秦皮 茵艸 甘艸

甘松 藿香 白芷

露蜂房 升麻 零陵香已上各一兩

蒼朮三兩 朴硝五兩 菖蒲八兩

右爲粗末每用藥半兩水二升葱三莖楊柳枝各一握同煎十餘沸去柤熱淋洗浴此藥用之如神

熨風法 出王子亨中箱集

羌活 防風 白芷

當歸 芍藥 細辛

芫花 吳茱萸 官桂已上各等分

右爲粗末入二兩赤皮葱連鬚細切半斤同釅醋拌勻炒令極熱用絹袋分盛於患上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止而已

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮(去皮)　當歸　艸烏頭(炮)
黑牽牛(已上各一兩)
右為細末，用醋糊為丸如小豆大，每服三十丸，空心醋湯送下。

黃芪丸

治腎臟風虛，攻注手足頭面麻痒痛痺，或生疥癬腫焮。

黃芪　烏藥　茴香(炒)
地龍(去土)　川椒(去目)　防風

川楝子(炒)　赤小豆　白蒺藜(去刺)
海桐皮　威靈仙　陳皮(已上各等分)
右為細末，酒糊為丸如梧桐子大，每服三十丸，空心溫酒送下。

梔子仁湯(出普濟生靈方)

治時氣頭面赤腫。

鬱金　枳殼　升麻
梔子仁　牛蒡子　大黃(已上各一兩)
右為細末，每服三錢，蜜水調下。

葛根牛蒡子湯

治時毒大頭病是也。

葛根　管仲　甘艸
鹽豉　牛蒡子(已上各一兩)
右為細末，每服三錢，用水調下。此疾近代患者傳染，多致夭枉，治之者少得方法，只云大熱，必然殊不知亦有虛實表裏，治之者詳其汗下吐不同，大抵與傷寒頗類，其中亦有可針鐮砭射出血者，亦有久而敗爛出膿者，其間變異百端，不可不慎所

宜時疾也。

通氣散

治時氣頭面赤腫，或咽喉閉塞不通，用之取嚏噴七八遍，洩出其毒則差，若看病之人用此藥，必不傳染。

玄胡(一兩五錢)　猪牙皂角　川芎(已上各一兩)
藜蘆(五錢)　躑躅花(二錢五分)
右為細末，每用紙撚子蘸一米許，紝於鼻中，取嚏為効。

白丁香散

治婦人吹妳初覺身熱頭痛寒熱及胸乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脉立能自消矣

白丁香 直者

右爲細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花 園地無花用苗葉嫩莖代之　甘艸 一兩

右爲粗末分爲三服酒水各一盞同煎至一盞去柤溫服無時

眞蛤散

治婦人因露風邪氣外客於乳內始爲吹妳積久不消以爲妳癰此藥導其汁散其風邪汗出其病自然痊愈矣

皂角 不蛀者燒存性　眞蛤散 已上各等分

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核瘰癧疳瘻疽痔

沉香　麝香 已上各一錢　木香
丁香　乳香　甘松
白芷　安息香　藿香
零陵香 各五錢同爲細末　當歸
川芎　黃芪　木香
芍藥　細辛　升麻
白斂　獨活　川椒

藁本　菖蒲　厚朴
木鼈子　官桂　商陸根 各二兩剉碎
桃仁　杏仁　柏子仁
松子仁 各五錢　槐枝　桑枝
柳枝　松枝 各二兩剉　沒藥
輕粉　雄黃　硃砂
雲母石　生犀角　亂髮灰
白礬灰 各二兩研細末　眞酥　豬脂
羊腎脂 各二兩　黃丹 一斤　清芝麻油 三斤

右先於木炭火鍊油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去租入脂酥煎十餘沸再以新綿濾過油澄清式銷令淨再入火上煎油沸下丹用濕柳枝作篦子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉入味輕煎令沸出火不住攪一食時於磁盒內容封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒送下

犀角膏

當歸　川芎　黃芪

白芷　白斂　杏仁

木鱉子　官桂　乳香

沒藥已上各一兩　亂髮灰五錢　黃丹一斤

清油五斤

右煎八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至杏仁白芷焦濾去租澄清再熬油沸下丹以濕柳木篦子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火候一時辰下乳香沒藥并髮灰攪勻於磁盒內收依常法攤用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香研　珠子瀝青　白蠟已上各五錢

白膠香二兩　杏子油一斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開入油攪勻以綿濾去租於井花水中持拔白色如銀再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法攤用之

白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清血脈消毒散腫通氣脈如神且可無瘢痕

輕粉五錢另研　白薇　白芷

白斂　黃芪　商陸根

柳白皮　桑白皮已上各一兩　乳香二兩另研

定粉另研　黃蠟已上各八兩　杏子油一斤芝麻油亦可

右七味剉油內揉浸三日於木炭火上煎令白芷

黃色濾去柤於油中下黃蠟乳香後溶開出火丹濾候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每用緋絹上攤用之

消毒膏

當歸 黃芪 川芎

杏仁 白芷 白歛

零陵香 槐白皮 柳枝嫩

木鱉子用仁 甘松已上各五錢剉 乳香

沒藥已上各三錢 輕粉一錢 硃砂

硃紅已上各五分 麝香一分 黃丹炒紫色

黃蠟已上各八兩 芝麻油一斤

右將剉藥油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去柤下黃蠟候溶開出火下丹急攪百十轉下乳香麝香硃砂等六味不住手攪至凝磁盒內收貯白光絹上攤之治證如白龍膏之類貼面目毛髮疵宜用之

磨風膏

治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火破傷磨風止

瘡滅瘢痕

白附子 白芍藥 白茯苓

零陵香 白芨 白歛

白芷 白檀 藿香

升麻 細辛 黃芪

甘草 杏仁去皮尖已上各五錢 腦子一分

栝蔞根一兩 大栝蔞去皮二兩 黃蠟六兩

芝麻油一斤

右先藥十四味剉油內浸百日於鍋內慢木炭火上銀石器內煎至白芷微黃色離火入栝蔞二味著火煮百沸重綿濾去柤再慢火上煉油香下剉淨黃蠟溶開為度傾在磁器內收貯上糝腦子密封旋用磨風塗之

天麻膏

治疥癬赤禿手足癬皮剝起瘙癢疥瘡侵蝕痛癢汁浸淫遊變經久不差者

草烏頭 釣苓根 木鱉子用仁

天麻 藜蘆 川芎

狼毒五錢已上各 輕粉 粉霜已上各二分另研

臘猪脂二兩 黃蠟六兩 油一斤

右前七味細剉如麻豆大于油內煎至焦紫色令冷濾去租上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗磨之大効

善應膏出南京寶光院明昌六年間進方

當歸 白芨 官桂

白斂 白芷 杏仁

木鱉子仁已上各一兩剉碎 乳香

沒藥已上各五錢研 黃丹二斤 芝麻油五斤

右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去租再煎油沸下丹用濕柳箄子不住手攪滴在水成珠子住火入乳香沒藥攪勻以磁盒內收貯每用依常法攤用之

靈應膏出總錄

治五發惡瘡瘰癧結核乳癰

鹿角十兩燒存性 白斂五兩 白麥飯石五兩火燒醋淬七次

右為細末每用釅醋中熬如膏厚塗于上中心留一竅以出其毒以故舊輭布攤之貼未成膿者貼即自消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳用之如神

翠玉膏

治輙癧膿水逗流愈後復發

明瀝青四兩 銅碌二兩 芝麻油三錢

豮猪膽三箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入水中用手撏撥磁盒內收貯用手排光緋上量瘡大小攤貼之不須再換十上便瘥可自落為度

追毒散太醫成子玉方

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂 川烏頭炮 白乾姜炮已上各一兩

全蝎五錢

右為細末用少許糝瘡口中深者紙撚蘸藥紝入瘡內以膏貼之或水浸蒸餅令浸透搦去水和藥須令勻撚作錠子每用紝入瘡口中亦名毒錠子

追瘡錠子

治丁瘡大効

艸烏頭　蟾酥七粳許　巴豆七粒去皮

麝香一字

右為細末麪糊和就撚作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用針深刺到痛處有血用此錠子紝之上用膏貼之丁瘡四畔紝之其丁三二日自然拔出此藥最當緊用

射膿丸

治諸瘡瘤膿水已成卽當針開決出陳臭惡淤則

其治也若其惡淤不出欲鍼不須當開發用此藥以射出其膿也

白礬灰一錢　砒霜五分　黃丹一字

右為末麪糊為丸撚作錠子每用紝瘡頭欲出處以膏貼之自潰

替鍼丸 出保生信効方

治證同前

陳壞米末一錢　硇砂五分　雄雀糞直者二十一枚

右為細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸粘在瘡頭上以膏貼之

治瘰癧并馬老鼠瘡

銅綠　斑猫　砒霜已上各五分

右為細末醋糊為丸如鼠糞大每用丹一錠子作三丸納於瘡口上以膏貼之如無瘡口乾摻之亦妙

翠霞散

治百雜惡瘡去毒生肌

滑石一兩　銅綠五錢　輕粉二錢

片腦　麝香已上各五分　粉霜一字

右為細末每撚藥紝於瘡口內以膏貼之或滑石二兩名二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不較惡瘡

白芷一兩　芎藭二兩　白芍藥三兩

輕粉二錢

右為細末每用乾摻瘡口上瘡口深者紝之

引膿散

治證同前

狼毒　鈎莕根　無心艸根

白丁香 已上各五錢　麝香 一字

右為細末，如前法用治之。

乳香散

治證同前

白乾姜　苦丁香　艸烏頭 已上各五錢

鈎莕根　狼毒　乳香 已上各一兩

右為細末，每用乾糝之，或唾調作錠子，紝入瘡內

即愈。

鈎莕散 陳宮賓方

治證同前

井鹽 一兩　無心艸　乾姜 已上各二兩

鈎莕根 三兩

右為細末，每用乾糝之，或唾調少許，塗在膏上，紝

貼之。

截疳散

治年深疳瘻瘡大効

蜜陀僧　白歛　白芨

黄丹 已上各一兩　黄連 五錢　輕粉 一錢

腦子　麝香 已上各五分

右前四味為細末，後四味另研極細，和勻為散，每

用或糝或紝瘡口中，以膏貼之。

抵聖散

治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻瘷瘡瘍骨疽

疳瘻等瘡

白礬灰 一兩　烏魚骨 三錢　乳香 一錢

乾胭脂　輕粉 已上各一錢　麝香 五分

右為細末，或糝或紝，以膏貼之，如有耳膿者，用

字紝耳中。

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快者及多年疳瘻瘡愈而復發

白丁香　銅青　硇砂

粉霜　輕粉 已上各五分　麝香

龍腦 已上各一字

右為細末，麪糊為丸，撚作錠子，每用紝入瘡口中。

膿水出快。

白龍散

主生肌止痛及耳中卒然大痛

寒水石四兩燒半白研　烏賊魚骨研　滑石已上各一兩研

鵬砂三錢　輕粉一錢

右爲細末每用乾摻耳中痛者油調如糊滴紅於耳中痛立止。

桃紅散

主斂瘡生肌肉定血辟風邪。

滑石四兩　寒水石燒二兩　小豆粉一兩

乳香　輕粉已上各二錢

右爲細末每用乾摻血不止者和燈艸貼瘡口上。以帛封之。

檳榔散

治久患惡瘡肌肉遲生

木香　黄連　檳榔已上各等分

右爲細末每用乾摻之。

金黄散出九籥衛生方

主消腫散毒生肌止痛。

黄連　大黄　黄芪

黄芩　黄蘗　鬱金已上各一兩

甘艸五錢　龍腦伍分另研

右爲細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新水調掃赤上或蜜水調如稀糊用小紙花子貼之或小油調掃如久不差熱毒瘡赤乾摻或水調塗亦佳。

生肌散

主斂瘡大効。

寒水石燒　滑石已上各二兩　龍骨

烏魚骨已上各一兩　蜜陀僧　枯白礬

乾胭脂　定粉已上各伍錢

右爲細末用藥乾摻瘡口上。

水澄膏

治熱毒腫痛大効。

大黄　黄蘗　鬱金

天南星　白芨　朴硝

黄蜀葵花已上各一兩

右爲細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石 生用 石膏 生用已上各四兩 黃蘗

甘草 已上各一兩

右爲細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花子小貼亦妙涼水潤之

金露散 出普濟生氣方

治時氣熱毒

寒水石 生用一兩五錢 黃蘗 一兩 白芨

白斂 雄黃 已上各二錢五分

右爲細末無根水調以紙花子貼或掃亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石 一斤 黃蘗 二兩 黃丹 一兩

乳香 五錢 輕粉 三錢

右爲細末每用乾糝或燒湯及下注臁瘡風濕疥癬等瘡油調塗之

外科精義卷之三 終

外科精義卷之四

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

大檳榔散 戍子王方

治乾濕疥癬

硫黃　黑狗脊已上各五錢　輕粉一錢

紅娘子　大檳榔已上各一箇

右爲細末每用藥末半錢於手掌中臨卧時油調如糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用甚者不過三上必驗

天麻散

治白禿甜瘡及風毒疥癬

藜蘆　天麻　狼毒

白芷　茴艸　釣芩根

艸烏頭　管仲　細辛已上各五錢

雄黃二錢　輕粉一錢

右爲細末每用藥半兩紙一重綿裹油三兩浸三日外蘸指擦患處如稍乾添油一兩添至三兩換藥其効如神

決効散

治風痒頭瘡

管仲三兩　白芷一兩

右爲細末油調塗之

水銀膏

治瘑瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸淫多汁久而虫生塗之神効

蔄茹剉　黃蠟已上各一兩　黃連剉

蛇牀微炒　白礬枯　水銀已上各二兩

右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去柤再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不斂者

密陀僧　花蘂石二味同煆赤色　白龍骨已上各一兩

黃丹　乳香研　黃連已上各二錢五分

輕粉一錢

右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾摻
之

神黃散

治一切熱腫攻焮疼痛

黃藥末一斤 黃丹二兩炒紫色 雄黃一兩另研

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍
乾以蜜水潤之

博金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬與蜜陀僧同為末相和於沙鍋內火上炮汁盡 蜜陀僧五錢已上各

白堊二錢 黃丹 輕粉一錢已上各

乳香五分 麝香一分

右為細末先須另用槐枝葱白鹽甘草煎湯淋溻
洗一二時渹乾摻上項藥每用藥先須洗浴然後
摻藥甚者三五次差

金傷散

治刀鎌斧傷辟風止痛生肌

白及三兩 陳石灰風化 桑白皮

黃丹二兩已上各 白附子 天南星

龍骨一兩已上各

右為細末每用乾貼之

完肌散

治證同前

蜜陀僧 桑白皮新者 龍骨四兩已上各

陳石灰二兩 黃丹五錢 麝香一錢另研

右為細末每用乾貼之

定血散

治證同前

黃丹一兩 烏魚骨 白礬灰

龍骨二兩已上各 蜜陀僧半斤 桑白皮一斤

右為細末每用乾摻定血如神

碧霞錠子 太醫陳官實方

治惡瘡透不覺疼痛

銅碌一兩 硇砂二錢 蟾酥一錢

右為細末蕎麥飯一處搽勻撚作錠子麪米樣每
用針刺之不覺痛者但有血出絍一錠子在內以

膏貼之或作散以紙撚蘸紝之亦可臨證看如何

宜合用度

漏蘆湯

治婦人吹奶初覺

漏蘆　練實　大黃

黃芩　芍藥　甘艸已上各五錢

右爲麁末每服三錢水一盞半燈艸三十莖同煎

至一盞去柤温服無時

玉粉散 出蘇沈良方

治陰瘡浸淫不止

白礬灰　定粉已上各等分

右研細末先洗浴淨淹乾敷糝之

香礬散

治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中

枯礬五錢　龍骨　黃丹已上各一錢

麝香少許研

右爲細末每用乾糝之

紫金散

治瘰癧久不差者

枯礬五錢　砒霜一錢　石膽五分

右爲細末入黃丹二錢每用紝入瘡口內以膏貼

之如未破者灸一兩炷用津唾旋調一豆許安瘡

上以膏貼之去根自平復

通耳丹 盧全寶傳

治耳聾

桑螵蛸　安息香　阿魏已上各一錢五分

硃砂五分　草麻子仁　大蒜

巴豆仁已上各七箇

右爲細末入二仁與蒜同研爛爲丸如棗核大每

用一丸綿裹內耳中如覺微痛即取出親驗方

菖蒲錠子 一名菖蒲散

治耳中卒痛

菖蒲　附子炮去皮臍已上各二兩

右爲細末每用油調滴耳內立效

寸金錠子 太醫成子寶方

治瘰癧疾

藤黃 雄黃 雌黃

硫黃 輕粉 粉霜

麝香 砒霜 黃丹已上各一錢

牡蠣粉 紅藤根 乾漆已上各五錢

右為細末研勻燒陳米飯和擣為丸如棗核大每用一丸內肛門中深二寸許放定令用新磚毬子二箇炭火燒赤釅醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也

薰痔散

威靈仙三兩

右用水一斗半煎至七分入瓶去火就盆上坐令氣薰之候通手淋洗冷即再暖

通靈丸

治耳聾

松脂五錢 巴豆二十四箇去皮研

右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿裹一丸塞耳中覺痛取出赤水為効

三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比氷霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔治之故不同也

枳殼炒去穰 皂角燒存性 五倍子已上各等分

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三二十丸溫水食前服養生必効方中三味皆單用一味為方今増為一方其効如神

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草炙二兩 藿香葉 石膏水飛

山梔子仁已上各一兩

右為細末每服一錢新汲水調下

平和飲子出顱顖經中

治小兒瘡疹

人參 白朮 茯苓

甘草 升麻已上各等分

右爲細末每服一二錢水煎去柤溫細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疹煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

玄參丸 出僧居泰傳

治口瘡連年不愈者

天門冬去心 麥門冬去心 玄參已上各等分

右爲細末鍊蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化

犀角散

治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻 桔梗 甘草炙已上各一兩

牛蒡子炒四兩

右爲細末每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分去柤細細熱嗽溫卽嚥之其柤熱搨項腫上

防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注攣急及皮膚瘙痒麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風者

防風一兩 藁本 羌活

地骨皮 荊芥穗已上各五錢

右爲細末每服三錢溫酒調下

烏金散

治痈瘻惡瘡

麝香 蟾酥已上各一字 粉霜

硇砂 輕粉已上各一錢 銅綠

砒霜 白乾姜 艸烏頭

天南星 舶上硫黃已上各五錢

右爲細末紙撚紝之或湯浸蒸餅和爲錠子紝瘡口內上以膏貼之

○劉守眞瘡論

素問云痛痒瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核怫鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰近于火氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也爲風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候于皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘脾氣溫而內熱卽生瘡也腫者由寒熱毒氣客于經絡使血澀而不通壅結成腫風邪不

作即無頭無根寒血相搏作者即有頭有根壅盛則爲膿赤根腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則爲實痒則爲虛非虛爲寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火漬之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散怫熱內作故也瘡瘍皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲污水

也潰而腐爛者木之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也痛氣赤瘤丹熛熱勝氣火之色也

没藥膏

治一切癰疽發背瘡癤傷折蹋跌壞膿生肌止痛又貼灸瘡極妙

麒麟竭　明乳香　没藥已上各一分研

當歸去蘆　木鱉子仁研　杏仁已上各五錢

油頭髮二兩　黃丹六兩

右先用油一斤石器內或沙鍋內露天底鍊油令熟先下木鱉子當歸杏子頭髮慢火熬黃焦油耗五分離火用綿濾粗不用再入鍋下黃丹以新柳篦子十條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬軟得所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以盆合一宿出火毒用時或帛上或紙上攤一日一換

必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂二錢五分　輕粉一錢　麝香五分

斑猫四十箇去頭翅　巴豆五箇去皮心膜　白檳榔一箇

右同研極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在雞子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人每服半錢實人每服一錢並用炒生姜酒下五更初服藥至平明取下惡物如覺小腹內疼痛便用糯麻子燒灰入没藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸其取下惡物如爛肉老鼠兒及

新成卵內雀兒是藥効婦人有胎不可服

烏金散

治癰癤腫硬無頭不變色者

米粉四兩　葱白一兩細切

右同炒黑色杵爲細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次消爲度

救聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫

苦葶藶不以多少于火上隔紙炒過

右杵爲細末棗肉爲丸如小豆大每服十丸煎麻子湯下食前日進三服五七日小便多腫消爲効如喘嗽煎桑白皮湯下忌生冷醋滑物及鹽須另丸一等小丸兒與小兒服看大小加減與服煎棗肉湯下

應効散

治氣瘻疳瘡多年不効者

地骨皮不以多少冬月自取只要皮陰乾

右杵爲細末每用紙撚蘸紝瘡口內頻用自然生肉更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散

白金散

治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黄水出者

桂府滑石

右爲細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二椀水煎上項三味至一椀去柤微熱淋洗瘡水冷拭乾上糝滑石末令遍便睡至明次愈

如聖散

治渾身瘙痒抓之成瘡及癮疹之類

蠶沙一升

右用水二斗煎至一斗濾去柤夜卧避風處淋洗水冷即拭乾便睡

天蛾散

治刀斧傷止血定痛生肌

晚蠶蛾不拘多少

右爲細末每用藥貼於瘡口上用綿裹不須再動一上便可

必効散

治蜘蛛咬著疼痛

鹽豉 炒乾

右爲細末每用油調塗之必効

蛤粉散

治湯火燒燙瘡

蛤蠣 燒赤放冷

右研如粉每用油調塗之日三次

治小兒丹瘤

木鱉子 新者去殼

右研如泥淡醋調傳之一日三五次便効

治小兒瘡口瘡

天南星 一箇去皮

右爲末好醋調攤在紙上男左女右貼在脚心底

以帛繫定三日外取了以温水洗盡脚下藥

治破傷風并洗頭風藥

麻黄 去節一錢　蝎梢 二錢五分　蠻姜

川烏頭　黑附子 炮去皮　白附子

天麻　烏稍蛇 酒浸二日去骨火上炙黄色

川芎 已上各五錢

右爲細末每服一錢熱酒調下日進三五服重者

三五日必効此證不宜早治但邪氣入臟則難治

治有四死證不可治一頭面青黑色二額上有汗

珠不流三眼小目睛四身上汗出如油

烏龍丸

治遍身風瘡痂疥瘍癬等疾服之消風散熱利膈

化痰壅治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢治證

甚多要能用度

皂角 肥者不以多少炙刮去皮弦搥碎用水挼取濃汁去粗銀石器内熬成膏另放

黑牽牛 不以多少微炒令香熟碾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五

十丸氣虚者一二十丸食後温水送下無病氣實

人一兩箇月頓一服取利三五行不傷正氣身體

輕健肌膚光澤永無風癈疥癬之疾

紫參丸

治熱毒瘰癧腫毒未成者内消已潰者行膿止痛

散腫毒

麝香另研　膩粉已上各三錢　紫參

苦參炒已上各一兩　丹參一兩五錢　連翹二兩

滑石二兩五錢

右爲末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日揉取汁去柤用皂角子三百箇煨熟爲末用玄參酒熬皂角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一丸以黃芪湯下一日加一丸至患人歲數即住如門下則二十每日減一丸其瘡自乾已結者內消也服此藥大有神効

萬靈丸

治背脇疽并一切惡瘡初覺一二日

硃砂　血竭　蓮蘂已上各等分

麝香少許

右爲細末酒糊爲丸如黃米大每服七丸溫酒送下瘡在上食後在下食前不過二服即効

治眼

治昏澀退翳膜

川椒四兩去子合者不用　熟乾地黃二兩酒浸九蒸九曝

甘菊花二兩五錢

右爲細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸食後細嚼新折米十餘粒送下

治吹妳方田仲寬方

治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効

生姜一兩去皮　大黃　甘草已上各五錢

瓜蔞一箇去皮

右共搗作一塊以水半椀同煎至七分濾去柤入沒藥乳香末共二錢半通作一服

治痔瘡

雄黃五分細研　五靈脂去石塊退顏翳　五倍子炒已上各一錢

沒藥二錢五分明淨者　白礬半生半枯

右爲細末研令極細用紙花子貼瘡口上

洗痔

防風　當歸　川芎已上各等分

右三味剉細煎水去柤令熱溫淋洗瘡用衣帛印乾傅前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如口噤但斡開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香 一分　南乳香　烏金石

輕粉　雄黃　狗寶

沒藥 已上各一錢　蟾酥 二錢　粉霜

黃蠟 已上各三錢　硇砂 五錢　鯉魚膽 乾用

狗膽 已上各一箇乾用　金頭蜈蚣 七條全者酥炙黃色

頭首兒孩兒乳一合

右件爲末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菉豆大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加三丸白丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出爲度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立效服藥後喫白粥淡虀就服大妙

牙痛藥 此藥是京兆惠民局見行經驗方

治大人小兒

揀信　青黛　輕粉 已上各一錢

麝香 五分

右同爲細末用小油調薄攤紙上用木槌槌實收起每用臨卧以漿水洗淨印乾可磨口大小以藥紙封之至曉去藥紙嗽淨勿令嚥下大者不過三上必効

廻瘡蟾酥錠子 馬雲卿親傳經驗方

治丁瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之獨活三四次瘡初發無有不効大抵丁瘡生于四肢及胸背頭項骨節間唯胸背頭項最惡初生痛痒不常中陷如丁蓋抵之有根壯熱惡心是也

天南星　款冬花　巴豆仁

黃丹　白信 已上各一錢　獨活 五分

斑猫十箇去頭足
右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大撚作錠子每遇丁瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處逐奪刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅之膿出自差
用錠子法先以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

乳香托裏散 同前所傳
治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疎利後服之大效
御米殼去隔蒂蜜炒三兩　當歸
芍藥　川芎已上各五錢　没藥
乳香已上各一錢
右為麄末每服五錢水一盞半煎至七分去柤溫服病在上者食後在下者食前若未止即再服
回聖旋丁散 各醫秘傳經驗方
治丁瘡生于四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根
巴豆仁五分　白殭蠶　輕粉
硇砂已上各二錢五分
右為細末醋調用之
天丁散 同前秘傳經驗方
治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之急服托裏內消
山丹花蕊　香白芷已上各二錢　牛蒡根春採去皮

天丁乃皂角刺　蒼耳芽　大力子已上各五錢
雄黄一兩
右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之丁瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可
萬應膏 同前所傳
治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏可腫痕貼之煎葱白水熱淋兩炊時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂聚膿洪然早差
黄藥　芍藥　白芷

黃芪　木鱉仁　杏仁
當歸　白芨　生地黃
官桂　玄參去皮剉碎　沒藥
乳香已上各五錢研　白歛　黃蠟已上各一兩
黃芩　大黃已上各二兩　黃丹一斤
芝麻油二斤半

右件十四味，入油內浸一宿，絕早入沙鍋慢火熬，用生柳條攪至申時，以焦褐色出火去粗粗，又以重綿濾過，入丹再熬，旋滴水中成珠子不散者，出火絕烟，入乳香沒藥黃蠟攪勻，用甆器收貯，於土內埋七日，取出攤用。

治小兒面湮瘡

係云錬銀瘡者，是母受胎之日食酸辣及邪味過度，多生此瘡。

百藥煎五錢　生白礬二錢

右為細末，小油調旋搽之，神效。

治赤白口瘡

大人飢渴不睦，小兒失驚，即生口瘡。

生白礬一錢

右噙嗽之，從涎頑涎立效。

治乾濕疥癬

此是肺受邪毒，運於四肢，久而不散，以生肉蟲。

硫黃一兩　生白礬八錢

右為細末，油調火炙，抓破塗之，立效。

治湯火燒燙

無問新舊。

青槐枝一兩剉碎　菉豆粉一兩炒黃色　輕粉一錢

右同為細末，油調塗之，止痛滅毒。

治破傷風

手足顫掉不已者。

硃砂另研　南星姜製　獨活去皮已上各二錢
人手足指甲六錢燒絕烟

右為細末，分作三服，酒調服之，立效。

治破傷

無問新舊

石灰

右用一味驗瘡口大小儘乾塗之不須封裹神効

治風狗咬破傷風

此病非爲小可及九死一生之病可急用

好斑猫七箇去翅足

右爲細末酒調服之於小便盆內見衣沫似狗形者爲効如無再服七次雖無狗形亦不再發也此方累試經驗今附于此

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病主治在乎藥製用在乎人三者不可闕一也凡用一味炮炙修製及單方主療該引方書出處不必隨方標寫

硃砂

須研細水飛濾乾若入膏中者待熬膏成稍凝冷即下急攪勿令沉聚大凡石類一一如此

雲母

即須用鍊成熟粉曾經婦人手拈者不効聖惠方

治湯火瘡羊髓和膏塗之神良千金方如治金瘡及諸惡瘡依上塗傳大効

礬石 即白礬

凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕惡瘡去鼻中瘜肉生含嚥津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿水者以筒吹一字於耳中以綿塞之立効又治諸毒蛇惡獸咬傷傳之則差千金方以醋煑湯漬蝎螫立差王氏博濟治驢馬汗毒傷人瘡腫痛和黃丹傅之靈苑方治傷折瘡腫以沸湯投枯礬

潰浴之。御藥院方治陰汗。以枯礬投沸湯中浴之

水銀

主疥瘻痂瘍白禿入膏。令膏冷凝下之。攪令勻散如星。勿令沉聚。

水銀粉 即輕粉

主瘰癧殺疥癬蟲。酒皶風。以牟髓和如膏塗。及貼臁瘡。一上可。

石灰

主疥癬骨疽金瘡。風化者良。外臺秘要方治風瘙

以漿水調塗掃之。隨手差。孫真人治疥。淋石灰水温洗之。千年者尤佳。

白麥飯石 即麄理黃石

曾磨刀者佳。凡用須醶醋淬之。令屑落醋中者良

亦單用治發背。神良。本草曰。大凡石類多主癰疽

花蘂石

主金瘡。止血。合硫黄木炭火炒良。或只刮花蘂石末効

黄芪

主癰疽久敗瘡。排膿止痛。兼五痔鼠瘻止渴。聖惠

千金外臺秘要方治發背腦疽托裏。止瀉用黄芪六兩甘草一兩剉細。水煎温服無時。大効。

蒼耳 即蒼耳

千金翼方丁腫。用根莖葉。炒灰存性爲末。醋泔淀和如泥。塗之。一日三易之。三日腫消根丁自拔出。

亦治諸腫。掃之尋差。

麻黄

凡用根節煮三沸。掠去沫。曬乾剉。

黄芩

凡用去腐蘆揀細實者佳。梅師方治諸丹作末。水調掃之。亦治湯火瘡

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍。

半夏

凡用湯洗七次去滑。

羊蹄根

主乾癬疥。頭禿取根。醋塗之効。簡要濟衆方治癬

瘡久不差取新者絞汁和膩粉如膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之皆愈。

狼毒

主癬疽惡瘡鼠瘻。聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出痒痛以末傅之或猪膏和塗差。

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之

土青木香 即馬兜苓根

主頭風搔痒禿瘡

連翹

主寒熱鼠瘻瘰癧疽惡瘡癭瘤同甘草服食

蒲公草

主乳癰煑汁飲之自消搽師方傅之亦消。

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良。

白石英

主肺癰吐膿咳嗽及膈上風熱痰肺痿消渴陰痿。

補五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢。加芎末等分粥飲調服一錢重神効寒者加乾姜服。

白石脂

治癬疽排膿生肌新生兒臍濕

雄黃

主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥癬

硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺蟲。

雌黃

主惡瘡疥頭禿下部䘌瘡殺蟲。

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核喉痛

蜜陀僧

主金瘡止血卩瘡疥瘻面上瘢䵟

伏龍肝

糁主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令内消
礬石
主寒熱鼠瘻惡瘡蝕死肌
姜石
搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰
麁理黃石 堪作礪者即磨刀麁石
療馬齣明治楊遵彥發背取此石猛火煅赤投釅醋中因有屑落取為末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭多主癰疽

爐甘石
主愈瘡止血治目赤瘡
燈心
主破傷血出每用貼破上封之立差
槐根皮
主痔及白皮煎湯薰洗良入荊芥尤妙
地骨皮
主疽瘡經年以麁皮煎湯洗之細沫白穰別礙糁之即差

黃蘗
主瘡腫神良每用去麁皮塗蜜炙剉治方用作湯漬陰瘡良搗末蜜水調敷腫
枳殼
凡用須麩炒去穰剉枳實亦同
厚朴
凡用須去麁皮生姜塗製炙微焦剉
皂角
凡用須不蛀者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鱉子
凡用去殼主惡瘡毒腫痔用和方治痔用仁三五枚研如泥以沸湯浸用汗先薰但通手即浴洗日三度
楸樹白皮
單用熬膏貼癰疽惡瘡痛瘻痔疾用其白馬牙燒灰治發背初生用糁瘡頭以膏封之
兔頭
連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背

惡瘡 出百一方

兎腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水掃之後用兎白毛貼之毛落平復勝金方治痔用坑月砂卽兎糞也和乳香末酒調三錢溫服日三服卽差

蜜

凡鍊須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘草末塗之神效附後方單用塗湯火瘡

牡蠣

凡用木炭灰炒通赤濕地上放經宿方用經驗方治瘰癧用牡蠣四兩玄參三兩爲末糊丸如梧桐子大酒服三五十丸食後服藥盡患亦除根集驗方治一切癰腫水調牡蠣粉掃之乾卽再掃卽消名拔毒散初虞世治瘰癧用和甘艸末茶調三錢服之神効大驗

蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不較者全用炒存性猪膏和塗之其驗神效

蜘蛛

聖惠治瘰癧不問新舊或成瘡者曬乾爲末酥和如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠瘻神良譚氏治贅瘤疣目以網絲作線繫根繫之一宿自落

螔頭

聖惠治一切惡瘡端午日收乾爲末者油調傅之神効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞汁傅其上大効古今諸方治丁瘡欲灸者取螔頭心腹下度取之稍白者是以針刺丁瘡當心灸四畔以心塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌食羊肉多不効

陳橘皮

凡用溫水浸去白青橘皮亦然

枇杷葉

主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一兩者

桃杏仁

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研。

無心草

凡用去蘆苗煎洗甲瘡痂神効。

防風

凡用去叉蘆。

藜蘆

凡用去苗

犀角

凡用生不曾見火者即鎊錯為末

茯苓

凡用去麄皮白者佳。

芍藥

亦用白者佳。

牽牛子

凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩。

外科精義卷之四　終

溯洄集二卷

（元）王履撰

明刻東垣十書本

醫經溯洄集二卷 浙江汪啟淑家藏本

元王履撰。履字安道，崑山人。學醫於金華朱震亨，盡得其術。至明初始卒。故明史載入方技傳中。其實乃元人也。嘗以傷寒論中陽明篇無目痛，少陰篇言胸背滿不言痛，太陰篇無嗌乾，厥陰篇無囊縮，必有脫簡。乃取三百九十七法，去其重複者二百三十八條，復增益之，仍為三百九十七法。因極論內外傷經旨異同，併中風中暑之辨，撰為此書。凡二十一篇。其間闡發明切者，如亢則害，承乃制，及四氣所傷，皆前人所未及。他若溫病熱病之分，三陰寒熱之辨，以及瀉南補北諸論，尤確有所見。又以素問云傷寒為病熱，言常不言變，至仲景始分寒熱，然義猶未盡。乃備列常與變，作傷寒立法考一篇。李濂醫史有履補傳，載其著書始末甚詳。觀其歷數諸家，俱不免有微詞，而內傷餘議兼及東垣，可謂少可而多否者。然其會通研究，洞見本原，於醫道中實能貫徹源流，非漫為大言以夸世也。

溽洄集敘

我邑安道先生博學有文精於醫自謂萬物皆備於我非天地不能以備萬物萬物備我者易也易在我天地亦在我況萬物乎於是作小易賦論仲景傷寒爲立灋之祖後人雖變易無窮終莫能越其矩度夫素問謂人傷於寒爲病熱者言常而不言變仲景

謂或寒或熱而不一者備常與變而弗遺也因作傷寒立法考又謂六經病證陽明篇少陽篇太陰篇厥陰篇有脫簡以三百九十法內除重復者與無方治者止以有方治而不重復者計之得二百三十八條作傷寒三百九十七法辨論內外傷經旨異同中風中暑辨議目曰溽洄集總

一卷標題原病式一卷百病鈎玄二十卷醫韵統一百卷大約從浩翰古說中歛博為約、究理斷義、論證辨脈、一以虛實為據、是非為主、疑佀為

驗、要衡直以天地、萬物為一體者乎、有天地萬物一體之心而後有是政而仁覆天下見安道濟世利物之心度越人遠甚以是心而致之政古

今聖哲所以求康保天下者不外乎此豈惟玉峯人賴之天下賴之直萬禩賴之矣謹叙

廸功郎楚府良醫副同邑葛

哲書





溯洄集目錄

卷之一

神農嘗百草論

亢則害承乃制論

四氣所傷論

張仲景傷寒立法考

傷寒溫病熱病說

傷寒三陰病或寒或熱辨

陽虛陰盛陽盛陰虛論

卷之二

傷寒三百九十七法辨

傷寒四逆厥辨

嘔吐噦乾嘔欬逆辨

中風辨

中暑中熱辨

積熱沉寒論

瀉南方補北方論

五鬱論

二陽病論

煎厥論

八味丸論

小便原委論

內傷餘議

外傷內傷所受經旨異同論

目錄終

溯洄集卷之一

元　崑山　魏博王　履安道甫著

明　餘杭　節菴陶　華尚文甫較

神農嘗百草論

淮南子云神農嘗百草一日七十毒予嘗誦其書每至於此未始不歎夫孟子所謂盡信書則不如無書夫神農立極之大聖也閔生民之不能以無疾故察夫物性之可以愈疾者以貽後人固不待乎物物必嘗而始知也苟待乎物物必嘗而始知則不足謂之生知之聖也以生知之聖言之則雖不嘗亦可知也

設使其所知果有待乎必嘗則愈疾之功非疾不能以知之其神農衆疾俱備而歷試之乎況污穢之藥不可嘗者其亦嘗乎且味固可以嘗而知其氣其性其行經主治及畏惡反忌之類亦可以嘗而知乎苟嘗其所可嘗而不嘗其所不可嘗不可嘗者既可知而可嘗者亦不必待乎嘗之而後知矣謂其不嘗不可也謂其悉嘗亦不可也然經於諸藥名下不著氣性等字獨以味字冠之者由藥入口惟味為先故也又藥中雖有玉石蟲獸之類其至衆者惟草為然故遂曰嘗百草耳豈獨嘗草哉夫物之有毒嘗而毒焉有矣豈中毒者日必七十乎設以其七十毒偶見於一日而記之則毒之小也固不死而可解毒之大也則死矣孰能解之亦孰能復生之乎先正謂淮南之書多寓言夫豈不信

亢則害承廼制論

予讀內經六微旨論至于亢則害承廼制喟然歎曰至矣哉其造化之樞紐乎王太僕發之於前劉河間

闡之於後聖人之蘊殆靡遺矣然學者尚不能釋然得不猶有未悉之旨也歟謹按內經帝曰願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐伯曰亢則害承廼制制生則化外列盛

爲害則敗亂生化大病嘗觀夫陰陽五行之在天地間也高者抑之下者舉之强者折之弱者濟之蓋莫或使然而自不能不然也不如是則高者愈高下者愈下强者愈强弱者愈弱而乖亂之政日以極矣天地其能位乎歟然高也下也弱與强也亦莫或使然而自不能不然也故易也者造化之不可常也惟其不可常故神化莫能以測莫測故不息也可常則息矣亢則害承廼制者其莫或使然而自不能不然者歟夫太僕河間已發揮者兹不贅及其未悉之旨請

推而陳之夫自顯明之右止君火治之十五句言六節所治之位也自相火之下止陰精承之十二句言地理之應乎歲氣也亢則害承廼制二句言抑其過也制生則化止生化大病四句言有制之常與無制之變也承猶隨也然不言隨而曰承者以下言之則有上奉之象故曰承雖謂之承而有防之之義存焉亢者過極也害者害物也制者克勝之也然所承也其不亢則隨之而已故雖承而不見既亢則克勝以平之承斯見矣然而迎之不知其所來迹之不知其所止固若有不可必者然可必者常存乎杳冥恍惚之中而莫之或欺也河間曰已亢過極則反似勝已之化似也者其可以形質求哉故後篇厥陰所至爲風生終爲肅少陰所至爲熱生終爲寒之類其爲風生爲熱生者亢也其爲肅爲寒者制也又水發而爲雹雪土發而飄驟之類其水發土發者亢也其雹雪飄驟者制也若然者蓋造化之常不能以無亢亦不能以無制焉耳夫前後二篇所主雖有歲氣運氣之殊然亢則害承廼制之道蓋無往而不然也惟其無

往而不然故求之於人則五臟更相平也一臟不平所不勝平之五臟更相平非不亢而防之乎一臟不平所不勝平之非既亢而克勝之乎姑以心火而言其不亢則腎水雖心火之所畏亦不過防之而已一或有亢卽起而克勝之矣餘臟皆然制生則化當作制則生化蓋傳寫之誤而釋之讀之者不覺求之不通遂併遺四句而弗取殊不知上二句止言亢而害害而制耳此四句乃害與制之外之餘意也苟或遺之則無以見經旨之周悉矣制則生化正與下文害

則敗亂相對待理假順不勞曲說而自通制則生化者言有所制則大氣不至於亢而爲平平則萬物生生而變化無窮矣化爲生之盛故生先於化也外列盛衰者言六氣分布主治迭爲盛衰昭然可見故曰外列害則敗亂生化大病者言既亢爲害而無所制則敗壞乖亂之政行矣敗壞乖亂之政行則其變極矣其災甚矣萬物其有不病者乎生化指所生所化者言謂萬物也以變極而災甚故曰大病上生化以造化之用言下生化以萬物言以人論之制則生化

猶元氣周流滋營一身凡五臟六腑四肢百骸九竅皆藉焉以爲動靜云爲之主生化大病猶邪氣恣橫正氣耗散凡五臟六腑四肢百骸九竅舉不能遂其造用之常也或以害爲自害或以承爲承襲或以生爲自無而有化爲自有而無或以二生化爲一意或以大病爲喻造化之機息此數者皆非也且夫人之氣也固亦有亢而自制者苟亢而不能自制則湯液鍼石導引之法以爲之助若天地之氣其亢而自制者固復於平亢而不制者其孰助哉雖然造化之道苟變至於極則亦終必自反而復其常矣學者能本之太僕河間而參之此論則造化樞紐之詳亦庶矣乎然張戴人治法心要則曰假令水爲母木爲子當春旺之時冬令猶在即水亢也水亢極則木令不至矣木者繼冬而承水也水既亢則害其所承矣所以木無權也木無權則無以制土土既旺則水乃受制也土者繼長夏之令也水受土制熱克其寒也變而爲濕此其權也又如火爲母土爲子當長夏之時暄令猶在即火亢也火既亢極則濕令不至矣濕者繼

夏而承火也火既亢則害其所承矣所以濕無權也濕無權則無以制水水既旺則火乃受制也水者嚴冬之令也火受水制寒克其熱也變而爲土濕土斯得其權也斯言也推之愈詳而違經愈遠矣或曰心要者他人成之蓋得於所聞之誤耳

四氣所傷論

素問生氣通天論篇曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥冬傷於寒春必病温陰陽應象論篇曰春傷於風

夏生飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬生欬嗽冬傷於寒春必病溫王啓玄註云風中於表則內應於肝肝氣乘脾故洞泄或飧泄夏暑巳甚秋熱復收兩熱相攻則爲痎瘧秋濕旣勝冬水復旺水濕相得肺氣又衰故乘肺而爲欬嗽其發爲痿厥者蓋濕氣內攻於臟腑則欬逆外散於筋脈則痿弱也厥謂逆氣也冬寒且凝春陽氣發寒不爲釋陽怫於中寒怫相持故爲溫病傷寒論引素問後篇八句成無巳註云當春之時風氣大行春傷於風風氣通於肝肝以

春適旺風雖入之不能卽發至夏肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能外發故攻內而爲飧泄當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於肺肺以秋適旺濕雖入之不能卽發至冬肺衰然後濕始動也雨淫腹疾則當發爲下利冬以陽氣內固濕氣不能下行故上逆而爲欬嗽當夏之時暑氣大行夏傷於暑夏以陰爲主內暑雖入之勢未能動及秋陰出而陽爲內主然後暑動摶陰而爲痎瘧當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽爲主內寒

雖入之勢未能動及春陽出而陰爲內主然後寒動摶陽而爲溫病王海藏曰木在時爲春在人爲肝在天爲風當春之時發爲溫令反爲寒折是三春之月行三冬之令也以是知水太過矣水旣太過金肅愈嚴是所勝者乘之而妄行也所勝者乘之則木虛明矣木氣旣虛火令不及是所生者受病也故所不勝者侮之是以土來木之分變而爲飧泄也所以病發於夏者以木絕於夏而土旺於夏濕本有下行之體故也不病於春者以春時風雖有傷木實當權故無

暑者季夏也季夏者濕土也君火相從不與之干暑爲之令不行也濕令不行肝土虧矣所勝妄行木氣太過少陽旺也所以有受病則病愈不痊所不勝者侮之故水得以來土之分土者坤也坤在申之分申爲相火水入於土則水火相干水火相干則陰陽交爭故爲寒熱兼木氣終見三焦是少陽相火合也少陽在濕土之分故爲寒熱肺金不足灑淅寒熱此皆往來未定之氣也故爲痎瘧不發於夏而發於秋者以濕熱在酉之分方得其權故也秋者清肅之氣收斂

下行之體也爲濕所傷是長夏之氣不與秋令也秋令不及所勝妄行故火得以炎上而克金心火既刑於肺故肺氣逆而爲欬所不勝者侮之木氣上行與火同德動而不息者也所生者受病故腎水虧也長夏巳亢三焦之氣盛也命門者三焦之合也故迫腎水上行與脾土濕熱相合爲痰因欬而動於脾之濕是以欬嗽有聲有痰不發於秋而發於冬者以其六陰之極肅殺始得其氣故也冬傷於寒者是冬行春令也當寒而溫火勝而水虧矣水既巳虧則所勝妄行土有餘也所生受病木不足也所不勝者侮之火太過也火土合德濕熱相助故爲溫病不病於冬而病於春者以其寒水居卯之分方得其權大寒之令復行於春腠理開泄少陰不藏房室勞傷辛苦之人陽氣泄於外腎水虧於內當春之月時强木長無以滋生化之原故爲溫病耳夫春傷於風夏傷於暑冬傷於寒辭理皆順時字傷令字也獨秋傷於濕說作令字傷時字讀者不可疑也此四說皆母所亢而害其所承之子也若說秋字傷濕字其文與上三句相

通其理與法不得相通矣大抵理與法通不必拘於文也或謂春傷於風是人爲風所傷非也若是則止當頭痛惡風自汗何以言夏爲飧泄哉今言春傷於風即是時傷令也明矣愚按此四傷諸家註釋皆不得經旨者蓋由推求太過故也孟子曰道在邇而求諸遠事皆易而求諸難此之謂歟但只輕輕平易說去則經旨自明而無穿鑿之患矣何以言之夫風暑濕寒者天地之四氣也其傷於人人豈能於未發病之前預知其客於何經絡何臟腑何部分而成何病乎及其既發病然後可以診候始知其客於某經絡某臟腑某部分成某病耳註釋者苟悞因病始知其原之理則於此四傷不勞餘力自迎刃而解矣夫洞泄也痎瘧也欬與痿厥也溫病也皆是因其發動之時形診昭著乃逆推之而知其昔日致病之原爲傷風傷暑傷濕傷寒耳非是初受傷之時能預定其今日必爲此病也且夫傷於四氣有當時發病者有過時發病者有久而後發病者有過時之久自消散而不成病者何哉蓋由邪氣之傳變聚散不常及正氣

之虛實不等故也且以傷風言之其當時而發則為惡風發熱頭疼自汗欬嗽喘促等病其過時與久而發則為癘風熱中寒中偏枯五臟之風等病是則洞泄飧泄者乃過時而發之中之一病耳因洞泄飧泄之病生以形診推之則知其為春傷風藏蓄不散而致此也苟洞泄飧泄之病未生孰能知其已傷風於前將發病於後邪假如過時之久自消散而不成病者人亦能知乎世有太素脈法雖或預知死亡之期然亦是因診之昭著而始能知耳夏傷暑為痎瘧冬

傷寒為溫病意亦類此但秋傷濕上逆為欬嗽為痿厥其因病知原則與三者同其令行於時則與三者異夫春之風夏之暑冬之寒皆是本時之令也濕乃長夏之令何於秋言之蓋春夏冬每一時各有三月故其令亦各就其本時而行也若長夏則寄旺於六月之一月耳秋雖亦有三月然長夏之濕令每侵過於秋而行故曰秋傷於濕秋令為燥然秋之三月前近於長夏其不及則為濕所勝其太過則同於火化其平氣則又不傷人此經所以於傷人止言風暑濕寒而不言燥也或問余曰五運六氣七篇所敘燥之為病甚多何哉余曰運氣七篇與素問諸篇自是兩書作於二人之手其立意各有所主不可混言王冰以為七篇參入素問之中本非素問元文也余今所推之義乃是素問本旨當自作一意看

請陳四氣所傷所病之義夫風者春之令也春感之偶不即發而至夏邪既不散則必為疾其所以為洞泄者風蓋天地浩蕩之氣飛揚鼓舞神速不恒人身有此腸胃之職其能從容傳化泌別而得其常乎故水穀不及分別而併趨下以泄出也其為飧泄亦類此義說者謂春傷風為內通肝洞泄飧泄為木乘土又謂不發於春為邪待木既發於夏為木衰邪動竊謂風既通肝則正當木旺之時木極盛土極衰矣理宜乘旺而即發於春不宜反遲時而發於夏也且夏火司權母能令子何故不發於迨衰極之時而反發於土受病之時乎其說不通難以為據

暑者夏之令也夏感之偶不即發而至秋又傷於風與寒故為痎瘧也寒者冬之令也冬感之偶不即發而至春其身中之陽雖始為寒邪所鬱不得順其漸升之性然亦必欲應時而出故發為溫病也若夫秋傷濕其令行於時之義上文已論之矣前篇所謂上逆而欬發為痿厥不言過時似是當時即發者但既與風暑寒三者並言則此豈得獨為即發者乎然經無明文終亦不敢比同後篇便斷然以為冬發病也雖然濕本長夏之令侵過於秋耳縱使即發亦

近於過時而發者矣。此當只以秋發病爲論。濕從下
受。故於肺爲欬。謂之上逆。夫肺爲諸氣之主。今既有
病。則氣不外運。又濕滯經絡。故四肢痿弱無力。而或
厥冷也。後篇所謂冬生欬嗽。既言過時。則與前篇之
義頗不同矣。夫濕氣久客不散。至冬而寒氣大行。肺
惡寒。而或受傷。故濕氣得以乘虛。上侵於肺。發爲欬
嗽也。觀者以此意求之。經旨其或著乎。或者見素問
於病溫痎瘧等。間以必言之。遂視爲一定不易之辭。
而曰此必然之道。嗟乎。果可必耶。果不可必耶。素問

之或言必。或不言必者。蓋不可膠爲一定故也。往往有泥於必之一字。遂謂冬傷寒。必當病於春。其所傷寒而即病者。反置而不論。若此者。可不謂之棄本逐末乎。
經中每有似乎一定不易之論。而却不可以爲一定
不易者。如曰熱厥因醉飽入房而得。熱中消中者。皆
富貴人也。新沐中風則爲首風。如此之類。豈一一皆
然哉。讀者當活法。勿拘執也。夫王啓玄之註。雖未免
泥於必字。及未得經旨。然却不至太遠也。若成無己
之說。則似太遠矣。然猶未至於甚也。至王海藏立論
則推求過極。欲異於人。殊不知反穿鑿綴緝。乖悖經

旨。有不可勝言者。此先儒所謂如大軍游騎出。太遠
而無所歸矣。姑撫成無己王海藏之說。辯其甚者一
二。夫無己謂風淫末疾。則當發於四肢。雨淫腹疾。則
當發爲下利。竊謂則當二字。決然之辭也。春傷風遇
夏之陽氣外盛。而不能外發。故攻內爲飧泄。此或若
可通矣。經曰木發無時。倘風不傷於春而傷於他時。
不遇夏之陽氣外盛。將外發乎。將內攻乎。况風屬陽。
與夏同氣。果欲外出。則當隨其散越之勢而出。安有
不能之理乎。且風善行數變。其爲病非一。豈獨能爲

四肢之疾乎。所謂雨淫腹疾之義。其不通亦如此。至
若夏傷暑。秋爲痎瘧者。蓋因暑疾藏於皮膚之內。腸
胃之外。復秋感風。故疾作耳。觀素問瘧論可見。其與
夏陰主內。秋陽內主。著動搏陰。何相干哉。冬傷寒。春
爲溫病者。蓋因寒毒中人肌膚。陽受所鬱。至春天地
之陽氣外發。其人身受鬱之陽。亦不能不出。故病作
也。韓祗和謂冬時伏寒鬱陽至春時再有感而後發。余謂此止可論溫病之有惡寒者耳。其不惡寒者。則本不爲再感而後發也。故仲景曰。太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。觀傷寒論。可
見其與冬陽主內。春陰內主。寒動搏陽。何相干哉。乃

若海藏則又以春傷風夏傷暑冬傷寒爲時傷令秋傷濕爲令傷時故於春傷風謂春行冬令而溫爲寒折於夏傷暑謂暑者季夏季夏者濕土君火持權不與子而暑濕令不行於秋傷濕謂秋爲濕所傷是長夏之氣不與秋令於冬傷寒謂冬行春令火勝水虧大寒之令復行於春陽氣外泄腎水內虧者病又謂溫病爲濕熱相助而成又謂四時傷皆母亢而害所承之子吁何支離破碎徒費辭如此乎夫經中所言傷風傷暑之類甚多皆是以人受風暑等所傷爲義未嘗有時傷令令傷時之意也若是海藏所言則經論所謂夏傷於暑秋傷於風與先傷於風後傷於寒等語其時傷令歟令傷時歟吾固知其不能不屈於此也且暑爲夏令孰不知之今以暑爲季夏爲濕土得不怪哉夫冬果行春令人若感此則成冬溫病矣安得爲春溫病乎其謂太寒之令復行於春溫病方作設使大寒之令不復行於春其溫病當作者遂不作乎況今之春爲溫病者比比皆是未嘗見其必由大寒復行於春而後成也經曰亢則害承乃制其義謂已亢極則勝已者來制如火亢極則水來制之經所謂相火之下水氣承之水位之下土氣承之之類皆是勝已者爲承今以亢爲母承爲子將或勝於經歟抑未達歟又如以制物者爲所勝受制者爲所不勝與經所謂氣有餘則制已所勝而侮所不勝及傳之於其所勝死於其所不勝之旨全反矣余如因時傷令令傷時之説委曲衍説者固不暇悉辯也嗚呼予非好斥前人之非蓋爲其有害大義晦蝕經旨以誤後人故不敢諛順而嘿嘿耳然而僭諭之罪固已自知其不得辭矣但未知觀者以爲何如

張仲景傷寒立法考

讀仲景之書當求其所以立法之意苟得其所以立法之意則知其書足以爲萬世法而後人莫能加莫能外矣苟不得其所以立法之意則疑信相雜未免通此而礙彼也嗚呼自仲景以來發明其書者不可以數計然其所以立法之意竟未聞有表章而示人者豈求之而不得之歟將相循習而不求歟抑有之而余未之見歟余雖不敏僭請陳之夫傷於寒有卽

病者焉有不即病者焉即病者發於所感之時不即
病者過時而發於春夏也即病謂之傷寒不即病謂
之溫與暑夫傷寒溫暑其類雖殊其所受之原則不
殊也由其原之不殊故一以傷寒而爲稱由其類之
殊故施治不得以相混以所稱而混其治宜乎貽禍
後人以歸咎於仲景之法而委廢其太半也吁使仲
景之法果貽禍於後人傷寒論不作可也使仲景之
法果不貽禍於後人傷寒論其可一日缺乎後人乃
不歸咎於已見之未至而歸咎於立法之大賢可謂

溺井怨伯益失火怨燧人矣夫仲景法之祖也後人
雖移易無窮終莫能越其矩度由莫能越而觀之則
其法其方果可委廢太半哉雖然立言垂訓之士猶
不免失於此彼碌碌者固無足誚矣夫惟立言垂訓
之士有形乎著述之間其碌碌者當趑趄猶預之餘
得不靡然從令爭先快覩而趨簡略之地乎夫其法
其方委廢太半而不知返日惟簡便是趨此民生之
所以無藉而仲景之心之所以不能別白矣嗚呼法
也方也仲景專爲即病之傷寒設不兼爲不即病之
溫暑設也後人能知仲景之書本爲即病者設不爲
不即病者設則尚恨其法散落所存不多而莫能禦
夫粗工妄治之萬變果可憚煩而或廢之乎是知委
廢太半而不覺其非者由乎不能得其所以立法之
意故也今人雖以治傷寒法治溫暑亦不過借用耳
非仲景立法之本意也猶六書假借雖移易無窮終
非造字之初意夫仲景立法天下後世之權衡也故
可借焉以爲他病用雖然豈特可借以治溫暑而已
凡雜病之治莫不可借也今人因傷寒治法可借以

治溫暑遂謂其法通爲傷寒溫暑設吁此非識流而
昧原者歟苟不余信請以證之夫仲景之書三陰經
寒證居熱證什之七八彼不即病之溫暑但一於熱
耳何由而爲寒哉就三陰寒證而詳味之然後知餘
言之不妄或者乃謂三陰寒證本是雜病爲王叔和
增入其中又或謂其證之寒蓋由寒藥誤治而致若
此者皆非也夫叔和之增入者辨脈平脈與可汗可
下等諸篇而已其六經病篇必非叔和所能贊辭也
但厥陰經中下利嘔噦諸條却是叔和因其有厥逆

而成證併無厥逆而同類者亦附之耳至若以藥誤治而成變證則惟太陽爲多縱使三陰證亦或有寒藥誤治而變寒者然豈應如是之衆乎夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑設遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用韓祗和雖覺桂枝湯之難用但謂今昔之世不同然未悟仲景書本爲即病之傷寒設也且其著微旨一書又純以溫暑作傷寒立論而即病之傷寒反不言及此已是捨本徇末全不能窺仲景藩籬又以夏至前胷膈滿悶嘔逆氣塞腸鳴腹痛身體拘急手

足逆冷等證視爲溫暑謂與仲景三陰寒證脉理同而證不同遂別立溫中法以治夫仲景所叙三陰寒證乃是冬時即病之傷寒故有此證今欲以仲景所叙三陰寒證求對於春夏溫暑之病不亦悖乎雖然祗和未悟仲景立法本旨而又適當溫暑病作之際其爲感也固宜以余觀之其胷膈滿悶嘔逆氣塞等證若非内傷冷物則不正暴寒所中或過服寒藥所變或内外俱傷於寒之病也且祗和但曰寒而當溫然未嘗求其所以爲寒之故能求其故則知溫暑本

無寒證矣攷之仲景書雖有陰毒之名然其所叙之證不過面目青身痛如被杖咽喉痛而已並不言陰寒極甚之證況其所治之方亦不過升麻甘草當歸鼈甲而已並不用大溫大熱之藥是知仲景所謂陰毒者非陰寒之病乃是感天地惡毒異氣入於陰經故曰陰毒耳後之論者遂以爲陰寒極甚之證稱爲陰毒乃引仲景所叙面目青身痛如被杖咽喉痛數語併而言之却用附子散正陽散等藥以治竊謂陰寒極甚之證固亦可名爲陰毒然終非仲景所以立

名之本意觀後人所叙陰毒與仲景所叙陰毒自是兩般豈可混論後人所叙陰毒亦只是内傷冷物或不正暴寒所中或過服寒藥所變或内外俱傷於寒而成耳非天地惡毒異氣所中者也朱奉議作活人書累數萬言於仲景傷寒論多有發明其傷寒即入陰經爲寒證者諸家不識而奉議識之但惜其亦不知仲景專爲即病者立法故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論竟無所別況又視傷寒論爲全書遂將次傳陰經熱證與即入陰經寒證牽合爲一立說且

謂大抵傷寒陽明證宜下少陰證宜温而於所識即入陰經之見又未免自相悖矣夫陽明證之宜下者固為邪熱入胃其少陰證果是傷寒傳經熱邪亦可温乎況温病暑病之少陰尤不可温也自奉議此說行而天下後世蒙害者不無矣逆夫成無巳作傷寒論註又作明理論其表章名義纖悉不遺可謂善羽翼仲景者然即入陰經之寒證又不及朱奉議能識況即病立法之本旨乎宜其莫能知也惟其莫知故於三陰諸寒證止隨文解義而已未嘗明其何由不

為熱而為寒也至於劉守真出亦以温暑作傷寒立論而遺即病之傷寒其所處辛涼解散之劑固為昧者有中風傷寒錯治之失而立蓋亦不無桂枝麻黃難用之惑也既惑於此則無由悟夫仲景立桂枝麻黃湯之有所主用桂枝麻黃湯之有其時矣故其原病式有曰夏熱用麻黃桂枝之類熱藥發表須加寒藥不然則熱甚發黃或斑出矣此論出於龐安常而朱奉議亦從而和之殊不知仲景立麻黃湯桂枝湯本不欲用於夏熱之時也苟悟夫桂枝麻黃湯本非治温暑之劑則羣疑

氷泮矣何也夫寒之初客於表也閉腠理鬱陽氣而為熱故非辛温之藥不能開腠理以泄其熱此麻黃湯之所由立也至於風邪傷表雖反疎腠理而不能閉然邪既客表則表之正氣受傷而不能流通故亦發熱也必以辛甘温之藥發其邪則邪去而腠理自密矣此桂枝湯之所由立也其所以不加寒藥者蓋由風寒在表又當天令寒冷之時而無所避故也後人不知仲景立法之意故有惑於麻黃桂枝之熱有犯於春夏之司氣而不敢用於是有須加寒藥之論

夫欲加寒藥於麻黃桂枝湯之中此乃不悟其所以然故如此耳若仲景為温暑立方必不如此必别有法但惜其遺佚不傳致使後人有多岐之患若知仲景傷寒論專為即病傷寒作則知麻黃桂枝所以宜用之故除傳經熱證之外其直傷陰經與太陽不鬱熱即傳陰經諸寒證皆有所歸著而不復疑為寒藥誤下而生矣若乃春夏有惡風惡寒純類傷寒之證蓋春夏暴中風寒之新病非冬時受傷過時而發者不然則或是温暑將發而復感於風寒或因感風寒

而發乎久鬱之熱遂發為溫暑也仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病觀此則知溫病不當惡寒而當渴其惡寒而不渴者非溫病矣仲景雖不言暑病然暑病與溫病同但復過一時而加重於溫病耳其不惡寒而渴則無異也春夏雖有惡風惡寒表證其桂枝麻黃二湯終難輕用勿泥於發表不遠熱之語也於是用辛涼解散庶為得宜苟不慎而輕用之誠不能免夫狂躁斑黃衄血之變而亦無功也雖或者行桂枝麻黃於春夏而效乃是因其辛甘發散之力偶中於萬一斷不可視為常道而守之今人以敗毒散參蘇飲通解散百解散之類不問四時中風傷寒一例施之雖非至正之道較之不慎而輕用麻黃桂枝於春夏以致變者則反庶幾然敗毒散等若用於春夏亦止可治暴中風寒之證而已其冬時受傷過時而發之溫病暑病則不宜用也用則非徒無益亦反害之矣縱或有效亦是偶然彼冬時傷寒用辛涼發表而或效者亦偶然也凡用藥治病其既效之後須要明其當然與偶然能明其當然與偶然則精

微之地安有不至者乎惟其視偶然為當然所以循非踵弊莫之能悟而病者不幸矣若夫仲景於三陰經每用溫藥正由病之所必須與用之有其時耳餘有別論茲不再具若槩以三陰寒證視為雜病而外之得無負於仲景濟人利物之至仁而誤後世乎自近代先覺不示傷寒溫暑異治之端緒但一以寒涼為主而諸溫熱之劑悉在所略致使後之學者視仲景書欲仗焉而不敢以終決欲棄焉則猶以為立法之祖而莫能外甚則待為文具又甚則束之高閣而謂其法宜於昔而不宜於今由治亂動靜之殊治靜屬水亂動屬火故其溫熱之藥不可用於今屬火之時也噫斯言也其果然耶否耶但能明乎仲景本為即病者設法則桂枝麻黃自有所用諸溫熱之劑皆不可略矣若謂仲景法不獨為即病者設則凡時行及寒疫溫瘧風溫等病亦通以傷寒六經病諸方治之乎傷寒例曰冬溫之毒與傷寒大異為治不同又曰寒疫與溫及暑病相似但治有殊耳是則溫暑及時行寒疫溫瘧風溫等仲景必別有治法今不見者

亡之也觀其所謂爲治不同所謂溫瘧風溫溫毒溫疫脉之變證方治如說豈非亡其法乎決不可以傷寒六經病諸方通治也大素問謂人傷於寒則爲病熱者言常而不言變也仲景謂或熱或寒而不一者備常與變而弗遺也仲景蓋言古人之所未言大有功於古人者雖欲偏廢可乎叔和搜採仲景舊論之散落者以成書功莫大矣但惜其既以自已之說混於仲景所言之中又以雜脉雜病紛紜並載於卷首故使玉石不分主客相亂若先備仲景之言而次附

己說明書其名則不致惑於後人而累仲景矣昔漢儒收拾殘編斷簡於秦火之餘加以傳註後之議者謂其功過相等叔和其亦未免於後人之議歟余嘗欲編類其書以傷寒例居前而六經病次之相類病又次之差後病又次之診察治法治禁治誤病解未解等又次之其雜脉雜病與傷寒有所關者采以附焉其與傷寒無相關者皆删去如此庶幾法度純一而玉石有分主客不亂矣然有志未暇姑叙此以俟他日

傷寒溫病熱病說

有病因有病名有病形辯其因正其名察其形三者俱當始可以言治矣一或未明而曰不誤於人吾未之信也且如傷寒此以病因而爲病名者也溫病熱病此以天時與病形而爲病名者也由三者皆起於感寒或者通以傷寒稱之夫通稱傷寒者原其因之同耳至於用藥則不可一例而施也何也夫傷寒蓋感於霜降後春分前然不卽發鬱熱而發於春夏者也傷寒卽發於天令寒冷之時而寒邪在表閉其腠

理故非辛甘溫之劑不足以散之此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也溫病熱病後發於天令暄熱之時怫熱自內而達於外鬱其腠理無寒在表故非辛涼或苦寒或酸苦之劑不足以解之此仲景桂枝麻黃等湯獨治外者之所以不可用而後人所處水解散大黃湯千金湯防風通聖散之類兼治內外者之所以可用也夫卽病之傷寒有惡風惡寒之證者風寒在表而表氣受傷故也後發之溫病熱病有惡風惡寒之證者重有風寒新中而表氣亦受傷故也若

無新中之風寒則無惡風惡寒之證故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病溫病如此則知熱病亦如此是則不渴而惡寒者非溫熱病矣然或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之證者蓋病人表氣本虛熱達於表又重傷表氣故不禁風寒非傷風惡風傷寒惡寒也但衛虛則惡風榮虛則惡寒耳且溫病熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋怫熱自內達外熱鬱腠理不得外泄遂復還裏而成可攻之證非如傷寒從表而始也或者不悟此理乃於春夏溫病熱

病而求浮緊之脈不亦疏乎殊不知緊為寒脈有寒邪則見之無寒邪則不見也其溫病熱病或見緊脈者乃重感不正之暴寒與內傷過度之冷食也豈其本然哉又或者不識脈形但見弦便呼為緊斷為寒而妄治蓋脈之盛而有力者每每兼弦豈可錯認為緊而斷為寒夫溫病熱病之脈多在肌肉之分而不甚浮且右手反盛於左手者誠由怫熱在內故也其或左手盛或浮者必有重感之風寒否則非溫病熱病自是暴感風寒之病耳凡溫病熱病若無重感表

證雖間見而裏病為多故少有不渴者斯時也法當治裏熱為主而解表兼之亦有治裏而表自解者余每見世人治溫熱病雖誤攻其裏亦無大害誤發其表變不可言此足以明其熱之自內達外矣其間有誤攻裏而致大害者乃春夏暴寒所中之疫證邪純在表未入於裏故也不可與溫病熱病同論夫惟世以溫病熱病混稱傷寒故每執寒字以求浮緊之脈以用溫熱之藥若此者因名亂實而戕人之生名其可不正乎又方書多言四時傷寒故以春夏之溫病

熱病與秋冬之傷寒一類視之而無所別夫秋冬之傷寒真傷寒也春夏之傷寒寒疫也與溫病熱病自是兩塗豈可同治吁此弊之來非一日矣歷考方書並無救弊之論每每雷同良可痛哉雖然傷寒與溫病熱病其攻裏之法若果是以寒除熱固不必求異其發表之法斷不可不異也況傷寒之直傷陰經與太陽雖傷不及鬱熱即傳陰經為寒證而當溫者又與溫病熱病大不同其可妄治乎或者知一不知二故謂仲景發表藥今不可用而攻裏之藥乃可用嗚

所其可用不可用之理果何在哉若能辨其時正其名察其形治法其有不當者乎彼非行不正之氣所作及重感異氣而變者則又當觀其何時何氣參酌傷寒溫熱病之法損益而治之尤不可例以仲景即病傷寒藥通治也

傷寒三陰病或寒或熱辯

嘗讀張仲景傷寒論於太陰有曰自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜服四逆輩於少陰有曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之少陰病下利白通湯主之少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯於厥陰有曰手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之觀仲景此論則傷寒三陰必有寒

證而宜用溫熱之劑也及讀劉守真之書有曰傷寒邪熱在表腑病為陽邪熱在裏臟病為陰俗妄謂有寒熱陰陽異證誤人久矣寒病有矣非汗病之謂也寒病止為雜病終莫能為汗病且造化汗液之氣者乃陽熱之氣非陰寒之所能也雖仲景有四逆湯證是治表熱裏和誤以寒藥下之太早表熱入裏下利不止及或表熱裏寒自利急以四逆溫裏利止裏和急解其表也故仲景四逆湯證復有承氣湯下之者由是傷寒汗病經直言熱病而不言寒也經言三陰證者邪熱在臟在裏以臟與裏為陰當下熱者也素問論傷寒熱病有二篇名曰熱竟無寒理兼素問并靈樞諸篇運氣造化之理推之則為熱病誠非寒也觀守真此論則傷寒無問在表在裏與夫三陽三陰皆一於為熱而決無或寒者矣兩說不同其是非之判必有一居此者由是彼此反覆究詰其義而久不能得雖至神疲氣耗不舍置者自謂此是傷寒大綱領此義不明則千言萬語皆未足以為後學式況戕賊民生何有窮極也哉意謂成無已之註必有所發

明者遂因而求之，然亦止是隨文而略釋之，竟不明言何由為熱，何由為寒之故，此非其不欲言也，蓋止知傷寒皆是傳經，故疑於六經所傳俱為熱證，而熱無變寒之理，遂不敢別白耳。以寒為本臟之寒歟？安得當熱邪傳裏入深之時，反獨見寒而不見熱者？且所用溫熱藥，能不助傳經之熱邪乎？以寒為外邪之寒歟？則在三陽以成熱矣，豈有傳至三陰而反為寒哉？成氏能潛心乎此，則必悟其所以然矣。自仲景作傷寒論以來，靡或遺之而弗宗，至於異同之論興，而漁者走淵，木者走山矣，宜乎後人不能決於似是而非之際，故或謂今世並無真傷寒病，又或以為今人所得之病俱是內傷，又昧者至謂傷寒論中諸溫藥悉為傳經熱邪而用者，以三陰經屬陰故也。及其太謬者，則曰論中凡有寒字皆當作熱字看。嗚呼！末流之弊，一至此乎！於是澄心靜慮以涵泳之，一旦豁然若有所悟者，然亦未敢必其當否也，姑陳之以從有道之正。夫三陽之病，其寒邪之在太陽也，寒鬱其陽，陽不暢而成熱，陽雖人身之正氣，既鬱則為邪矣。用

麻黄發表以逐其寒，則腠理通而鬱熱泄，故汗而愈。苟或不汗不解，其熱不得外泄，則必裹入，故傳陽明，傳少陽，而或入腑也。若夫三陰之病，則或寒或熱者何哉？蓋寒邪之傷人也，或有在太陽經鬱熱，然後以次而傳至陰經者；或有太陽不傳陽明少陽，而便傳三陰經者；或有寒邪不從陽經，而始直傷陰經者；或有雖從太陽而始，不及鬱熱，即入少陰，而獨見少陰證者；或有始自太陽即入少陰，而太陽不能以無傷者；或有直傷即入，而寒便變熱，及始寒而終熱者。其鬱熱傳陰與變便變熱，則為熱證；其直傷陰經，及從太陽即入少陰，則為寒證；其太陽不能無傷，則少陰脈證而兼見太陽標病；其始為寒而終變熱，則先見寒證而後見熱證。此三陰之病所以或寒或熱也。苟即三陰經篇諸條展轉玩繹以求之，理斯出矣。夫其或傳經，或直傷，或即入，或先寒後熱者，何也？邪氣暴卒，本無定情，而傳變不常故耳。故經曰：邪之中人也無有常，或中於陽，或中於陰。夫守真者，絕類離倫之士也，豈好為異說以駭人哉？蓋由其以溫暑為傷寒

而仲景之方每不與溫暑對故畧乎溫熱之劑而例
用寒凉由其以傷寒一門爲熱而無寒故謂仲景四
逆湯爲寒藥誤下表熱裏和之證及爲表熱裏寒自
利之證而立又謂溫裏止利急解其表又謂寒病止
爲雜病嗟乎仲景傷寒論專爲中而卽病之傷寒作
不兼爲不卽病之溫暑作故每有三陰之寒證而溫
熱之劑之所以用也以病則寒以時則寒其用之也
固宜後人不知此意是以愈求愈遠愈說愈鑿若知
此意則猶庖丁解牛動中肯綮矣且如寒藥誤下而

成裏寒者固不爲不熱矣不用寒藥誤下而自爲裏
寒者其可謂之必無乎殊不知陰經之每見寒證者
本因寒邪不由陽經直傷於此與夫雖由太陽而始
不及鬱熱卽入於此而致也雖或有因寒藥誤下而
致者蓋亦甚少仲景所用諸溫熱之劑何嘗每爲寒
藥誤下而立况表裏寒之證亦何嘗每有急解其表
之文乎夫裏寒外熱之證乃是寒邪入客於內迫陽
於外或是虛陽之氣自作外熱之狀耳非真熱邪所
爲也觀仲景於裏寒外熱之證但以溫藥治裏寒而

不治外熱則知其所以爲治之意矣若果當急解其
表豈不於裏和之後明言之乎且三陰寒病既是雜
病何故亦載於傷寒論以惑後人乎其厥陰病篇諸
條之上又何故每以傷寒二字冠之乎夫內經所叙
三陰病一於爲熱者言其常也仲景所叙三陰病兼
乎寒熱者言其變也並行而不相悖耳後人謂傷寒
本無寒證得非知常而不知變歟然世之恪守局方
好用溫熱劑者乃反能每全於寒證無他其守彼雖
偏治此則是學者能知三陰固有寒邪所爲之證則

仲景創法之本意可以了然於心目之間而不爲他
說所奪矣或曰傷寒之病必從陽經鬱熱而傳三陰
今子謂直傷陰經卽入陰經而爲寒證其何據乎予
曰據夫仲景耳仲景曰病發熱惡寒者發於陽也無
熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六
日愈夫謂之無熱惡寒則知其非陽經之鬱熱矣謂
之發於陰則知其不從陽經傳至此矣謂之六日愈
則知其不始太陽而止自陰經發病之日爲始數之
矣仲景又曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進夫得傷寒未為熱即為厥者豈亦由傳經入深之熱邪而致此乎今世人多有始得病時便見諸寒證而並無或熱者此則直傷陰經即入陰經者也苟不能究夫仲景之心但執凡傷於寒則為病熱之語以為治其不夭人天年者幾希矣

陽虛陰盛陽盛陰虛論

難經曰傷寒陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈嗟乎其傷寒汗下之樞機乎夫邪之傷於人也有淺深焉淺則居表深則入裏居表則閉腠理發怫熱見惡寒惡風頭痛等證於斯時也惟辛溫解散而可愈入裏則為燥屎作潮熱形狂言譫語大渴等證於斯時也惟鹹寒攻下而可平夫寒邪外客非陰盛而陽虛乎熱邪內熾非陽盛而陰虛乎汗下一差生死反掌呼是言也謂之傷寒汗下樞機其不然歟惜乎釋者旁求厥義滋隱外臺秘要曰此陰陽指身之表裏言病者為虛不病者為盛表病裏和是陽虛陰盛也表和裏病是陽盛陰虛也竊意陰陽之在人均則寧偏則病無過不及之謂均過與不及之謂偏盛則過矣虛則不及矣其可以盛為和乎故內經云邪氣盛則實精氣奪則虛且謂陽虛當汗陰虛當下乃遺邪氣而反指正氣為言得無晦乎傷寒微旨曰此陰陽指脈之尺寸言尺脈實大寸脈短小名陰盛陽虛可汗寸脈實大尺脈短小名陽盛陰虛可下苟汗證已具而脈未應必待尺脈力過於寸而後行下證已具而脈未應必待寸脈力過於尺而後用竊意越人設難以病不以脈其所荅也何反以脈不以病乎且脈固以候病也倘汗下之證已急不可稍緩待脈應而未應欲不待則惑於心欲待之則慮其變二者之間將從病歟將從脈歟吾不得無疑於此也或詰予曰仲景傷寒論引此而繼以桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡之語夫桂枝表藥承氣裏藥反則為害是固然矣然麻黃湯亦表藥也其不言之何歟且子以陰盛為寒邪寒邪固宜用麻黃也今反舉桂枝又何歟予曰何不味仲景之

言乎其曰凡傷寒之病多從風寒得之又曰脉浮而緊浮則為風緊則為寒又桂枝湯條而曰嗇嗇惡寒淅淅惡風麻黄湯條而曰惡風夫風寒分言則風陽而寒陰風苟行於天地嚴凝凛冽之時其得謂之陽乎是則風寒常相因耳故桂枝麻黄皆温劑也以温劑為治足以見風寒之俱為陰邪矣但傷衛則桂枝傷榮則麻黄榮衛雖殊其為表則一耳仲景此言但以戒汗下之誤為主不為榮衛設也舉桂枝則麻黄在其中矣所謂陽盛即斃者是言表證已罷而裏證

既全可攻而不可汗所謂陰盛以亡者是言裏證未形而表證獨具可汗而不可攻由是觀之則越人仲景之本旨庶乎暢然於其中矣

溯洄集卷之一終

醫經溯洄集卷之二

元　崑山　魏博王　履安道甫著
明　餘杭　節菴陶　華尚文甫校

傷寒三百九十七法辯

余自童時習聞此言以為傷寒治法如是之詳且備也及致之成無已註本則所謂三百九十七法者茫然不知所在於是詢諸醫流亦不過熟誦此句而已欲其條分縷析以實其數則未遇其人遂乃反覆而推尋之以有論有方諸條數之則不及其數以有論

有方有論無方諸條通數之則過其數除辨脉法平脉法并傷寒例及可汗不可汗可吐不可吐可下不可下諸篇外止以六經病篇中有論有方有論無方諸條數之則亦不及其數以六經病篇及痓濕暍霍亂陰陽易差後勞復病篇中有論有方有論無方諸條數之則亦過其數至以六經病痓濕暍霍亂陰陽易差後勞復篇有論有方諸條數之則又太少矣竟不能決欲以此句視為後人無據之言而不從則疑其或有所據而或出仲景叔和而弗敢廢欲尊信而

必從之則又多方求合而莫之遂宋林億等校正傷寒論其序曰今校定張仲景傷寒論十卷總二十二篇證外合三百九十七法余於是就其十卷二十二篇而求之其六經篇霍亂篇陰陽易差後勞復篇中有方治諸條以數爲計又重載於各篇之前又謂疾病至急倉卒難尋復重集諸可與不可方治分爲八篇亦以數爲計繼於陰陽易差後勞復篇之後其太陽上篇註曰一十六法太陽中篇註曰六十六法太陽下篇註曰三十九法陽明篇註曰四十四法少陽篇

不言法太陰篇註曰三法少陰篇註曰二十三法厥陰篇註曰六法不可發汗篇註曰一法可發汗篇註曰四十一法發汗後篇註曰二十五法可吐篇註曰二法不可下篇註曰四法可下篇註曰四十四法汗吐下後篇註曰四十八法以其所註之數通計之得三百八十七法然少陽篇有小柴胡湯一法其不言者恐脫之也又可吐篇却有五法其止言二法者恐誤也併此脫誤四法於三百九十七法之中亦僅得三百九十一法耳較之序文之說猶欠六法乃參之

脉經其可汗可吐等篇外比傷寒論又多可溫可灸可刺可水可火不可刺不可灸不可水不可火諸篇欲以此補其所欠則又甚多而不可用元泰定間程德齋又作傷寒鈐法其自序曰若能精究是編則知六經傳變三百九十七法在於指掌矣又曰六經二百一十一法霍亂六法陰陽易差後勞復六法痓濕暍九法不可汗二十六法宜汗四十一法不可吐五法不可下五法可汗五法可吐五法餘亦以其說通計之却止得三百一十八法於三百九十七法中尚

欠七十八法觀其序文乃如彼考其所計乃如此則知其猶未能灼然以得其實數而無疑也故下文細數中止重叙六經霍亂痓濕暍陰陽易差後勞復諸法而已彼可汗不可汗等諸法再不重敘也近批點傷寒論者何不攷其非乃一宗其所鈐字號而不敢少易乎余由是屏去其說但即論之本文傷食與俱以細繹之一旦豁然始悟其所計之數於理不通而非仲景叔和之說矣夫傷寒論仲景之所作也至叔和時已多散落雖叔和搜采成書終不能復其舊然

則今之所傳者非全書也明矣後之昧者乃不察此必欲以全書視之為鈐為括斷之曰某經幾證某經幾證以謂傷寒治法略無餘蘊矣殊不知其間有論無方者甚多至若前篇引內經所叙六經病證除太陽少陰證為後篇所有外其陽明篇無目疼少陽篇言胸脇滿而不言痛太陰篇無嗌乾厥陰篇無囊縮若此者非皆本無也必有之而脫之耳雖然為鈐括者膠在調瑟但知叔和之重載而莫知其所以重載之意也夫叔和既撰次於搜采之餘復重載各篇方

治并諸可與不可方治者非他不過慮人惑於紛亂故示之以簡便而已林億乃弗解其意遂不問重與不重一槩通數之以立總目何不觀重載八篇之中其方治者止有一十五條為六經篇之所無其餘一百五十三條皆六經篇已數過者安有一法而當兩數之理乎雖程德齋去取與林億頗異然亦五十步笑百步耳其不重數發汗後并吐汗下後諸法固為是矣至於宜汗四十一法却又併是一法當兩數者與林億所計何以異哉推原其意似亦不見林億所

計細數止開三百九十七法之目遂自就論中尋而數之欲以實其總數然而卒不能實故為此含糊之說以欺後人反又不逮林億所言也竊嘗思之縱使三百九十七法之言不出於林億等而出於億之前亦不足用此言既出則後之闇者必當覈其是非以歸於正而乃遵守聽從以為千載不易之定論悲夫余今於三百九十七法內除去重復者與無方治者止以有方治而不重復者計之得二百三十八條并以治字易法字而曰二百三十八治如此則庶或可

通也若以法言則仲景之書無非法也豈獨有方者然後為法哉且如論證論脉與夫諄諄教戒而使人按之以為望聞問切之準則者其可謂之法乎其不可謂之法乎雖然六經之外諸條其二家去取不同固不必辯然其於六經之中尤每有悖理而不通者姑陳一二如太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治之桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與之也常須識此勿令誤也若酒客

病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故也喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也林億所校本則自太陽病止勿令誤也爲一法自若酒客病止杏子佳爲一法自凡服桂枝湯吐膿血也則爲證不爲法程德齋鈐法則自太陽病止隨證治之爲一法自桂枝本爲解肌止必吐膿血也爲一法又林億本於病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死一條則數爲一法於其餘死不治者則皆不數程德齋鈐法於陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出愈一條則不數而太陽刺肝俞肺俞期門諸條却又數之而弗遺餘如兩條同類一云當汗而無方一云當汗而有方則取其有方者而略其無方者又如當取而不取不當取而取者蓋亦甚多不可悉舉若此者悖理不通二家皆所不免所謂楚固失矣齊亦未爲得也苟熟玩論之本文以較其言則罅漏出矣

傷寒四逆厥辯

成無己註傷寒論有云四逆者四肢不溫也厥者手足冷也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不溫及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆經曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄痢下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之證也四逆與厥相近而非經曰諸四逆厥者不可下是四逆與厥有異也吁斯言也所謂彌近理而大亂眞者歟竊

嘗考之仲景言四逆與厥者非一或曰四逆或曰厥或曰厥逆或曰厥冷或曰厥寒或曰手足逆冷或曰手足厥逆或曰手足厥冷或曰手足厥逆冷細詳其義俱是言寒冷耳故厥逆二字每每互言未嘗分逆爲不溫厥爲冷也然四肢與手足却有所分其以四字加於逆字之上者是通指手足臂脛以上言也其以手足二字加於厥逆厥冷等之上及無手足二字者是獨指手足言也旣曰不溫卽爲冷矣尚何異乎仲景所謂諸四逆厥者不可下蓋以四逆爲四肢通

厥蓋手足獨冷而臂與脛以上不冷耳不謂逆厥者不溫與冷之別也故又曰厥者手足逆冷是也以逆冷二字釋厥字足見逆即厥厥即逆也故字書曰厥者逆也雖然逆厥雖俱爲寒冷而却有陰陽之殊焉熱極而成逆厥者陽極似陰也寒極而成逆厥者獨陰無陽也陽極似陰固用寒藥獨陰無陽固用熱藥仲景以四逆散寒藥治四逆一條此陽極似陰之四逆也其無四逆湯熱藥治四逆之條者安知其非本有而失之乎且四逆湯之名由四肢之冷而立也

今以四逆湯治手足厥冷豈非逆厥之不異乎既以四逆爲四肢不溫厥爲手足獨冷何故不名治厥之藥爲四厥湯乎成氏於四逆散治四逆條下謂四逆爲熱邪所爲及於明理論謂四逆非虛寒之證矣至於少陰病死證二條下却謂四逆爲寒甚若此者得不自悖其說乎是知四逆亦猶厥之有寒有熱固不可謂四逆專爲熱邪所作也但四肢通冷比之手足獨冷則有間爾故仲景曰少陰病吐利躁煩四逆者死又曰少陰病四逆惡寒而身踡脉不至不煩而躁者死又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之此三條者二爲死一爲可治雖通由諸證兼見而然然死者以四逆言可治者以厥冷言則亦可見四逆與手足厥冷之有輕重淺深矣夫四肢通冷其病爲重手足獨冷其病爲輕雖婦人小子亦能知之成氏乃謂厥甚於逆可邪若能知四逆厥之所以異者在於獨指手足言與兼指臂脛以上言則不勞創爲不溫與冷之曲說而自然貫通矣

嘔吐乾嘔噦欬逆辯

嘗讀成無巳傷寒明理論有曰嘔者有聲者也俗謂之啘吐者吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則曰飲食入口即吐則嘔吐之有輕重可知矣又曰噦者俗謂之欬逆是也余竊疑之於是即仲景傷寒論以考其是非以訂其說夫傷寒論曰嘔曰吐曰乾嘔曰噦者至多曰欬逆者則二而止也因類聚而觀之夫嘔者東垣所謂聲物兼出者也吐者東垣所謂物出而無聲者也至若乾嘔與噦皆聲出而無物也東垣但以噦該之而無乾嘔

之論夫乾嘔與噦其所異者果何在哉微甚而已矣故仲景於乾嘔則皆平易言之於噦則曰太陽中風少陽發汗後久則譫語甚者至噦又曰陽明中風若不尿腹滿加噦者不治又曰大吐大下之極虛復極汗出者因得噦雖亦間有似乎易言者然比之言乾嘔則徑庭矣竊又思之乾嘔與噦東垣視為一仲景視為二由為一而觀之固皆聲之獨出者也由為二而觀之則乾嘔乃噦之微噦乃乾嘔之甚乾嘔者其聲輕小而短噦者其聲重大而長長者雖有微甚之

分蓋一證也今成氏乃以嘔為有聲與乾嘔混而無別又以噦為欬逆若此者余未之能從也夫仲景以聲物兼出而名為嘔以物獨出而名為吐以聲獨出而名為乾嘔惟其嘔兼聲物故無物而聲空鳴者乃謂之乾乾猶空也至於吐則是必有物矣其可謂之乾乎仲景於嘔字上加一乾字所以別夫嘔為聲物兼出者耳成氏乃以嘔為獨有聲而同乎乾嘔得不有失仲景措辭之本意歟仲景曰嘔家有癰膿者不可治嘔盡膿自愈夫謂之嘔盡膿其可以嘔為獨有

聲乎至於曰得湯則嘔得食而嘔飲水嘔貪水者必嘔之類亦不可以嘔為獨有聲矣又少陰病下利用通脉四逆湯一條其所叙諸證既有乾嘔之文何下文加減法中又曰嘔者加生薑乎設仲景果以嘔為獨有聲則不當又立乾嘔之名矣觀其既曰嘔又曰乾嘔則其義之殊別也詎不著明也哉且仲景嘗言欲嘔矣又言欲吐矣未嘗言欲乾嘔欲噦也夫欲之為義將出未出而預有所覺之辭也夫將出未出而預覺者惟有形之物則然無形之聲則不然也有形

之物將出乎胸膈之間則雖未出而亦可以前知若無形之聲則不能前知其將出必待夫既出而後可知也嘔與吐主有形之物言故可謂之欲乾嘔與噦主無形之聲言故不可謂之欲成氏引食穀欲嘔飲食入口即吐二句而謂嘔吐有輕重其意蓋以嘔言欲而為輕吐言即而為重安知言欲不言欲者本為有形無形設不為輕重設也果如其說則得湯則嘔得食而嘔心中溫溫欲吐氣逆欲吐之語不出於仲景乎又引俗謂之啘一句以證嘔夫啘與噦蓋字異

而音義俱同者也以之證嘔亦疏矣雖然以嘔與吐較之吐輕於嘔以吐與乾嘔較之乾嘔輕於吐然三者亦各自有輕重不可定狗也但以嘔吐乾嘔與噦而較則噦之爲重必非三者之比矣故太素曰木陳者其葉落病深者其聲噦夫噦雖亦有輕而可治重而不可治者然病至於噦則其治也終不易矣且夫欬逆俗以吃逆與吃忒呼之然欬逆二字僅見傷寒論首辨脉平脉法中其六經病篇及汗下可否諸篇皆無所有其所有者噦也後人因見六經病篇及汗

下可否諸篇但有噦而無欬逆遂謂噦即欬逆而曰欬逆者噦逆之名吁斯言也孫眞人倡于前朱奉議成無巳和于後由是噦與欬逆之名義紊矣金匱要略曰病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者生薑半夏湯主之乾嘔噦若手足厥者橘皮湯主之噦逆者橘皮竹茹湯主之觀此則仲景所謂噦逆但指與乾嘔同類者言何嘗指欬逆言乎欬逆噦逆不同欬逆言其聲之纔發而遽止雖發止相續有至數十聲者然而短促不長有若欬嗽之欬然故曰欬逆噦逆則言其似欲嘔物以出而無所出但聲之濁惡長而有力直至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚故曰噦逆二者皆由氣之逆上而作故俱以逆言之孫眞人乃以噦逆當欬逆何邪彼言傷寒者雖以辨脉平脉法之欬逆與欬逆上氣視爲吃忒然安知其不爲欬而氣逆之病乎故今不敢定其必爲吃忒也金匱要略曰病欬逆寸口脉微而數此爲肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皁莢丸主之欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之此

二條者皆是欬而氣逆之病豈可以欬逆專爲吃忒哉今傷寒家本有吃忒而論中六經病篇及汗下可否諸篇却無者必亡逸於散落之餘耳雖吃忒爲六經病篇及汗下可否諸篇所不言決不可以噦爲吃忒之欬逆亦不可以噦爲欬而氣逆之欬逆也或曰吾子以要略所謂噦逆非吃忒病何後人治吃忒者用橘皮竹茹湯而愈乎余曰橘皮竹茹湯辛甘之劑也有散有緩有和有補其噦逆吃忒病雖不同而爲邪正之氣怫鬱擾亂所致則一故用焉而皆愈雖然

噦逆吃忒以一藥同治則可以一體同視則不可

中風辨

人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之余嘗考諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變化乃爲他病無常方又曰風者善行而數變又曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風或爲偏枯或爲風也其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及

觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痹解之者曰偏枯者半身不隨風痱者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痹者諸痹類風狀金匱要略中風篇曰寸口脉浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固爲因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代劉河間李東垣朱彥修三子者出所論始與昔人異矣河間曰中風癱瘓者非肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風由乎將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆爲熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣

病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒爲風所中誠有之矣東南氣溫而地多濕有風病者非風也皆濕土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎濕反以風爲虛象而大異於昔人矣吁昔人也三子也果孰是歟果孰非歟以三子爲是昔人爲非則三子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人爲是三子爲非則三子已出之後

亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能决殊不知因于風者真中風也因于火因于氣因于濕者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因濕而為暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必因於風而後能也夫風火氣濕之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火氣濕則從三子以治如此庶乎析理明而用法當矣惟其以因火因氣因濕之證強引風而合論之所以真偽不分而名實相紊若以因火因氣因濕證分出之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

中暑中熱辨

潔古云靜而得之為中暑動而得之為中熱中暑者陰證中熱者陽證東垣云避暑熱於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越大順散主之若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之竊謂暑熱者夏之令也大行於天地之間人或勞動或饑餓元氣虧乏不足以禦天令亢極於是受傷而為病名曰中暑亦名曰中熱其實一也今乃以動靜所得分之何哉夫中暑熱者固多在勞役之人勞役則虛虛則邪入邪入則病不虛則天令雖亢亦無由以傷之彼避暑於深堂大廈得頭疼惡寒等證者盖亦傷寒之類耳不可以中暑名之其所以煩心與肌膚火熱者非暑邪也身中陽氣受陰寒所遏而作也既非暑邪其可以中暑名乎苟欲治之則辛溫輕揚之劑發散可也夫大順散一方甘艸最多乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外其三物皆炒者原其初意本為冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分臟腑不調所立故甘艸乾薑皆經火炒熟又肉桂而非桂枝盖溫中藥也內

有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得之之證吾恐不能解表反增內煩矣今世俗往往不明類曰夏月陰氣在內大順散為必用之藥吁其誤也不亦甚歟夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散於外而陰氣則在內耳豈空視陰氣為寒氣而用溫熱之藥乎陰果為寒何以夏則飲水乎其蒼朮白虎湯雖宜用然亦豈可視為通行之藥必參之治暑諸方隨所見之證而用之然後合理若夫所謂靜而得之之證雖當暑月即非暑病宜分出之勿使後人有似同而異之惑

積熱沈寒論

人之所藉以生者氣也氣者何陰陽是也夫陰與陽可以和而平可以乖而否善攝與否吉凶於是乎歧之夫惟攝之不能以皆善也故偏寒偏熱之病始莫逃於乖否之餘矣雖然寒也熱也苟未至於甚粗工為之而不難設熱積而寒沈良工猶弗能以為計況其下乎奈之何俗尚頹蒙恪持方藥愈投愈盛迷不之反豈知端本澄原中含至理執其樞要衆妙俱呈

且以積熱言之始而凉和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則技窮矣由是苦寒頻歲而弗停又以沈寒言之始而溫和次而熱取熱取不愈則因寒而從之從之不愈則技窮矣由是辛熱比年而弗止嗟夫苦寒益深而積熱彌熾辛熱大過而沈寒愈滋苟非大聖慈仁明垂樞要生也孰從而全之經曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也屬也者其樞要之所存乎斯旨也王太僕知之故曰益火之原以消陰翳壯水之主以制陽光

又曰取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒但益心之陽寒亦通行強腎之陰熱之猶可吁混乎千言萬語之間殆猶和璧之在璞也其至久湮豈過焉者石之而弗鑒乎余僭得而推衍之夫偏寒偏熱之病其免者固千百之一二而積熱沈寒亦恐未至於數見也然而數見者得非粗工不知求屬之道不能防微杜漸遂至滋蔓難圖以成之歟夫寒之而熱者徒知以寒治熱而不知熱之不衰者由乎真水之不足也熱之而寒者徒知以熱治寒而不知寒之不衰者

由乎真火之不足也不知真水火不足亦以寒熱藥治之非惟藏腑習熟藥反見化於其病而有者弗去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而使其制夫心火之有餘取之陽所以益心火之不足而使其勝夫腎水之有餘也其指水火也屬猶主也謂心腎也求其屬者言水火不足而求之於心腎也火之原者陽氣之根即心是也水之主者陰氣之根即腎是也非謂火為心而原為肝水為腎而主為肺也寒亦益心熱亦強腎此太僕達至理於規矩準繩之外

而非迂士曲生之可以跂及矣彼迂士曲生不明真水火於寒熱之病有必制必勝之道但謂藥未勝病久遠期之是以恪守方藥愈投愈盛卒至殞滅而莫之悟嗚呼悲夫余見積熱沉寒之治每蹈於覆轍也因表而出之以勸

瀉南方補北方論

難經七十五篇曰經言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火土當更相平東方木也西方金也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之東方者肝也則知肝實西方者肺也則知肺虛瀉南方火補北方水南方火火者木之子也北方水水者木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂也余每讀至此未嘗不歎夫越人之得經旨也而悼夫後人之失經旨也先哲有言凡讀書不可先看註解且將經文反覆而詳味之待自家有新意却以註解參校庶乎經意昭然而不為他說所蔽若先看註解則被其說橫吾胷中自家竟無新意矣余平生

佩服此訓所益甚多且如難經此篇其言周備純正足以為萬世法後人紛紛之論其可憑乎夫實則瀉之虛則補之此常道也實則瀉其子虛則補其母亦常道也人皆知之今肝實肺虛乃不瀉肝而瀉心此則人亦知之至於不補肺補脾而補腎此則人不能知惟越人知之耳夫子能令母實母能令子虛以常情觀之則曰心火實致肝木亦實此子能令母實也脾土虛致肺金亦虛此母能令子虛也心火實固由

自旺脾土虛乃由肝木制之法當瀉心補脾則肝脾皆平矣越人則不然其子能令母實子謂火母謂木固與常情無異其母能令子虛母謂水子謂木則與常情不同矣故曰水者木之母也子能令母實一句言病因也母能令子虛一句言治法其意蓋曰火為木之子子助其母使之過分而為病矣今將何以處之惟有補水瀉火之治而已夫補水者何謂也蓋水為木之母若補水之虛使力可勝火火勢退而木勢亦退此則母能虛子之義所謂不治之治也此虛字與精氣奪則虛之虛不同彼虛謂耗其真而致虛此虛謂抑其過而欲虛之也若曰不然則母能令子虛一句將歸之於脾肺乎既歸於脾肺今何不補脾乎夫五行之道其所畏者畏所克耳今火大旺水大虧火何畏乎惟其無畏何愈旺而莫能制苟非滋水以求勝之孰能勝也水勝火三字此越人寓意處當細觀之勿輕忽也雖瀉火補水並言然其要又在於補水耳後人乃曰獨瀉火而不用補水又曰瀉火即是補水得不大違越人與經之意乎若果不用補水經必不言補北方越人必不言補水矣雖然

水不虛而火獨暴旺者固不必補水亦可也若先因水虛而致火旺者不補水可乎水虛火旺而不補水則藥至而暫息藥過而復作將積年累月無有窮已安能絕其根哉雖苦寒之藥通為抑陽扶陰不過瀉火邪而已終非腎臟本藥不能以滋養北方之真陰也欲滋真陰捨地黃黃蘗之屬不可也且夫肝之實也其因有二心助肝肝實之一因也肺不能制肝肝實之二因也肺之虛也其因亦有二心克肺肺虛之一因也脾受肝克而不能生肺肺虛之二因也今補水而瀉火火退則木氣削又金不受克而制木東方不實矣金氣得平又土不受克而生金西方不虛矣若以虛則補母言之肺虛則當補脾豈知肝勢正盛克土之深雖每日補脾安能敵其正盛之勢哉縱使土能生金金受火克亦所得不償所失矣此所以不補土而補水也或疑木旺補水恐水生木而木愈旺故聞獨瀉火不補水之論欣然而從之殊不知木已旺矣何待生乎況水之虛雖峻補尚不能復其本氣安有餘力生木哉若能生木則能勝火矣或又謂補

水者欲其不食於母也不食於母則金氣還矣豈知火克金土不生金金之虛已極尚不能自給水雖欲食之何所食乎若如此則金虛不由於火之克土之不生而由於水之食耳豈理也哉縱水不食金金亦未必能復常也金不得平木一句多一不字所以瀉火補水者正欲使金得平木也不字當刪去不能治其虛何問其餘虛指肺虛而言也瀉火補水使金得平木正所謂能治其虛不補土不補金乃瀉火補水使金自平此法之巧而妙者苟不能曉此法而不能

治此虛則不須問其他必是無能之人矣故曰不能治其虛何問其餘若夫上文所謂金木水火土更相平之義亦傍解而自明矣故弗具也夫越人亞聖也論至於此敢不欽服但恨說者之斁蝕之故辯

五鬱論

治五鬱之法嘗聞之王太僕矣其釋內經曰木鬱達之謂吐之令其條達也火鬱發之謂汗之令其疏散也土鬱奪之謂下之令無壅礙也金鬱泄之謂滲泄解利小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也自太僕此說之後靡不宗之然愚則未能快然于中焉嘗細觀之似猶有可言者且折之一句較之上四句尤為難曉因反覆經文以求其至按內經帝曰鬱之甚者治之奈何岐伯曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀉之總十三句通為一章當分三節自帝曰止水鬱折之九句為一節治鬱法之問答也然調其氣一句為一節治鬱之餘法也過者折之以其畏也所謂瀉之三句為一節調氣之餘法也夫五法者經雖

為病由五運之鬱所致而立然擴而充之則未嘗不可也且凡病之起也多由乎鬱鬱者滯而不通之義或因所乘而為鬱或不因所乘而本氣自鬱皆鬱也豈惟五運之變能使然哉鬱既非五運之變可拘則達之發之奪之泄之折之之法因可擴焉而充之矣可擴而充其應變不窮之理也歟姑陳于左木鬱達之達者通暢之也如肝性急怒氣逆胠脇或脹火時上炎治以苦寒辛散而不愈者則用升發之藥加以厥陰報使而從治之又如久風入中為飧泄及不因

外感之入而清氣在下爲殞泄則以輕揚之劑舉而散之凡此之類皆達之之法也王氏謂吐之令其條達爲木鬱達之東垣謂食塞胷中食爲坤土胷爲金位金主殺伐與坤土俱在于上而旺于天金能克木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣此木鬱達之也竊意王氏以吐訓達此不能使人無疑者以爲肺金盛而抑制肝木歟則瀉肺氣舉肝氣可矣不必吐也以爲脾胃濁氣下流而少陽清氣不升歟則益胃升陽

可矣不必吐也雖然木鬱固有吐之之理今以吐字總該達字則是凡木鬱皆當用吐矣其可乎哉至於東垣所謂食塞肺分爲金與土旺于上而克木又不能使人無疑者夫金之克木五行之常道固不待夫物傷而後能也且爲物所傷豈有反旺之理若曰吐去其物以伸木氣乃是反爲木鬱而施治非爲食傷而施治矣夫食塞胷中而用吐正內經所謂其高者因而越之之義耳恐不勞引木鬱之說以汩之也火鬱發之發者汗之也升舉之也如腠理外閉邪熱怫

鬱則解表取汗以散之又如龍火鬱甚于內非苦寒降洩之劑可治則用升浮之藥佐以甘溫順其性而從治之使勢窮則止如東垣升陽散火湯是也凡此之類皆發之之法也土鬱奪之奪者攻下也劫而衰之也如邪熱入胃用鹹寒之劑以攻去之又如中滿腹脹濕熱內甚其人壯氣實者則攻下之其或勢盛而不能頓除者則劫奪其勢而使之衰又如濕熱爲病有非力輕之劑可治者則或攻或劫以致其平凡此之類皆奪之之法也金鬱泄之泄者滲泄而利小

便也疏通其氣也如肺金爲腎水上原金受火鑠其令不行原鬱而滲道閉矣宜肅清金化滋以利之又如肺氣膹滿胷憑仰息非利肺氣之劑不足以疏通之凡此之類皆泄之之法也王氏謂滲泄解表利小便爲金鬱泄之夫滲泄利小便固爲泄金鬱矣其解表二字莫曉其意得非以人之皮毛屬肺其受邪爲金鬱而解表爲泄之乎竊謂如此則凡筋病便是木鬱肉病便是土鬱耶此二字未當於理今刪去且解表間於滲泄利小便之中是滲泄利小便爲二治矣

若以滲泄爲滋肺生水以利小便爲直治膀胱則直治膀胱既責不在肺何爲金鬱乎是亦不通故余易之曰滲泄而利小便也水鬱折之折者制御也伐而挫之也漸殺其勢也如腫脹之病水氣淫溢而滲道以塞夫水之所不勝者土也今土氣衰弱不能制之故反受其侮治當實其脾土資其運化俾可以制水而不敢犯則滲道達而後愈或病勢既旺非上法所能遽制則用泄水之藥以伐而挫之或去菀陳莝開鬼門潔淨府三治備舉迭用以漸平之王氏所謂抑

之制其衝逆正欲折挫其氾濫之勢也夫實土者守也泄水者攻也兼三治者廣略而決勝也守也攻也廣略也雖俱爲治水之法然不審病者之虛實久近淺深雜焉而妄施治之其不傾踣者寡矣且夫五鬱之病固有法以治之矣然邪氣久客正氣必損今邪氣雖去正氣豈能遽平哉苟不平調正氣使各安其位復其常於治鬱之餘則猶未足以盡治法之妙故又曰然調其氣苟調之而其氣猶或過而未服則當益其所不勝以制之如木過者當益金金能制木則

木斯服矣所不勝者所畏者也故曰過者折之以其畏也夫制物者物之所欲也制於物者物之所不欲也順其欲則喜逆其欲則惡今逆之以所惡故曰所謂瀉之王氏以鹹瀉腎酸瀉肝之類爲說未盡厥旨雖然自調其氣以下益經之本旨故余推其義如此若擴充爲應變之用則不必盡然也

二陽病論

經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月釋之者謂男子則脾受之而味不化故少精女子則心受

之而血不流故不月分心脾爲男女各受立說竊謂謂不然夫二陽陽明也胃與大腸之脉也腸胃有病心脾受之發心脾猶言延及於心脾也雖然脾胃爲合胃病而及脾理固宜矣大腸與心本非合也今大腸而及心何哉蓋胃爲受納之府大腸爲傳化之府食入於胃濁氣歸心飲入於胃輸精於脾者以胃之能納大腸之能化耳腸胃既病則不能受不能化心脾何所資乎心脾既無所資則無以運化而生精血矣故腸胃有病心脾受之則男爲少精女爲不月矣

心脾當總言男女不當分說至隱曲不月方可分說耳若如釋者之言則男之精獨資於脾而不資於心女之血獨資於心而不資於脾有是理耶葢男女之精血皆由五臟六腑之相養而後成可謂之男精資於脾女血資於心乎經本曰男女皆有心脾之病但在男子則隱曲之不利在女子則月事之不來耳

煎厥論

內經曰陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止王氏註曰張筋脉䐜脹也精絕精氣竭絕也既傷腎氣又損膀胱故當夏時使人煎厥斯乃房之患也既盲目視又閉耳聽則志意心神筋骨腸胃潰潰乎若壞汨汨乎煩悶而不可止愚竊味夫經其旨昭然若無待於解者何註釋之乖遠如此乎請重釋之夫陽氣者人身和平之氣也煩勞者亢過於動作皆是也張主也謂亢極也精陰氣也辟積猶積疊而怫鬱也衣褶謂之襞積者亦取積疊之義也積水之奔散曰潰都猶隄防也汨汨水流而不止也夫亢

于身者一氣而已本無異類也即其所用所病而言之於是乎始有異名耳故平則為正亢則為邪陽氣則因其和以養人而名之及其過動而張亦即陽氣亢極而成火耳陽盛則陰衰故精絕水不制火故亢火鬱積之甚又當夏月火旺之時故使人煩熱之極若煎迫然而氣逆上也火炎氣逆故目盲耳閉而無所用此陽極欲絕故其精敗神去不可復生若隄防之崩壞而所儲之水奔散滂流莫能以遏之矣夫病至於此是壞之極矣王氏乃因不曉都字之義遂略去此字而謂之若壞其可乎哉又以此病純為房患以張為筋脉䐜脹以汨汨為煩悶皆非是

八味丸用澤瀉論

張仲景八味丸用澤瀉寇宗奭本草衍義云不過接引桂附等歸就腎經別無他意而王海藏遠之愚謂八味丸以地黃為君而以餘藥佐之非止為補血之劑蓋兼補氣也氣者血之母東垣所謂陽旺則能生陰血者此也若果專為補腎而入腎經則地黃山茱萸白茯苓牡丹皮皆腎經之藥固不待夫澤瀉之接

行而後至也其附子官桂雖非足少陰經本藥然附子乃右腎命門之藥況浮中沉無所不至又為通行諸經引用藥官桂能補下焦熱火不足是亦右腎命門藥也易老亦曰補腎用肉桂然則桂附亦不待夫澤瀉之接引而後至矣唯乾山藥雖獨入手太陰經然其功亦能强陰且手太陰為足少陰之上原原既有滋流豈無益夫其用地黃為君者大補血虛不足與補腎也用諸藥佐之者山藥之强陰益氣山茱萸之强陰益精而壯元氣白茯苓之補陽長陰而益氣

牡丹皮之瀉陰火而治神志不足澤瀉之發五臟益氣力起陰氣而補虛損五勞桂附之補下焦火也由此觀之則余之所謂兼補氣者非臆說也且澤瀉也雖曰鹹以瀉腎乃瀉腎邪非瀉腎之本也故五苓散用澤瀉者詎非瀉腎邪乎白茯苓亦伐腎邪即所以補正耳是則八味丸之用澤瀉者非他蓋取其瀉腎邪養五臟益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已寇氏何疑其瀉腎而為接引桂附等之說乎且澤瀉固能瀉腎然從於諸補藥群衆之中雖欲瀉之而力莫

能施矣故當歸從於參芪則能補血從於大黃牽牛則能破血從於桂附茱萸則熱從於大黃芒硝則寒此非無定性也蓋於群衆之勢而不得不然也雖然或者又謂八味丸以附子為少陰之向導其補自是地黃為主蓋取其貨脾走下之性以行地黃之滯可致遠耳竊意如此則地黃之滯非附子不能及下矣然錢仲陽六味地黃丸豈有附子乎夫八味丸蓋兼陰火不足者設六味地黃丸則惟陰虛者用之也

小便原委論

或問余曰靈樞經云水穀者常并居胃中成糟粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉王冰曰水液自回腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而為溺以泄出也楊介云水穀自小腸盛受於闌門以分別也其水則滲灌入於膀胱上口而為溲便詳已上三說則小便即泌別之水液滲入膀胱以出者也素問則曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則小便又似水飲精微之氣上升脾肺運化而後成

者也彼此不同將何所憑乎余曰憑夫理耳且夫洩溺者果何物耶水而已矣水之下流其性則然也故飲入於胃其精氣雖上升其飲之本體同不能上升也既不能上升則豈可謂小便獨爲氣化所成者哉惟其不能上升者必有彼於能上升者爲之先導故素問又曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣且水者氣之子氣者水之母氣行則水行氣滯則水滯或者又謂小便純由泌別不由運化蓋不明此理故也雖然膀胱固曰津液之府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中焉故素問曰胞移熱於膀胱靈樞經曰

膀胱之胞薄以濡類纂曰膀胱者胞之室且夫胞之居於膀胱也有上口而無下口津液既盛於胞無由自出必因乎氣化而後能漸浸潤於胞外積於胞下之空處遂爲溺以出於前陰也素問所謂膀胱津液藏焉者蓋舉膀胱以該胞也若曰胞下無空處則人溺急時至厠安能即出乎夫惟積滿胞下空處而不可再容故急急則至厠即出矣或言胞有下口而無上口或言胞上下皆有口或言胞有小竅而爲注泄之路不亦妄歟

內傷餘議

嘗觀夫東垣李氏所著內外傷辨有曰外傷風寒客邪有餘之病當瀉不當補內傷飲食勞役不足之病當補不當瀉自此論一出而天下後世始知內外之傷有所別而仲景之法不可例用矣其惠也不其大哉雖然夷考其言猶或有可疑者不敢謏佞僭用條之如曰夫飲食勞倦傷而內熱者乃陰火乘其坤土之位故內熱以及於胸中也又曰內經有云勞者溫之損者溫之惟宜溫藥以補元氣而瀉火邪內經曰

溫能除大熱故治之必溫藥乃可耳又曰飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下分消其濕此飲謂酒也食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫如消導若此者皆不能使人無疑者也謹按素問調經論篇云帝曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱嗟夫此內傷之說之原乎請釋其義如左夫人身之陰陽有以表裏言者有以上下之分言者有

以勞血言者。有以身前身後言者。有以臟腑言者。有以升降呼吸之氣言者。餘如動靜語默起居之類。其多不必悉舉。此所謂陰虛之陰。其所指與數者皆不同。蓋勞動之過則陽和之氣皆亢極而化爲火矣。況水穀之味又少入。是故陽愈盛而陰愈衰也。此陰虛之陰。蓋指身中之陰氣與水穀之味耳。或以下焦陰分爲言。或以腎水眞陰爲言。皆非也。夫有所勞役者過動屬火也。形氣衰少者。壯火食氣也。穀氣不盛者勞傷元氣則少食而氣衰也。上焦不行者。淸陽不升

也。下脘不通者。濁陰不降也。夫胃受水穀。故淸陽升而濁陰降。以傳化出入。滋榮一身也。今胃不能納而穀氣衰少。則淸無升而濁無降矣。故曰上焦不行。下脘不通。然非謂絕不行不通也。但比之平常無病時則謂之不行不通耳。上不行。下不通。則鬱矣。鬱則少火皆成壯火。而胃居上焦下脘兩者之間。故胃氣熱。熱則上炎。故熏胸中而爲內熱也。東垣所謂勞役形體。所謂飲食失節而致熱者。此言正與調經論篇之旨相合。固宜引此段經文於內外傷辨以爲之主。而

乃反不引此。却謂陰火乘土位。故內熱及胸中。此不能無疑者也。夫陰火二字。素問靈樞難經未嘗言。而東垣每每言之。素問止有七節之傍中有小心二句而劉守眞推其爲命門屬火不屬水。引仙經心爲君火腎爲相火之說以爲之證。然亦不以陰火名之。是則名爲陰火者。其東垣始歟。竊意內熱之作。非皆陰火也。但氣有鬱則成熱耳。雖曰心爲君火。君不主令然素問所敘諸病之屬熱者甚衆。皆君火病也。豈君火不能爲病。而直欲純歸之於陰火乎。至眞要大論

云勞者溫之。損者益之。夫勞則動之太過。而神不寧矣。故溫之。溫也者養也。溫之者。所以調其食飲。適其起居。澄心息慮。從容以待其眞氣之復常也。禮記所謂柔色以溫之。此溫字正與此同。或以藥扶助之亦養也。今東垣乃以溫爲溫涼之溫。謂宜溫藥以補元氣而瀉火邪。又易損者益之爲損者溫之。又以溫能除大熱爲內經所云。而徧攷內經並無此語。此亦不能無疑者也。然溫藥之補元氣瀉火邪者。亦惟氣溫而味甘者。斯可矣。蓋溫能益氣。甘能助脾而緩火。故

元氣復而火邪熄也夫宜用溫藥以爲內傷不足之治則可以爲勞者溫之之註則不可陰陽應象論所謂形不足者溫之以氣其溫字亦是滋養之義非指溫藥也夫形不足乃陽虛而不充也氣者藥之氣也藥有氣厚氣薄味厚味薄味厚者屬陰而滋精氣厚者屬陽而滋形今以藥之氣厚者滋陽不兼形乎故曰形不足者溫之以氣雖以藥溫養之亦未嘗不兼乎調食飲適起居與澄心息慮也溫字固具二意然終不可視爲溫涼之溫苟以補之除之抑之舉之散

之等語此類而觀焉則其義自著矣夫金木水火土運於天地也則無形質之可觀其麗於地則有形質矣金木土水者有形有質者也火者有形而質不實者也酒性雖熱體同於水今東垣乃謂飲者無形之氣此亦不能無疑者也既待發汗利小便以去之其可謂之無形之氣乎且勞倦傷飲食傷二者雖俱爲內傷然不可混而爲一難經所謂飲食勞倦則傷脾者蓋謂脾主飲食而四肢亦屬脾故飲食失節勞役四肢皆能傷于脾耳非謂二者同類而無辨也夫勞倦傷飲食傷雖與風寒暑濕有餘之病不同然飲食傷又與勞倦傷不同勞倦傷誠不足也飲食傷尤當於不足之中分其有餘不足也何也蓋饑餓不飲食與飲食太過雖皆是失節然必明其有兩者之分方盡其理節也者何無不及無太過之中道也夫饑餓不飲食者胃氣空虛此爲不足固失節也飲食自倍而停滯者胃氣受傷此不足之中兼有餘亦失節也以受傷言則不足以停滯言則有餘矣惟其不足故補益惟其有餘故消導亦有物滯氣傷必補益消導

兼行者亦有物暫滯而氣不甚傷宜消導獨行不須補益者亦有既停滯不復自化不須消導但當補益或亦不須補益者潔古枳朮丸東垣橘皮枳朮丸木香枳朮丸之類雖曰消導固有補益之意存乎其間其他如木香分氣丸導氣枳實丸大枳殼丸之類雖無補益然施之於物暫滯氣不甚傷者豈不可哉但不宜視爲通行之藥耳且所滯之物非枳朮丸之力所能去者亦安可泥於消導而不知變乎故備急丸煑黃丸感應丸瓜蒂散等之推逐者潔古東垣亦未

嘗委之而弗用也故善將兵者攻亦當守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推逐之理矣若夫勞倦傷則純乎補益固不待議雖東垣丁寧告戒然世人猶往往以苦寒之劑望除勞倦傷之熱及其不愈而反甚自甚而至危但曰病勢已極藥不能勝耳醫者病者主病者十委之天命皆懵然不悟其爲妄治之失也嗚呼仁人君子能不痛心也哉夫東垣先哲之出類者也奚敢輕議但恨其白璧微瑕而或貽後

人差毫釐謬千里之患故不得不借喻耳知我者其鑒之

外傷內傷所受經旨異同論

客問難予曰素問陰陽應象論云天之邪氣感則害人五臟水穀之寒熱感則害人六腑太陰陽明論云犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟兩說正相反願聞其解余復之曰此所謂似反而不反者也夫感天之邪氣犯賊風虛邪外傷有餘之病也感水穀寒熱食飲不節內傷不足之病也二者之傷腑臟皆嘗受之但隨其所從所發之處而爲病耳不可以此而說之異而致疑蓋並行不相悖也讀者當合而觀之其旨斯盡若曰不然請以諸處所論證之金匱眞言論曰風觸五臟邪氣發病八正神明論曰夫八正之虛邪以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則五臟傷靈樞經曰五臟之中風又曰東風傷人內舍於肝南風傷人內舍於心西南風傷人內舍於脾西風傷人內舍於肺北風傷人內舍於腎觀乎此則

天之邪氣固傷五臟矣靈樞又曰邪之中人也無有常中于陰則溜于腑又曰虛邪之中人也始從皮膚以入其傳自絡脈而經而輸而伏衝之脈以至於腸胃又曰東北風傷人內舍於大腸西北風傷人內舍於小腸東南風傷人內舍於胃觀乎此則天之邪氣豈不傷六腑乎素問曰飲食自倍腸胃乃傷觀乎此則水穀寒熱固傷六腑矣靈樞又曰形寒寒飲則傷肺難經曰飲食勞倦則傷脾觀乎此則水穀寒熱豈不傷五臟乎至於地之濕氣亦未必專害皮肉筋脈

而不能害臟腑邪氣。水穀亦未必專害臟腑。而不能害皮肉筋脈也。但以邪氣無形。臟主藏精氣。故以類相從而多傷臟。水穀有形。腑主傳化物。故因其所由而多傷腑。濕氣浸潤。其性緩慢。其入人也以漸。其始也自足。故從下而上。從淺而深。而多傷於皮肉筋脈耳。孰謂濕氣全無及於臟腑之理哉。至若起居不時一語。蓋勞役所傷之病。不系上文異同之義。故不之及也。

溯洄集卷之二終